

ALI-BASRIN

Generic name: Flibanserin Tablets

Brand Name: ALIFBASRIN

Composition:

Flibanserin.....100 mg

Indications:

- Flibanserin is used to treat premenopausal women with persistently low or absent sexual desire (Hypoactive Sexual Desire Disorder (HSDD)).

Limitations of Use:

- Flibanserin is not indicated for the treatment of HSDD in postmenopausal women or in men.
- Flibanserin is not indicated to enhance sexual performance.

Dosage:

- Recommended dosage is 100 mg taken once daily at bedtime.
- Discontinue treatment after 8 weeks if no improvement.

Contraindications:

- Using concomitant moderate or strong CYP3A4 inhibitors.
- With hepatic impairment.
- Known hypersensitivity to Flibanserin or its components.

Warning:

- Alcohol should be strictly avoided while taking this medication as it may cause low blood pressure, dizziness, and fainting.
- Hypotension and Syncope with Flibanserin Alone: Patients with pre-syncope should immediately lie supine and promptly seek medical help if symptoms are not resolved.
- Central Nervous System (CNS) Depression (e.g., Somnolence, Sedation): Can occur with Flibanserin alone exacerbated by other CNS depressants, and in settings where flibanserin concentrations are increased.

Adverse Effects:

- dizziness, somnolence, nausea, fatigue, insomnia, and dry mouth.

Dosage form: Light red tablets, oval.

Expiry date: 48 months from the date of manufacture.

Packaging: 30 tablets/bottle.

Storage:

- Store at room temperature not exceeding 30°C.
- Please keep out of the reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory

Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com

ເອກະສານກຳກັບຢາ ALI-BASRIN

ຊື່ທົ່ວໄປ: Flibanserin Tablets

ຊື່ການຄ້າ: ALIFBASRIN

ສ່ວນປະກອບ:

Flibanserin 100 mg

ຂໍ້ບັງໃຊ້:

- Flibanserin ໃຊ້ສຳລັບການປົນປົງເພດຍິງໄວກ່ອນໝົດປະຈຳເດືອນ ທີ່ມີພາວະຄວາມຕ້ອງການທາງເພດຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼື ເກືອບບໍ່ມີເລີຍ (Hypoactive Sexual Desire Disorder (HSDD))

ຂໍ້ຈຳກັດໃນການໃຊ້:

- ບໍ່ແນະນຳໃຫ້ມີການນຳໃຊ້ຢາ Flibanserin ສຳລັບການປົນປົງ ໃນເພດຍິງໄວໝົດປະຈຳເດືອນ ແລະ ເພດຊາຍ ທີ່ມີພາວະຄວາມຕ້ອງການທາງເພດຫຼຸດລົງ (Hypoactive Sexual Desire Disorder(HSDD))
- ບໍ່ແນະນຳໃຫ້ມີການນຳໃຊ້ຢາ Flibanserin ເພື່ອປະສິດທິພາບທາງເພດ.

ຂະໜາດ ແລະ ວິທີນຳໃຊ້:

- ປະລິມານທີ່ແນະນຳ: 100 mg, 1 ຄັ້ງ ຕໍ່ມື ກ່ອນນອນ;
- ຖ້າບໍ່ມີການປ່ຽນແປງໃດໆ, ແມ່ນໃຫ້ຢຸດການປົນປົງ ຫຼັງຈາກໄດ້ 8 ອາທິດ.

ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້:

- ກໍລະນີມີການນຳໃຊ້ຢາຕ້ານເອີມໄຊ Cytochrome P450 (CYP3A4) ໃນລະດັບປານກາງ ຫຼື ຮຸນແຮງ.
- ໃນຄົນເຈັບທີ່ມີໜ້າທີ່ການທຳງານຂອງຕັບຊຸດໂຊມ.
- ຄົນເຈັບທີ່ມີອາການແຜ່ຕ່ຢາ Flibanserin ຫຼື ສ່ວນປະກອບຂອງຕົວຢາ.

ຄຳເຕືອນ:

- ຄວນຫຼີກລ້ຽງການດື່ມ ເຫຼົ້າ ຢ່າງເດັດຂາດໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ຢານີ້ ເພາະອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມດັນເລືອດຕ່ຳ, ວິນຫົວ, ແລະ ໝົດສະຕິໄດ້.
- ໃນກໍລະນີເກີດ ຄວາມດັນເລືອດຕ່ຳ ແລະ ໝົດສະຕິ ຈາກການໃຊ້ຢາ Flibanserin ພຽງຢ່າງດຽວ: ຖ້າຄົນເຈັບມີອາການ ໝົດສະຕິ ຄວນໃຫ້ຄົນເຈັບນອນຫງາຍຫັນທີ ຖ້າອາການບໍ່ດີຂຶ້ນ ແມ່ນໃຫ້ນຳສົ່ງໄປພົບແພດໂດຍໄວ.
- ອາການກົດປະສາດສ່ວນກາງ (ເຊັ່ນ ງ່ວນນອນ, ມືນງຶງ): ອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຈາກການໃຊ້ Flibanserin ພຽງຢ່າງດຽວ ແລະ ຈະຮຸນແຮງຂຶ້ນຖ້າໃຊ້ຮ່ວມກັບຢາທີ່ກົດປະສາດ CNS ໂຕອື່ນ ຫຼື ໃນກໍລະນີທີ່ມີລະດັບຂອງຢາເພີ່ມຂຶ້ນສູງ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

- ວິນຫົວ, ງ່ວນນອນ, ປວດຮາກ, ອ່ອນເພຍ, ນອນບໍ່ຫຼັບ ແລະ ປາກແຫ້ງ.

ຮູບແບບຂອງຢາ: ຢາເມັດຮູບໄຂ່ສີແດງອ່ອນ.

ຂະໜາດບັນຈຸ: ບັນຈຸໃນກ່ອງ, 1 ກ່ອງມີ 30 ເມັດ.

ວັນໝົດອາຍຸ: 48 ເດືອນ ນັບຫຼັງຈາກວັນທີ່ຜະລິດ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງບໍ່ໃຫ້ເກີນ 30 °C.
- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກມືເດັກ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຮູບ ຈຳກັດ

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com