

ALI-BEVAN

Generic name: Bevantolol Hydrochloride Tablets

Brand Name: ALI-BEVAN

Composition:

Bevantolol Hydrochloride.....50mg

Indications:

- For the treatment of angina pectoris and hypertension.

Dosage:

- Hypertension:
 - Initial dose: 50-100 mg/day, taken orally 1-2 times.
 - Maintenance dose: 100–200 mg/day, adjusted based on blood pressure.
- Angina pectoris:
 - Initial dose: 50 mg/dose, taken orally twice a day.
 - Can be gradually increased to 100 mg/dose, taken orally twice a day (the maximum dose usually does not exceed 400 mg/day).
- Dosage method: Can be taken with or without food, but should be taken regularly.

Contraindications:

- Severe bradycardia (heart rate < 50 bpm) or sick sinus syndrome.
- Second- or third-degree atrioventricular block (in the absence of a pacemaker).
- Cardiogenic shock, acute heart failure.
- Bronchial asthma or severe chronic obstructive pulmonary disease (COPD), as β_2 -blockade may exacerbate bronchospasm.
- Allergy to Bevantolol.

Warning:

- Monitor heart rate and blood pressure: Regularly check the electrocardiogram during medication to avoid bradycardia (heart rate <55 bpm).
- Gradual discontinuation: Sudden withdrawal after long-term use may trigger rebound angina or hypertensive crisis (dosage should be gradually reduced under medical supervision).
- Metabolic effects: May mask symptoms of hypoglycemia (diabetic patients should be cautious).
- Hepatic and renal insufficiency: Dosage adjustment is required, and severe hepatic insufficiency should avoid its use.
- Pregnancy and breastfeeding:
 - Pregnancy: Use only when clearly needed (it may affect fetal blood flow).
 - Breastfeeding: Avoid medication (small amounts of drugs may enter breast milk).

Adverse Effects:

- Common adverse reactions ($\geq 1\%$):
 - Cardiovascular system: bradycardia, hypotension, cold extremities.
 - Central nervous system: dizziness, fatigue, headache.
 - Respiratory system: mild bronchospasm (β_2 -blockade effect, use with caution in asthma patients).

- Gastrointestinal: Nausea, constipation.
- Serious but rare adverse reactions (<1%):
 - Cardiac conduction block (e.g., sinoatrial node function inhibition, atrioventricular conduction block).
 - Worsening of heart failure (especially in patients with existing dysfunction).
 - Allergic reactions (rash, dyspnea).

Dosage form: White tablets.

Expiry data: 24 months from the date of manufacture.

Packaging: 10 tablets/blister, 10 blisters/box.

Storage:

- Store at room temperature not exceeding 30°C.
- Keep out of reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory

Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com

ເອກະສານກຳກັບຢາ ALI-BEVAN

ຊື່ທົ່ວໄປ: Bevantolol Hydrochloride Tablets

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ: ALI-BEVAN

ສ່ວນປະກອບ:

Bevantolol Hydrochloride.....50mg

ຂໍ້ບັງໃຊ້:

- ໃຊ້ສຳລັບປິ່ນປົວ ພະຍາດຫລອດເລືອດຫົວໃຈຕິບ ແລະ ຄວາມດັນໂລຫິດສູງ

ວິທີໃຊ້:

- ຄວາມດັນເລືອດສູງ:
 - ປະລິມານຢາເລີ່ມຕົ້ນ: 50-100mg ຕໍ່ມື້, ກິນ 1 – 2 ຄັ້ງ.
 - ປະລິມານຢາປົກກະຕິ 100-200mg ຕໍ່ມື້ (ປັບຕາມຄວາມດັນເລືອດ).
- ອາການຂອງຫົວໃຈເຕັ້ນຜິດຈັງຫວະ:
 - ປະລິມານຢາເລີ່ມຕົ້ນ: 50mg ຕໍ່ມື້, ກິນ ມື້ລະ 2 ຄັ້ງ.
 - ສາມາດເພີ່ມປະລິມານຢາຂຶ້ນເປັນ 100mg ຕໍ່ຄັ້ງ, ກິນ ມື້ລະ 2 ຄັ້ງ (ປະລິມານຢາສູງສຸດໂດຍສະເລ່ຍ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 400mg ຕໍ່ມື້).
- ການນຳໃຊ້: ສາມາດໃຊ້ກິນໃນຕອນທ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ກິນຫຼັງອາຫານ ແລະ ຕ້ອງກິນເປັນປະຈຳ.

ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້:

- ຫົວໃຈເຕັ້ນຊ້ຳຢ່າງຮຸນແຮງ (ອັດຕາການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈ <50 ຄັ້ງ ຕໍ່ນາທີ) ຫຼື ມີກຸ່ມຂອງອາການໄຂ້ນັ້ນສອກເສບ.
- ມີການກົດ ຫຼື ປິດກັນຫົວໃຈເບື້ອງເທິງ ແລະ ເບື້ອງລຸ່ມ ຢູ່ລະດັບທີສອງ ເຖິງ ສາມ (ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ມີເຄື່ອງກະຕຸ້ນຫົວໃຈ).
- ມີອາການຊ້ອກຂອງຫົວໃຈ, ຫົວໃຈລົ້ມເຫຼວກະທັນຫັນ.
- ພະຍາດຫົດຫຼອດລົມ ຫຼື ພະຍາດປອດອັກເສບຊຳເຮືອຮຸນແຮງ (COPD) (ເນື່ອງຈາກມີການກົດ b2 ອາດເຮັດໃຫ້ກ້າມຊີ້ນກະຕຸກຮຸນແຮງຂຶ້ນ).
- ຜູ້ມີອາການແພ້ຢາ Bevantolol.

ຄຳເຕືອນ:

- ຕິດຕາມການວັດແທກອາການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈ ແລະ ວັດຄວາມດັນເລືອດ: ວັດແທກຄືນໄຟຟ້າຫົວໃຈເປັນປະຈຳ ລະຫວ່າງການໃຊ້ຢາ, ເພື່ອປ້ອງກັນອາການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈຊ້ຳ (ອັດຕາການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈ <55 ຄັ້ງ ຕໍ່ນາທີ).
- ການຢຸດຢາ ແມ່ນໃຫ້ຄ່ອຍເປັນຄ່ອຍໄປ: ຖ້າມີການຢຸດຢາກະທັນຫັນ ຫຼັງຈາກໃຊ້ຢາມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວ, ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເຈັບໜ້າເອິກ ຫຼື ມີອາການຂອງຄວາມດັນເລືອດສູງກະທັນຫັນ (ການຫຼຸດປະລິມານຢາລົງ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການແນະນຳຂອງແພດໝໍ).
- ຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບການເສົາຜ່ານ: ອາດປົດບັງລະດັບຂອງນ້ຳຕານໃນເລືອດຕ່ຳ (ຄົນເຈັບທີ່ເປັນພະຍາດເບົາຫວານ ຄວນລະມັດລະວັງ).
- ອາການຕິບ ແລະ ໝາກໄຂ່ຫຼັງຊຸດໂຊມກະທັນຫັນ: ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຫຼຸດປະລິມານຂອງຢາ ແລະ ຄວນມີການຫຼີກລ່ຽງການໃຊ້ຢາໃນກໍລະນີທີ່ມີອາການຂອງຕັບຊຸດໂຊມຮຸນແຮງ.
- ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ການໃຫ້ນົມລູກ:
 - ແມ່ຍິງຖືພາ: ຄວນນຳໃຊ້ສະເພາະໃນກໍລະນີທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງນຳໃຊ້ (ຢາອາດມີຜົນຕໍ່ການໄຫຼວຽນໃນເລືອດຂອງເດັກໃນທ້ອງ).
 - ໃນໄລຍະທີ່ມີການໃຫ້ນົມລູກ ຄວນຫຼີກລ່ຽງການໃຊ້ຢາ (ເພາະອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີປະລິມານຢາຈຳນວນໜຶ່ງຜ່ານເຂົ້າສູ່ນ້ຳນົມແມ່).

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

- ອາການຂ້າງຄຽງທີ່ພົບເລື້ອຍໆ ($\geq 1\%$):
 - ລະບົບຫົວໃຈ ແລະ ເສັ້ນເລືອດຫົວໃຈເຕັ້ນຊ້ຳ, ຄວາມດັນເລືອດຕ່ຳ, ແຂນຂາເຢັນ.
 - ລະບົບປະສາດສ່ວນກາງ: ວິນຫົວ, ອ່ອນເພຍ, ເຈັບຫົວ.
 - ລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ: ຫຼອດລົມຫົດເກັງເລັກນ້ອຍ (ມີລິດປິດກັນ b2 ຄວນລະມັດລະວັງໃນການນຳໃຊ້ກັບຄົນເຈັບທີ່ເປັນພະຍາດຫອບຫົດ).
 - ລະບົບຍ່ອຍອາຫານ: ປວດຮາກ, ຫ້ອງຜູກ.
- ອາການຂ້າງຄຽງທີ່ຮຸນແຮງ ແຕ່ພົບໄດ້ນ້ອຍ (<1%):

- ການກົດປິດກັນການຊີກນໍາກະແສໄຟຟ້າຂອງຫົວໃຈ (ເຊັ່ນ: ການຢັບຢັ້ງການທໍາງານຂອງຕ່ອມນ້ຳເຫຼືອງ sinoatrial, ການກົດປິດກັນການຊີກນໍາກະແສໄຟຟ້າຂອງຫົວໃຈຫ້ອງເທິງ).
- ມີອາການຫົວໃຈລົ້ມເຫຼວຮຸນແຮງຂຶ້ນ (ໂດຍສະເພາະໃນຄົນເຈັບທີ່ມີອາການຂອງຫົວໃຈເຕັ້ນຜິດປົກກະຕິມາກ່ອນແລ້ວ)
- ມີອາການແພ້ຢາ: ເປັນຜືນ, ຫາຍໃຈລໍາບາກ.

ຮູບແບບຂອງຢາ: ຢາເມັດສີຂາວ.

ຂະໜາດບັນຈຸ: ບັນຈຸໃນກີບ, 1 ກີບມີ 10 ແຜງ, 1 ແຜງມີ 10 ເມັດ.

ວັນທີມີອາຍຸ: 24 ເດືອນ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ່ຜະລິດ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງບໍ່ເກີນ 30°C.
- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກມືເດັກ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຣຸບ ຈຳກັດ

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com