

ALI-PARA

Generic name: Paracetamol Oral Suspension

Brand Name: ALI-PARA

Composition:

Paracetamol.....250mg/5ml

Indications:

- Use for relieving fever and for treatment of mild to moderate pain, including headache, colds, toothache, muscle ache, back pain.

Dosage:

- Shake well before use, measure with a dose using measuring spoon or dosing cup.
- If there is persistent fever or pain, medication can be repeated once every 4-6 hours, with no more than 5 times within 24 hours

Weight (kg)	Dose (ml)
9~13	2.5 ml
13~17	3.75 ml
17~25	5 ml
25~34	7.5 ml
34~50	10 ml

Contraindications:

- Patients allergic to acetaminophen or other ingredients in the preparation are prohibited from using it.
- Do not take more than 5 doses in any 24-hour period—as exceeding this may cause liver toxicity or damage.

Warning:

- This product is used for antipyretic purposes for no more than 3 days and for pain relief for no more than 5 days.
- Do not use with other products containing paracetamol (acetaminophen) to avoid accidental overdose.
- Do not drink alcohol or alcoholic beverages during the use of this product.
- Discontinue use and seek medical help immediately if any of the following occur:
Allergic reactions (e.g. rash, itching, swelling of face/lips/throat)

Adverse Effects:

- Rash, urticaria, allergies, prurigo, abdominal pain.

Dosage form: Orange suspension, sweet taste, orange aroma.

Expiry date: 36 months from the date of manufacture.

Packaging: 60ml/bottle; 1 bottle/box.

Storage:

- Store in a cool and dry place, not exceeding 30°C.
- Please keep out of the reach of children.

Manufactured by:

Alliance Pharmaceutical Co., Ltd

Simanoneua Village, Hadxayfong District, Vientiane, Lao PDR

Tel: +856-21-612 727

ເອກະສານກຳກັບຢາ ALI-PARA

ຊື່ທົ່ວໄປ: Paracetamol Oral Suspension

ຊື່ການຄ້າ: ALI-PARA

ສ່ວນປະກອບ:

Paracetamol 250mg/5ml

ຂໍ້ບັງໃຊ້:

ນຳໃຊ້ສຳລັບຫຼຸດໄຂ້ ແລະ ບັນເທົາອາການເຈັບປວດເລັກນ້ອຍເຖິງປານກາງເຊັ່ນ: ເຈັບຫົວ, ປວດເມືອຍຈາກໄຂ້ຫວັດ, ເຈັບຂໍກະດູກ, ເຈັບແຂ້ວ, ເຈັບປວດກ້າມຊີນ, ປວດຫຼັງ.

ວິທີໃຊ້:

- ສິ້ນຂວດ ກ່ອນນຳໃຊ້ຢາ, ວັດແທກປະລິມານຢາໂດຍໃຊ້ບ່ວງວັດແທກ ຫຼື ຈອກຢາ.
- ຖ້າຫາກຍັງມີອາການໄຂ້ ຫຼື ເຈັບປວດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ສາມາດໃຫ້ກິນຢາຊ້ຳໄດ້ທຸກໆ 4-6 ຊົ່ວໂມງ ແຕ່ບໍ່ຄວນກິນເກີນ 5 ເທືອກພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ ຕາມປະລິມານຢາໃນຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້:

ນ້ຳໜັກ (kg)	ປະລິມານຢາ (ml)
9~13	2.5 ml
13~17	3.75 ml
17~25	5 ml
25~34	7.5 ml
34~50	10 ml

ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້:

- ຫ້າມໃຊ້ໃນຄົນເຈັບຫືມີອາການແພ້ຢາ Acetaminophen ຫຼື ແພ້ສ່ວນປະສົມອື່ນໆໃນຕົວຢາ.
- ຫ້າມຮັບປະທານເກີນ 5 ເທືອກ ພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ ຖ້າຫາກຮັບປະທານເກີນອາດເປັນພິດຕໍ່ຕັບ ຫຼື ຕັບອາດຖືກທຳລາຍໄດ້.

ຄຳເຕືອນ:

- ຜະລິດຕະພັນຢານີ້ໃຊ້ສຳລັບຫຼຸດໄຂ້ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 3 ວັນ ແລະ ບັນເທົາອາການເຈັບປວດ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 5 ວັນ.
- ຫຼັກລ່ຽງການນຳໃຊ້ຮ່ວມກັບຜະລິດຕະພັນທີ່ມີພາວະເຊຕາໂມນອື່ນໆ ເພື່ອປ້ອງກັນການໃຊ້ຢາເກີນຂະໜາດ.
- ໃນລະຫວ່າງທີ່ນຳໃຊ້ຢານີ້ ຫ້າມຄົນເຈັບຕື່ມເຫຼົ້າ ຫຼື ຕື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງທາດເຫຼົ້າ.
- ຢຸດນຳໃຊ້ ແລະ ຮີບໄປພົບແພດທັນທີ ຖ້າມີອາການແພ້ຕໍ່ໄປນີ້ເກີດຂຶ້ນເຊັ່ນ: ມີຜືນ, ອາການຄັນ, ອາການບວມຂອງໃບໜ້າ/ສິບ/ຄໍ).

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

- ອອກຜຸ່ມຜືນແດງ, ມີພູມແພ້, ອາການຄັນຕາມຜິວໜັງ, ເຈັບຫ້ອງ.

ຮູບແບບຂອງຢາ: ຢານ້ຳຕົກຕະກອນ, ລົດຊາດສີມຫວານ, ມີກິນໝາກກ້ຽງ.

ຂະໜາດບັນຈຸ: ບັນຈຸໃນຂວດ, ກ່ອງ 1 ມີ 1 ຂວດ, ຂວດ 1 ມີ 60ml/ຂວດ.

ວັນຫມົດອາຍຸ: 36 ເດືອນ ຫຼັງຈາກວັນທີ່ຜະລິດ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນກ່ອງບັນຈຸເດີມ, ປິດສະໝິດ, ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນອຸນຫະພູມຕ່ຳກວ່າ 30°C.
- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກມືເດັກ.

ຜະລິດໂດຍ:

ບໍລິສັດ ພັນທະມິດຟາມາຊຸຕິຄໍ ຈຳກັດ

ສະຖານທີ່: ບ້ານ ສີມມະໂນເໝືອ, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856-21-612 727

www.alliancepharmagroup.com