

ALIABROCITINIB

Generic name: Abrocitinib

Brand Name: ALIABROCITINIB

Composition:

Abrocitinib 100 mg

Indications:

- Indicated for adult and adolescent patients aged 12 years and above with refractory, moderate to severe atopic dermatitis.

Dosage:

- Use under the guidance of a physician.
- The routine recommended dose of this product is 100 mg, once daily.
- 200 mg orally once daily is recommended for those patients who are not responding to 100 mg once daily.
- Take tablets orally with or without food at approximately the same time each day. Swallow tablets whole with water. Do not crush, split, or chew.

Contraindications:

- Persons with hypersensitivity to the active ingredient or any excipient in the formulation.
- Those with active severe systemic infections, including tuberculosis.
- Patients with severe liver function impairment.
- Pregnant and lactating women.

Warning:

- Avoid using ALIABROCITINIB in patients with active and severe infections, such as: Pneumonia, Sepsis, Tuberculosis, Opportunistic infections.
- For patients with malignant tumors and lymphoproliferative diseases, the benefits and risks for individual patients should be considered.
- This product has not been approved for use in patients with rheumatoid arthritis (RA).
- This product should be avoided in patients with a potentially increased risk of thrombosis.
- ALIABROCITINIB treatment is associated with an increased incidence of thrombocytopenia and lymphopenia.

Adverse Effects:

- Nausea, headache, acne, herpes simplex, elevated blood phosphocreatine kinase, vomiting, dizziness, upper abdominal pain, infection.

Dosage form: Pink tablet.

Packaging: 14 tablets/bottle.

Expiry date: 24 months from the date of manufacture.

Storage:

- Store and sealed in original packaging at no more than 30°C.
- Keep out of the reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory

Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com

ເອກະສານກຳກັບຢາ ALIABROCITINIB

ຊື່ທົວໄປ: Abrocitinib

ຊື່ການຄ້າ: ALIABROCITINIB

ສ່ວນປະກອບ:

Abrocitinib100 mg

ຂໍ້ບັງໃຊ້:

- ຄົນເຈັບທີ່ເປັນພະຍາດຜິວໜັງອັກເສບ ມີສາເຫດມາຈາກພູມແພ້ ທີ່ມີອາການສະແດງອອກຂອງພະຍາດປານກາງຈົນເຖິງ ຂັ້ນຮຸນແຮງ, ນຳໃຊ້ສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ເດັກທີ່ມີອາຍຸ 12 ປີຂຶ້ນໄປ.

ວິທີໃຊ້:

- ນຳໃຊ້ຕາມຄຳແນະນຳຂອງແພດ.
- ຮັບປະທານ 100 mg ຕໍ່ມື້.
- ຫາກພົບເຫັນວ່າຄົນເຈັບບໍ່ມີການຕອບສະໜອງກັບປະລິມານຢາ ທີ່ໃຫ້ 100 mg ຕໍ່ມື້, ແນະນຳຄວນໃຫ້ເພີ່ມປະລິມານຢາຂຶ້ນເປັນ 200 mg ຕໍ່ມື້.
- ຮັບປະທານຢາກ່ອນ ຫຼື ຫຼັງອາຫານກໍໄດ້, ໃນແຕ່ລະມື້ໃຫ້ກິນກັບເວລາດຽວກັນ. ຫ້າມບິດ, ຫັກເມັດຢາ ຫຼື ຫຍ້າເມັດຢາ.

ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້:

- ຄົນເຈັບທີ່ມີອາການແຜ່ຢາລື ຫຼື ແຜ່ສ່ວນປະກອບຕ່າງໆໃນຕົວຢາ.
- ຄົນເຈັບທີ່ມີອາການຕິດເຊື້ອຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະ ພະຍາດວັນນະໂລກ.
- ຄົນເຈັບທີ່ມີພາວະການທຳງານຂອງຕັບຊຸດໂຊມຮຸນແຮງ.
- ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່.

ຄຳເຕືອນ:

- ຫຼັກລ່ຽງການໃຊ້ຢາ ALIABROCITINIB ກັບຄົນເຈັບທີ່ມີການຕິດເຊື້ອພະຍາດຮ້າຍແຮງເຊັ່ນ: ພະຍາດອັກເສບປອດ, ພະຍາດຊຶມເຊື້ອເລືອດ, ພະຍາດວັນນະໂລກ ແລະ ພະຍາດແຊກຊ້ອນອື່ນໆ.
- ສຳລັບຄົນເຈັບທີ່ເປັນເນືອງອກ, ມະເຮັງ ແລະ ພະຍາດຕ່ອມນ້ຳເຫຼືອງໃຫຍ່ ຄວນພິຈາລະນາເຖິງປະສິດທິຜົນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນກັບຄົນເຈັບ ເຊິ່ງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະບຸກຄົນ.
- ຢາບໍ່ໄດ້ຮັບການແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ສຳລັບຄົນເຈັບທີ່ເປັນພະຍາດປະດິງຂໍ້ (ຂໍ້ອັກເສບລູມາຕອຍ (RA)).
- ຄວນຫຼີກລ່ຽງການໃຊ້ຢາລື ກັບຄົນເຈັບທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການກ້າມຂອງເລືອດຮຸນແຮງ.
- ການປົນປົດດ້ວຍຢາ ALIABROCITINIB ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຈຳນວນເມັດເລືອດ ແລະ ເມັດເລືອດຂາວ ຊະນິດ lymphopenia ຕົກຕ່ຳຮຸນແຮງ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

- ປວດຮາກ, ເຈັບຫົວ, ເປັນສິວ, ເປັນຜືນ, ການທຳງານຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງຊຸດໂຊມ (elevated blood phosphocreatine kinase), ຮາກ, ວິນຫົວ, ເຈັບຫ້ອງພາກສ່ວນເທິງ, ມີພາວະການຕິດເຊື້ອ.

ຮູບແບບຂອງຢາ: ຢາເມັດສີປົວ.

ຂະໜາດບັນຈຸ: ບັນຈຸໃນກ່ອງ, 1 ກ່ອງມີ 14 ເມັດ.

ວັນທີອາຍຸ: 24 ເດືອນ ຫຼັງຈາກວັນທີຜະລິດ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນກ່ອງບັນຈຸເດີມ, ຫີປິດຟາສະໜິດ, ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນອຸນຫະພູມຕ່ຳກວ່າ 30°C.
- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກມືເດັກ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຮູບ ຈຳກັດ

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com