

ALIALOH3

Generic name: Aluminium hydroxide

Proprietary name: ALIALOH3

Composition: Aluminium hydroxide.....500mg

Indications:

- It is used to relieve stomach pain, heartburn and acid regurgitation caused by excessive gastric acid.

Dosage:

- Take after chewing. Adults should take 1-2 tablets, 3 times a day. Take half an hour before meals or during stomach pain attacks.

Contraindications:

- Contraindicated in patients with Appendicitis and acute abdominal pain.

Warning:

- This product should not be used continuously for more than 7 days.
- Use with caution in the first three months of pregnancy, for those with renal dysfunction, or for those with long-term constipation.
- Patients with hypophosphatemia should use it with caution.
- Patients with prostatic hypertrophy, glaucoma, hypertension, heart disease, gastrointestinal obstructive disease, hyperthyroidism, Ulcerative colitis, etc. should use it with caution.
- Prohibited for those who are allergic to this product.
- Avoid taking other medications within one hour after taking this medication.
- It should not be taken together with enteric coated tablets.

Adverse effects:

- Long term high-dose administration may cause severe constipation, and fecal agglomeration may cause Bowel obstruction.
- Long term use by the elderly can lead to osteoporosis.

Dosage form: Yellow tablets.

Expiry date: 24 months from the date of manufacture.

Packaging: 10 tablets/plate, 50 plates/box.

Storage:

- Protected from light, sealed, and stored at 20°C- 25°C.
- Keep out of reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory

Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com

ເອກະສານກຳກັບຢາ
ALIALOH3

ຊື່ທົ່ວໄປ: Aluminium hydroxide

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ: ALIALOH3

ສ່ວນປະກອບ: Aluminium hydroxide.....500mg

ຂໍ້ບັງໃຊ້:

- ໃຊ້ເພື່ອປັບເທົ່າອາການ ເຈັບກະເພາະ, ເຈັບແສບໃນກະເພາະ ທີ່ເປັນສາເຫດມາຈາກກົດໂຫລຍ້ອນ ແລະ ຂັບຫລັງກົດໃນກະເພາະອາຫານ.

ວິທີໃຊ້:

- ໃຊ້ຄ່ຽວຫຍ້າ ກິນກິນກັບນ້ຳ 1-2 ເມັດຕໍ່ຄັ້ງ, ວັນລະ 3 ຄັ້ງ ໂດຍມີໄລຍະຫ່າງ ກ່ອນ ແລະ ຫລັງການກິນ ອາຫານ ເຄິ່ງຊົ່ວໂມງ ຫລື ໃນລະຫວ່າງທີ່ມີອາການປວດໃນກະເພາະ.

ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້:

- ຫ້າມໃຊ້ໃນຄົນເຈັບທີ່ມີອາການໄສ້ຕິງອັກເສບ ແລະ ໃນຄົນເຈັບທີ່ມີອາການປວດຫ້ອງຢ່າງຮຸນແຮງ.

ຄໍາເຕືອນ:

- ບໍ່ຄວນໃຊ້ຢານີ້ຕິດຕໍ່ກັນເກີນ 7 ວັນ .
- ໃນແມ່ຍິງທີ່ຖືພາ ຕ່ຳກວ່າ 3 ເດືອນ ຄວນໃຊ້ຢ່າງລະມັດລະວັງ, ຄົນເຈັບທີ່ມີບັນຫາການທ່າງານຂອງ ໝາກໄຂ່ຫລັງຜິດປົກກະຕິ, ຄົນເຈັບທີ່ມີອາການຫ້ອງຜູກເປັນເວລານານ ຄວນລະມັດລະວັງໃນການນຳ ໃຊ້.
- ຄົນເຈັບທີ່ກວດພົບປະລິມານ ຟິສຟັດ ໃນເລືອດຕ່ຳ (hypophosphatemia) ຄວນລະມັດລະວັງໃນການໃຊ້.
- ຄົນເຈັບທີ່ມີບັນຫາກ່ຽວກັບຕ່ອມປີສຕັດ ຫລື ຕ່ອມລູກຫມາກໂຕ, ມີຄວາມດັນໃນຕາສູງ ຫລື ເປັນ ພະຍາດຕີຫິນ, ຄົນເຈັບທີ່ເປັນພະຍາດຄວາມດັນ, ເປັນພະຍາດຫົວໃຈ, ເປັນພະຍາດກ່ຽວກັບການອຸດ ຕັນທາງເດີນອາຫານ, ມີບັນຫາກ່ຽວກັບການທ່າງານຂອງຕ່ອມໄທລອຍ, ລຳໄສ້ໃຫຍ່ອັກເສບ ແລະ ອື່ນໆ ໃຫ້ນຳໃຊ້ຢ່າງລະມັດລະວັງ.
- ຫ້າມນຳໃຊ້ໃນຜູ້ແພ້ຢາມີ.
- ພາຍໃນ 1 ຊົ່ວໂມງ ຫລັງການກິນຢາມີ ຫລືກລ້ຽງການກິນຢາອື່ນ ເພາະຈະເກີດປະຕິກິລິຍາລະຫວ່າງ ຢາໄດ້.
- ບໍ່ຄວນນຳໃຊ້ຢາມີ ຮ່ວມກັບຢາເຄືອບ ປະເພດ Enteric coated tablets ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ການອອກລິດ ຂອງຢາບໍ່ມີປະສິທິຜົນໃນການປິ່ນປົວ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

- ການໃຊ້ຢາມີເປັນເວລານານຕິດຕໍ່ກັນ ອາດເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ ເກີດອາການຫ້ອງຜູກທີ່ຮຸນແຮງ, ເຮັດໃຫ້ ອາຈິມຈັບກັນແຫນ້ນ ເປັນບັນຫາເຮັດໃຫ້ລຳໄສ້ໃຫຍ່ອຸດຕັນໄດ້.
- ການນຳໃຊ້ຢາມີ ເປັນເວລານານໃນຜູ້ສູງອາຍຸ ສາມາດນຳໄປສູ່ພະຍາດກະດູກຜຸຍໄດ້.

ຮູບແບບຂອງຢາ: ເປັນຢາເມັດສີເຫຼືອງ.

ວັນຫມົດອາຍຸ: 24 ເດືອນ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ່ຜະລິດ.

ຂະໜາດບັນຈຸ: ບັນຈຸໃນກັບ, 1 ກັບມີ 50 ແຜງ, 1 ແຜງມີ 10 ເມັດ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນກັບກ່ອງ ບັນຈຸເດີມ, ບໍ່ໃຫ້ຖືກແສງແດດ ເກັບໄວ້ໃນຫ້ອງທີ່ມີ ອຸນຫະພູມ ລະຫວ່າງ 20°C-25°C.
- ເກັບຮັກສາຢາໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກມືເດັກ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຣຸບ ຈຳກັດ

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com

