

ເອກະສານກຳກັບຢາ ALIAMOX-500

ຊື່ທົວໄປ: Amoxicillin

ຊື່ການຄ້າ: ALIAMOX-500

ສ່ວນປະກອບ:

Amoxicillin.....500mg

ຂໍ້ບົງໃຊ້:

Amoxicillin 500mg ແມ່ນຢາຕ້ານເຊື້ອໃນກຸ່ມ (Penicillin-class) ນຳໃຊ້ເພື່ອປິ່ນປົວພະຍາດທີ່ເກີດເຊື້ອຈາກແບັກທີເຣຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການຕິດເຊື້ອໃນລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ, ຫູ, ດັງ, ຄໍ, ຜິວໜັງ ແລະ ການກຳຈັດເຊື້ອ *Helicobacter pylori* (ໃນກະເພາະອາຫານ) ໂດຍຕົວຢ່າງຈະອອກລິດໃນການຂ້າເຊື້ອແບັກທີເຣຍ.

ວິທີໃຊ້:

- **ສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່:** ໂດຍທົວໄປແມ່ນໃຫ້ຮັບປະທານ 250-500mg ວັນລະ 3 ຄັ້ງ ຫຼື 500-875mg ວັນລະ 2 ຄັ້ງ; ທັງນີ້ຂະໜາດຢາອາດມີການປ່ຽນແປງ ຂຶ້ນກັບຊະນິດ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຂອງການຕິດເຊື້ອ.
- ສາມາດຮັບປະທານກ່ອນ ຫຼື ຫຼັງອາຫານ ກໍໄດ້.

ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້:

- ບໍ່ຄວນໃຊ້ກັບຄົນເຈັບທີ່ເຄີຍແພ້ຕໍ່ກຸ່ມຢາ Penicillin.

ຂໍ້ຄວນລະວັງ:

- ຖ້າຕ້ອງນຳໃຊ້ໃນໄລຍະຍາວຄວນຕິດຕາມໜ້າທີ່ການທຳງານຂອງຕັບ ແລະ ໜ້າທີ່ການທຳງານຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງເປັນປະຈຳ.
- ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ຄວນໃຊ້ຢ່າງລະມັດລະວັງ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

ມີອາການ ປຸ້ນທ້ອງປວດຮາກ, ຮາກ, ຖອກທ້ອງ, ຄັນຕາມຕີນຕົວ(ຖ້າມີອາການແພ້ຢ່າງຮຸນແຮງ ຄວນຢຸດໃຊ້ຢານີ້ທັນທີ).

ຮູບແບບ: ແຄັບຊຸນສີນ້ຳຕານ-ເຫຼືອງ.

ວັນໝົດອາຍຸ: 3 ປີ ຫຼັງຈາກວັນຜະລິດ.

ຂະໜາດບັນຈຸ: ບັນຈຸ 50 ແຜງ, 1 ແຜງ ມີ 10 ແຄັບຊຸນ.

ການເກັບຮັກສາ: ເກັບຢາໄວ້ບ່ອນທີ່ມີອຸນຫະພູມຕໍ່າກວ່າ 30°C ເກັບໄວ້ບ່ອນທີ່ແຫ້ງ ແລະ ເກັບຢາໄວ້ຫ່າງໄກຈາກມື້ເຕັກນິກອຍ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຮູບ ຈຳກັດ.

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com

ALIAMOX-500

Generic name: Amoxicillin

Brand name: ALIAMOX-500

Composition:

Amoxicillin.....500mg

Indications:

Amoxicillin 500 mg is a common penicillin-class antibiotic used to treat bacterial infections like those in the respiratory tract, ear, nose, throat, skin and Helicobacter pylori eradication it works by killing bacteria

Dosage:

- **Adults:** Often 250-500 mg three times a day, or 500-875 mg twice a day, but dosage varies
- Can usually be taken before or after meals

Contraindications:

- Hypersensitivity to Penicillin.

Precautions:

- For long-term use, regular monitoring of hepatic function (liver) and renal function (kidney) is required.
- Pregnant and breastfeeding women should use the medication with caution.

Adverse effects:

Nausea and vomiting, diarrhea; rashes (hypersensitivity or toxic response: in case of serious reaction, discontinue treatment)

Dosage form: Brown-Yellow capsule.

Expiry date: 3 years after date of manufacture.

Packaging: 10 capsules per blister, 50 blisters per box.

Storage: Store below 30°C. Keep out of reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory

Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com