

ເອກະສານກຳກັບຢາ ALIAMPI-500

ຊື່ທົ່ວໄປ: Ampicillin

ຊື່ການຄ້າ: ALIAMPI-500

ສ່ວນປະກອບ:

Ampicillin.....500mg

ຂໍ້ບົ່ງໃຊ້:

Ampicillin ແມ່ນຢາຕ້ານເຊື້ອທີ່ອອກລົດຄວບຄຸມກວ້າງ (Broad-spectrum antibacterial) ຈາກການອັກເສບທາງເດີນປັດສະວະ, ຫູສ່ວນກາງອັກເສບ, ດັງ ແລະ ຄໍ, ສິບອັກເສບ, ຫູອດລົມອັກເສບ, ຫູອດປອດອັກເສບ, ປອດອັກເສບ, ເຍື່ອຜຸ່ມສະໝອງອັກເສບ. ລວມເຖິງການຕິດເຊື້ອຂອງລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈເທິງ ແລະ ລຸ່ມ.

ວິທີໃຊ້:

- **ສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່:** ກິນຄັ້ງລະ 500mg (1 ແຄັບຊູນ), ມື້ລະ 3-4 ຄັ້ງຕໍ່ມື້.
- **ສຳລັບເດັກນ້ອຍ:** ຄິດໄລ່ຕາມນ້ຳໜັກຕົວ 25mg /ກິໂລ, ໂດຍແບ່ງກິນ 2-4 ຄັ້ງຕໍ່ມື້.

ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້:

- ບໍ່ຄວນໃຊ້ກັບຄົນເຈັບທີ່ເຄີຍແພ້ຕໍ່ກຸ່ມຢາ Penicillin ຫຼື ແພ້ສ່ວນປະກອບອື່ນໆໃນຢາ.

ຂໍ້ຄວນລະວັງ:

- ລະມັດລະວັງການໃຊ້ຢາໃນຄົນເຈັບທີ່ມີອາການແພ້ຢາຕ້ານເຊື້ອໃນກຸ່ມ beta-lactam.
- ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ຄວນໃຊ້ຢາລະມັດລະວັງ.
- ຫ້າມໃຊ້ໃນຄົນເຈັບທີ່ມີບັນຫາໝາກໄຂ້ຫຼັງ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

- ມີອາການປວດຮາກ, ຮາກ, ຖອກທ້ອງ, ຄັນຕາມຜິວໜັງ.

ຮູບແບບ: ແຄັບຊູນສີແດງ-ຂາວ.

ວັນໝົດອາຍຸ: 36 ເດືອນ ຫຼັງຈາກວັນທີຜະລິດ.

ຂະໜາດບັນຈຸ: ແຜງລະ 10 ແຄັບຊູນ, ບັນຈຸ 50 ແຜງ/ກັບ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບໄວ້ບ່ອນບໍ່ມີແສງແດດ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມ ທີ່ມີອຸນຫະພູມຕໍ່າກວ່າ 30°C.
- ເກັບຢາໄວ້ຫ່າງໄກເດັກນ້ອຍ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຮູບ ຈຳກັດ.

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com

ALIAMPI-500

Generic name: Ampicillin

Brand name: ALIAMPI-500

Composition:

Ampicillin.....500mg

Indications:

Ampicillin is a broad-spectrum antibacterial agent used to treat various conditions such as UTIs, middle ear infections, and ENT inflammations. Its therapeutic scope extends to cheilitis, respiratory illnesses (bronchitis, pneumonia), and meningitis, providing comprehensive coverage for both upper and lower respiratory tract infections.

Dosage:

- Oral administration. Adults take 500mg (1 capsule) once, 3-4 times a day.
- The daily dose for children is 25mg/kg of body weight, 2-4 times a day.

Contraindications:

- Penicillin hypersensitivity or to any of the excipients.

Cautions:

- Caution should be exercised when administering this drug to patients with a hypersensitivity reaction to beta-lactam antibiotics.
- Use with caution in pregnant and breastfeeding women (lactation).
- Contraindicated in patients with renal impairment (kidney problems).

Adverse effects:

- Nausea, vomiting, diarrhea, rashes (discontinue treatment).

Dosage form: Red-White capsule.

Expiry date: 36 months after date of manufacture.

Packaging: 10 capsules per blister, 50 blisters per box.

Storage:

- Do not store above 30°C. Protect from sunlight and moisture.
- Keep away from the reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory

Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com