

ALIANARLIN

Generic name: Anamorelin hydrochloride

Brand Name: ALIANARLIN

Composition:

Anamorelin hydrochloride.....50mg

Indications:

- Treatment of cancer-related cachexia (wasting syndrome) due to malignant non-small cell lung cancer, gastric cancer, pancreatic cancer, and colorectal cancer.

Dosage:

- Use under the guidance of a physician.
- 100 mg taken orally on an empty stomach once daily.

Contraindications:

- Patients with a history of allergies to the ingredients of this preparation.
- Patients currently taking the following medications: Clarithromycin, Itraconazole, Voriconazole, Ritonavir, Cobicistat, and Ensitrelvir Fumaric Acid.

Warning:

- The use of this drug can lead to electrocardiogram abnormalities (obvious PR interval or prolonged QRS width, prolonged QT interval, etc.),
- Hyperglycemia may occur, blood glucose and urinary sugars should be measured regularly before and during drug administration.
- Given the possible liver dysfunction, liver function tests should be performed regularly before and during the use of this agent.
- Patients with congestive heart failure, myocardial infarction or angina may have suppressed heart function and worsening symptoms.
- Pregnant or breastfeeding women or women who might be pregnant may consider using this product if the therapeutic benefits outweigh the risks.

Adverse Effects:

- Hepatic impairment, hyperglycemia, gastrointestinal issues, conduction disorders.

Dosage form: Light yellow tablet.

Packaging: 10 tablets/blister, 10 blisters per box.

Expiry date: 48 months from the date of manufacture.

Storage:

- Store sealed in original packaging under 30°C.
- Keep out of reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory

Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com

ເອກະສານກຳກັບຢາ ALIANARLIN

ຊື່ທົວໄປ: Anamorelin hydrochloride

ຊື່ການຄ້າ: ALIANARLIN

ສ່ວນປະກອບ:

Anamorelin hydrochloride.....50mg

ຂໍ້ຍິງໃຊ້:

- ນຳໃຊ້ໃນການປິ່ນປົວ ອາການຈ່ອຍຜອມໜັງຫຸ້ມກະດູກ (cachexia) ທີ່ມີຜົນກະທົບມາຈາກ ການເປັນພະຍາດມະເຮັງປອດ (ຊະນິດທີ່ບໍ່ແມ່ນຈຸລັງນ້ອຍ), ມະເຮັງກະເພາະອາຫານ, ມະເຮັງມ້າມ ຫຼື ຕັບອ່ອນ ແລະ ມະເຮັງລຳໄສ້ໃຫຍ່.

ວິທີໃຊ້:

- ນຳໃຊ້ຕາມຄໍາແນະນຳຂອງແພດ.
- ກິນດ້ວຍປະລິມານ 100 mg ຕໍ່ມື້, ໃຫ້ກິນກ່ອນອາຫານ.

ຂັ້ນຕອນໃຊ້:

- ຫ້າມນຳໃຊ້ໃນຜູ້ທີ່ແຜ່ຢານີ ຫຼື ແຜ່ສ່ວນປະກອບໃນຕົວຢາ.
- ຫ້າມນຳໃຊ້ໃນຄົນເຈັບທີ່ກຳລັງໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອ ຫຼື ຢາດັງຕໍ່ໄປນີ້: Clarithromycin, Itraconazole, Voriconazole, Ritonavir, Cobicistat ແລະ Emsitrelvir Fumaric Acid.

ຄໍາເຕືອນ:

- ຢານີອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນຄື້ນກະແສໄຟຟ້າຫົວໃຈ (Electrocardiogram = ECG/EKG) (ຊ່ວງ PR interval ທີ່ຊັດເຈນ ຫຼື ຊ່ວງ QRS, ຊ່ວງ QT interval ທີ່ກວ້າງຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນ).
- ອາດເກີດພາວະນ້ຳຕານໃນເລືອດສູງ, ຄວນກວດຫາຄ່ານ້ຳຕານໃນເລືອດ ແລະ ຄ່ານ້ຳຕານ ໃນປັດສະວະ ເປັນປະຈຳ ໃນໄລຍະກ່ອນ ແລະ ລະຫວ່າງການໃຊ້ຢາ.
- ຢານີອາດເຮັດໃຫ້ເກີດພາວະການທຳງານຂອງຕັບຜິດປົກກະຕິ, ຄວນກວດຫາຄ່າການທຳງານ ຂອງຕັບ ເປັນປະຈຳ ໃນໄລຍະກ່ອນ ແລະ ລະຫວ່າງການໃຊ້ຢາ.
- ຄົນເຈັບທີ່ມີພາວະຫົວໃຈລົ້ມເຫຼວ, ກ້າມຊີ້ນຫົວໃຈຕາຍ ຫຼື ພະຍາດເສັ້ນເລືອດຫົວໃຈຕິບ ອາດເຮັດໃຫ້ການທຳງານຂອງຫົວໃຈຜິດປົກກະຕິ ແລະ ມີອາການຂຸດໂຊມລົງ.
- ແມ່ຍິງຖືພາ, ແມ່ຍິງທີ່ຢູ່ໃນໄລຍະໃຫ້ນົມລູກ ຫຼື ແມ່ຍິງທີ່ສົງໄສວ່າກຳລັງຖືພາ, ຄວນ ພິຈາລະນາໃນການນຳໃຊ້ຢານີ, ຖ້າເຫັນວ່າມີປະສິດທິຜົນ ຫຼາຍກວ່າຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະ ເກີດຂຶ້ນ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

- ໜ້າທີ່ການທຳງານຂອງຕັບຂຸດໂຊມ, ລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດສູງ, ພິບເຫັນບັນຫາຂອງລະບົບ ກະເພາະ-ລຳໄສ້, ພາວະການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈຜິດປົກກະຕິ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈຢຸດເຕັ້ນ.

ຮູບແບບຂອງຢາ: ຢາເມັດສີເຫຼືອງອ່ອນ.

ຂະໜາດບັນຈຸ: ບັນຈຸໃນກັບ, 1 ກັບມີ 10 ແຜງ, 1 ແຜງມີ 10 ເມັດ.

ວັນໝົດອາຍຸ: 48 ເດືອນ ຫຼັງຈາກວັນທີຜະລິດ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນກ່ອງບັນຈຸເດີມ, ປິດຝາໃຫ້ສະໝິດ ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນອຸນຫະພູມ ຕໍ່າກວ່າ 30°C.
- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກມືເດັກ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຽບ ຈຳກັດ

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com