

ALIAPCITETAN

Generic name: Aprocitentan tablets

Brand Name: ALIAPCITETAN

Composition:

Aprocitentan.....12.5mg

Indications:

- ALIAPCITETAN is an endothelin receptor antagonist indicated for the treatment of hypertension in combination with other antihypertensive drugs, to lower blood pressure in adult patients who have not had an adequate response to other drugs.

Dosage:

- The recommended dosage of ALIAPCITETAN is 12.5 mg orally once daily.
- Swallow tablets whole. ALIAPCITETAN may be taken with or without food.
- If a dose is missed, skip the missed dose and take the next dose at the regular time. Do not take two doses on the same day.

Contraindications:

- Contraindicated during pregnancy.
- Patients who are allergic to Aprocitentan or any of the excipients.

Warnings:

- ERAs may cause hepatotoxicity and liver failure. Measure serum aminotransferase levels and total bilirubin prior to initiation of treatment and repeat periodically during treatment and as clinically indicated.
- Monitor for signs and symptoms of fluid retention, weight gain, and worsening heart failure. If clinically significant fluid retention develops, treat appropriately, and consider discontinuation of ALIAPCITETAN.
- Decreases in hemoglobin.
- Decreased sperm count.

Adverse Effects:

- Most common adverse reactions are edema/fluid retention and anemia.

Dosage form: Yellow tablets.

Packaging: 30 tablets/bottle.

Expiry date: 24 months from the date of manufacture.

Storage:

- Store sealed in original packaging below 30°C.
- Keep out of the reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory

Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com

ເອກະສານກຳກັບຢາ ALIAPCITETAN

ຊື່ທົ່ວໄປ: Aprocitentan tablets

ຊື່ການຄ້າ: ALIAPCITETAN

ສ່ວນປະກອບ:

Aprocitentan12.5mg

ຂໍ້ບັງໃຊ້:

- Aprocitentan ແມ່ນຕົວຢາຊະນິດໜຶ່ງທີ່ ອອກລົດຕ້ານກັບຕົວຮັບ endothelin ນຳໃຊ້ໃນການປິ່ນປົວພະຍາດຄວາມດັນເລືອດສູງໃນຜູ້ໃຫຍ່ ໂດຍໃຊ້ຮ່ວມກັບຢາຫຼຸດຄວາມດັນຊະນິດອື່ນ ເຊິ່ງຄົນເຈັບມີພາວະການຕອບສະໜອງຕໍ່ຢາໄດ້ບໍ່ພຽງພໍ.

ວິທີໃຊ້:

- ປະລິມານທີ່ແນະນຳໃນການນຳໃຊ້ຂອງ Aprocitentan ແມ່ນ 12.5 mg, 1 ເທື່ອຕໍ່ມື້, ກິນກ່ອນ ຫຼື ຫຼັງອາຫານ.
- ຖ້າລືມກິນຢາ ແມ່ນໃຫ້ຂ້າມເວລານັ້ນໄປຈົນກວ່າຈະຮອດເວລາຄັ້ງຕໍ່ໄປ.
- ຫ້າມກິນຢາ ສອງຄັ້ງໃນມື້ດຽວກັນ.

ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້:

- ຫ້າມໃຊ້ກັບແມ່ຍິງໃນໄລຍະຖືພາ.
- ຄົນເຈັບທີ່ມີປະຫວັດການແພ້ຕໍ່ຢາ Aprocitentan ແລະ ສ່ວນປະກອບອື່ນໆໃນຕົວຢາ.

ຄຳເຕືອນ:

- ລະບົບການຕ້ານກັບຕົວຮັບ endothelin (endothelin receptor antagonist system(ERAs))ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນພິດຕໍ່ຕັບ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຕັບວາຍໄດ້, ຄວນໃຫ້ມີການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນໜ້າທີ່ການທຳງານຂອງຕັບ ດ້ວຍການວິເຄາະລະດັບ Aminotransferases ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ (ALT) (AST) ທັງສອງຊະນິດທີ່ບົ່ງບອກໃຫ້ຮູ້ເຖິງໜ້າທີ່ການທຳງານຂອງຕັບ, ແລະ ບີລິຣູບິນ(Bilirubin), ການວິເຄາະໃຫ້ເຮັດກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການປິ່ນປົວ, ປະເມີນເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ໃນລະຫວ່າງການປິ່ນປົວ ແລະ ປະຕິບັດຕາມການແນະນຳທາງດ້ານຄຣິນິກ.
- ສັງເກດອາການ ແລະ ສັນຍານເຕືອນຂອງການອັງກິດໃນຮ່າງກາຍ, ນ້ຳໜັກເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ພາວະຫົວໃຈລົມເຫຼວຊຸດໂຊມລົງ, ຫາກເກີດມີອາການດັ່ງກ່າວນີ້ ໃຫ້ຝຶກລະນາການປິ່ນປົວຢ່າງເໝາະສົມ ລວມທັງການຢຸດການນຳໃຊ້ຢາ.
- ຕົວຢາ Aprocitentan ສາມາດເຮັດໃຫ້ເສໂມໂກລບິນ (Hemoglobin) ຫຼຸດລົງ.
- ຕົວຢາ Aprocitentan ສາມາດເຮັດໃຫ້ຈຳນວນອະສຸຈິຫຼຸດລົງ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

- ອາການທີ່ພົບເຫັນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ: ອາການບວມ, ມີການອັງກິດໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ພາວະເລືອດຈາງ.

ຮູບແບບຂອງຢາ: ຢາເມັດສີເຫຼືອງ.

ຂະໜາດບັນຈຸ: ບັນຈຸໃນກ່ອງ, 1 ກ່ອງມີ 30 ເມັດ.

ວັນທີອາຍຸ: 24 ເດືອນນັບຫຼັງຈາກວັນທີ່ຜະລິດ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນກ່ອງບັນຈຸເດີມ, ປິດຝາສະໝິດ, ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນອຸນຫະພູມຕໍ່າກວ່າ 30°C.
- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກມື້ເດັກ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຣຸບ ຈຳກັດ

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com