

ALIAXITINIB

Generic name: Axitinib tablets

Brand Name: ALIAXITINIB

Composition:

Axitinib5mg

Indications:

- ALIAXITINIB is indicated for the treatment of adult patients with advanced renal cell carcinoma (RCC) who have experienced failure of at least one prior systemic therapy.

Dosage:

- Recommended starting dose: 5mg twice daily.
- If a strong CYP3A4/5 inhibitor is required, decrease the ALIAXITINIB dose by approximately half.
- For patients with moderate hepatic impairment, decrease the starting dose by approximately half.
- Swallow the whole tablet. ALIAXITINIB can be administered with food or on an empty stomach, and the time interval between the two administrations per day is approximately 12 hours.
- If a patient is vomiting or misses a dose, an additional dose should not be taken. The next prescribed dose should be taken as usual.

Contraindications:

- This product is contraindicated in patients who are allergic to axitinib or any of the excipients in this formulation.

Warnings:

- Hypertension and hypertensive crises.
- Arterial thromboembolic events.
- Venous thromboembolic events.
- During ALIAXITINIB treatment, symptoms of gastrointestinal perforation or fistula formation should be monitored regularly.
- Use ALIAXITINIB with caution in children, pregnant women and the elderly.

Adverse Effects:

- Such as diarrhea, hypertension, fatigue, loss of appetite, nausea, dysphonia, palmar-plantar erythrodysesthesia (hand-foot) syndrome, weight loss, vomiting, weakness and constipation.

Dosage form: Red tablets.

Packaging: 60 tablets/bottle.

Expiry date: 36 months from the date of manufacture.

Storage:

- Store sealed in original packaging below 30°C.
- Keep out of reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory

Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com

ເອກະສານກຳກັບຢາ
ALIAXITINIB

ຊື່ທົ່ວໄປ: Axitinib tablets

ຊື່ການຄ້າ: ALIAXITINIB

ສ່ວນປະກອບ:

Axitinib 5mg

ຂໍ້ບັງໃຊ້:

- ALIAXITINIB ໃຊ້ສຳລັບການປິ່ນປົວພະຍາດມະເຮັງຈຸລັງໝາກໄຂ່ຫຼັງໄລຍະແຜ່ລາມ, ໃນຜູ້ໃຫຍ່ (renal cell carcinoma (RCC)) ເຊິ່ງບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການປິ່ນປົວ ແລະ ບໍ່າບັດຢ່າງເປັນລະບົບມາແລ້ວຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງຄັ້ງມາກ່ອນໜ້ານີ້.

ວິທີໃຊ້:

- ປະລິມານທີ່ແນະນຳແມ່ນ 5 mg, 2 ເທື່ອຕໍ່ມື້, ໄລຍະຫ່າງກັນ 12 ຊົ່ວໂມງ.
- ຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຢາຕ້ານເອີ້ມໄຊ CYP3A4/5 inhibitor ທີ່ອອກລິດແຮງ, ໃຫ້ຫຼຸດປະລິມານຕົວຢ່າງ ALIAXITINIB ລົງປະມານເຄິ່ງໜຶ່ງ.
- ສຳລັບຄົນເຈັບທີ່ມີພາວະໜ້າທີ່ການທຳງານຂອງຕັບຊຸດໂຊມ ໃນໄລຍະປານກາງ ໃຫ້ຫຼຸດປະລິມານຢາລົງເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງປະລິມານທີ່ນຳໃຊ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນ.
- ໃຫ້ກິນຢາໝົດທັງເມັດ, ສາມາດນຳໃຊ້ ALIAXITINIB ກ່ອນ ຫຼື ຫຼັງອາຫານ (ໄລຍະທ້ອງຫວ່າງ).
- ຖ້າຄົນເຈັບລົມກິນຢາ ຫຼື ມີອາການຮາກຫຼັງຈາກກິນຢາແລ້ວ, ບໍ່ຄວນກິນຢາຄືນໃໝ່, ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກຳນົດເວລາຕາມປົກກະຕິໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ.

ຂ້າງໃຊ້:

- ຫ້າມໃຊ້ໃນຄົນເຈັບທີ່ມີອາການແຜ່ຢາ ALIAXITINIB ແລະ ແຜ່ສ່ວນປະກອບອື່ນໆໃນຕົວຢ່າງ.

ຄຳເຕືອນ:

- ຄົນເຈັບທີ່ມີພາວະຄວາມດັນເລືອດສູງ ແລະ ຄວາມດັນເລືອດສູງຂັ້ນຮຸນແຮງ.
- ໃນກໍລະນີທີ່ມີອາການອຸດຕັນຢູ່ເສັ້ນເລືອດແດງ.
- ໃນກໍລະນີທີ່ມີອາການອຸດຕັນຢູ່ເສັ້ນເລືອດດຳ.
- ໃນລະຫວ່າງການປິ່ນປົວດ້ວຍຢາ ALIAXITINIB ໃຫ້ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາເປັນປະຈຳອາການຂອງລຳໄສ້ຊອດ ຫຼື ການເກີດມີຮອຍຮົວໃນລະບົບທາງເດີນອາຫານ.
- ນຳໃຊ້ຢາ ALIAXITINIB ດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ ໃນເດັກ, ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

- ອາການທີ່ພົບເຫັນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ: ຖອກທ້ອງ, ຄວາມດັນເລືອດສູງ, ອ່ອນເພຍ, ເບືອອາຫານ, ປວດຮາກ, ຮາກ, ສຽງແຫບ, ມີອາການແຂນຂາຈັງ, ນ້ຳໜັກຫຼຸດລົງ ແລະ ທ້ອງຜູກ.

ຮູບແບບຂອງຢາ: ຢາເມັດສີແດງ.

ຂະໜາດບັນຈຸ: ບັນຈຸໃນກ່ອງ, 1 ກ່ອງມີ 60 ເມັດ.

ວັນທີມີອາຍຸ: 36 ເດືອນນັບຫຼັງຈາກວັນທີ່ຜະລິດ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນກ່ອງບັນຈຸເດີມ, ປິດຝາສະໝິດ, ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນອຸນຫະພູມຕ່ຳກວ່າ 30°C.
- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກມືເດັກ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຝາກມາ ກຮູບ ຈຳກັດ

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com