

ALIBELUMOSU

Generic name: Belumosudil mesylate

Brand Name: ALIBELUMOSU

Composition:

Belumosudil mesylate200mg

Indications:

- Treatment of chronic graft-versus-host disease (chronic GVHD) patients aged 12 years and older who have had insufficient response to glucocorticoid or other systemic therapies.

Dosage:

- Use under the guidance of a physician.
- Oral administration at 200mg once daily until chronic graft-versus-host disease progression requires new systemic therapy.
- Swallow tablets whole do not crush chew or break.
- Take this product with meals at approximately the same time every day.
- If a dose is missed, wait until the next scheduled dosage time, do not take extra doses to make up the missed dose.

Contraindications:

- Individuals who are allergic to any ingredient in this product.

Warnings:

- Pregnant women may cause harm to the fetus when using this product.
- Lactating women must stop breastfeeding during the treatment period and wait at least 1 week after the last dose is administered.
- Male or female fertility may be impaired. The effect on fertility is reversible.

Adverse Effects:

- Fatigue, edema, fever, nausea, diarrhea, difficulty breathing, hypertension, joint pain, decreased appetite.

Dosage form: Light yellow tablets.

Packaging: 30 tablets/bottle.

Expiry date: 24 Months after the date of manufacture.

Storage:

- Store sealed in original packaging, below 25°C.
- Keep out of reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory

Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com

ເອກະສານກຳກັບຢາ ALIBELUMOSU

ຊື່ທົວໄປ: Belumosudil mesylate

ຊື່ການຄ້າ: ALIBELUMOSU

ສ່ວນປະກອບ:

Belumosudil mesylate.....200mg

ຂ້າງໃຊ້:

- ໃຊ້ປິ່ນປົວພະຍາດຊຳເຮືອທີ່ກ່ຽວພັນກັບລະບົບການຕອບໂຕ້ຂອງພູມຄຸ້ມກັນໃນຮ່າງກາຍເຊັ່ນ: chronic graft- versus-host disease (chronic GVHD) ໃຊ້ໃນຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸ 12 ປີ ຂຶ້ນໄປ, ໃນຄົນເຈັບທີ່ມີຄວາມບົກຜ່ອງໃນການຕອບສະໜອງຕໍ່ການປິ່ນປົວດ້ວຍຢາ ກູ່ມສະເຕລອຍ (glucocorticoid) ຫຼື ໃຊ້ຮ່ວມກັບລະບົບການປິ່ນປົວແບບອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕອບໂຕ້ຂອງລະບົບພູມຄຸ້ມກັນໃນຮ່າງກາຍ.

ວິທີໃຊ້:

- ນຳໃຊ້ຕາມຄຳແນະນຳຂອງແພດ.
- ປະລິມານການນຳໃຊ້ ກິນ 200mg ຕໍ່ມື້ ເພື່ອປິ່ນປົວພະຍາດຊຳເຮືອ (chronic graft-versus-host disease) ມີຄວາມຈຳເປັນໃນການປິ່ນປົວ ແລະ ສືບຕໍ່ນຳໃຊ້ຈົນກວ່າການປິ່ນປົວຈະມີຜົນ.
- ຫ້າມທຸບ, ຫຍ້າ ຫຼື ບົດເມັດຢາ.
- ຄວນກິນຢາພ້ອມກັບອາຫານ ແລະ ກິນຢາໃນເວລາດຽວກັນທຸກໆວັນ.
- ກໍລະນີລືມກິນຢາ ຄວນຖ້າກິນໃນເວລາທີ່ກຳນົດໃນຄັ້ງຖິດໄປ, ບໍ່ຄວນກິນຢາຄືນໃໝ່.

ຂ້າງໃຊ້:

- ຫ້າມໃຊ້ຢາໃນຜູ້ທີ່ແພ້ຢາມີ ຫຼື ແພ້ຕໍ່ສ່ວນປະກອບ ທີ່ປະສົມໃນຕົວຢາ.

ຄຳເຕືອນ:

- ການໃຊ້ຢາມີສາມາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ເດັກໃນທ້ອງໄດ້, ຄວນແຈ້ງເຕືອນຄົນເຈັບກ່ອນການນຳໃຊ້ຢາ.
- ຄົນເຈັບທີ່ກຳລັງລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ແນະນຳຄວນໃຫ້ຢຸດການໃຫ້ນົມລູກ ໃນລະຫວ່າງການນຳໃຊ້ຢາປິ່ນປົວ, ຫຼັງຈາກການນຳໃຊ້ຢາປິ່ນປົວຄັ້ງສຸດທ້າຍໜຶ່ງອາທິດແລ້ວ ຈຶ່ງສາມາດໃຫ້ລູກກັບຄືນມາກິນນົມແມ່ໄດ້ອີກ.
- ຢາມີ ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຈະເລີນພັນທັງຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

- ອິດເມືອຍ, ບວມຕາມຕີນໂຕ, ເປັນໄຂ້, ປຸ້ນທ້ອງ, ຖອກທ້ອງ, ຫາຍໃຈລຳບາກ, ຄວາມດັນເລືອດສູງ, ປວດຕາມຂໍ້ກະດູກ, ບໍ່ຢາກອາຫານ.

ຮູບແບບຂອງຢາ: ຢາເມັດສີເຫຼືອງອ່ອນ.

ຂະໜາດບັນຈຸ: ບັນຈຸໃນກ່ອງ, 1 ກ່ອງມີ 30 ເມັດ.

ວັນໝົດອາຍຸ: 24 ເດືອນນັບຫຼັງຈາກວັນທີ່ຜະລິດ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ຮັກສາໄວ້ໃນກ່ອງເຕີມ ທີ່ປິດຝາສະໝິດ, ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນອຸນຫະພູມຕໍ່ກວ່າ 25°C.
- ເກັບຮັກສາຢາໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກມືເດັກ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຝາກມາ ກຮູບ ຈຳກັດ

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com