

ALIBERBE

Generic name: Berberine hydrochloride

Brand Name: ALIBERBE

Composition:

Berberine hydrochloride.....50mg.

Indications:

Suitable for intestinal infections such as gastro enteritis.

Dosage:

- adults: 2 ~ 6 tablets a time, 3 times a day.
- The dosage for children is shown in the table below.

Age (years)	Weight (kg)	A dose (tablet)	Times
1-3	10-15	1-2	3
4-6	16-21	2-3	
7-9	22-27	3-4	
10-12	28-32	4-5	

Contraindications:

Contraindicated in patients with hemolytic anemia and glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency.

Warning:

- Use with caution during the first three months of pregnancy.
- In case of overdose or serious adverse reactions, seek medical attention immediately.
- allergic people prohibited, allergic people with caution.
- Children must use it under adult supervision.
- If you are using other drugs, please consult your doctor or pharmacist before using this product.
- Elderly patients should follow the doctor's advice.

Adverse reaction:

Oral adverse reactions were rare, with occasional nausea, vomiting, rash, and fever, which disappeared after discontinuation.

Dosage form: Brown tablet.

Expiry date: 24 months from the date of manufacture.

Packaging: 10 Tablets/blister, 50 blisters/box

Storage:

- Shade, seal, and store in a dry place.
- Keep out of reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory.

Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-21-737 051.

www.alliancepharmagroup.com

ເອກະສານກຳກັບຢາ ALIBERBE

ຊື່ທົ່ວໄປ: Berberine hydrochloride

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ : ALIBERBE

ສ່ວນປະກອບ :

Berberine hydrochloride.....50mg.

ຂໍ້ບັງໃຊ້:

ໃຊ້ເພື່ອປົວການຕິດເຊື້ອໃນກະເພາະລຳໄສ້ ທີ່ເປັນສາເຫດພາໃຫ້ ອັກເສບ ແລະຖອກທ້ອງ.

ວິທີໃຊ້:

- ຜູ້ໃຫຍ່: ໃຊ້ກິນ 2 ~ 6 ເມັດຕໍ່ຄັ້ງ, ກິນສາມຄັ້ງ ຕໍ່ວັນ;
- ການໃຊ້ໃນເດັກ ພິຈາລະນາຕາມຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມ:

ອາຍຸ (ປີ)	ນ້ຳໜັກ (KG)	ປະລິມານທີ່ໃຊ້ (ເປັນເມັດ)	ຈຳນວນຄັ້ງທີ່ ກິນ(ໃນຫນຶ່ງວັນ)
1-3	10-15	1-2	3
4-6	16-21	2-3	
7-9	22-27	3-4	
10-12	28-32	4-5	

ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້:

ຫ້າມໃຊ້ໃນຄົນເຈັບທີ່ເປັນພະຍາດເລືອດຈາງ ແລະຄົນເຈັບທີ່ຂາດເຂັ້ມອັງຊີມ Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency.

ຄຳເຕືອນ:

- ໃຊ້ດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ ໃນແມ່ຍິງຖືພາອ່ອນ ກ່ອນ 3 ເດືອນ.
- ກໍລະນີໃຊ້ເກີນປະລິມານທີ່ກຳນົດ ຫຼືມີອາການຂ້າງຄຽງທີ່ຮຸນແຮງເກີດຂຶ້ນໃຫ້ປຶກສາແພດທັນທີ.
- ຫ້າມໃຊ້ໃນຜູ້ແພ່ຢາ, ໃຊ້ດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງໃນຄົນເຈັບທີ່ມີການແພ່.
- ການໃຊ້ຢາໃນເດັກຄວນມີການເຝົ້າລະວັງຕິດຕາມ ຈາກຜູ້ໃຫຍ່.
- ກໍລະນີມີການນຳໃຊ້ຢາອື່ນຢູ່ ຄວນມີການປຶກສາແພດ ຫຼືເພສິດຊະກອນ ກ່ອນນຳໃຊ້.
- ການໃຊ້ຢາໃນຜູ້ສູງອາຍຸ ຄວນປະຕິບັດຕາມການແນະນຳຂອງແພດ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

ການໃຊ້ຢາ ທາງການກິນ ບໍ່ຄ່ອຍພົບເຫັນອາການຂ້າງຄຽງ, ອາການຂ້າງຄຽງທີ່ເກີດຖືວ່າມີໜ້ອຍສຸດ ເຊັ່ນ: ປຸ້ນທ້ອງ, ຮາກ, ເປັນຜືນ, ມີອາການໄຂ້ ອາການເຫຼົ່ານັ້ນຈະຫາຍໄປ ເມື່ອຢຸດການນຳໃຊ້ຢາ.

ຮູບແບບຢາ: ຢາເມັດສີນ້ຳຕານ.

ວັນຫມົດອາຍຸ: 24 ເດືອນ ຫຼັງຈາກວັນທີ່ຜະລິດ.

ຂະໜາດບັນຈຸມັດຫໍ່: 1 ກີບມີ 50 ແຜງ, 1 ແຜງມີ 10 ເມັດ

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນກັບກ່ອງເຕີມ, ປິດຝາແຈບ, ຮັກສາໄວ້ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງບໍ່ໃຫ້ຖືກແສງແດດເກັບໄວ້ ໃນບ່ອນແຫ້ງ.
- ເກັບຮັກສາຢາໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກມືເດັກ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຣຸບ ຈຳກັດ.

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພິດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051.

www.alliancepharmagroup.com