

ALIBETEZIN

Generic name: Dapagliflozin

Brand Name: ALIBETEZIN

Composition:

Dapagliflozin.....10mg

Indications:

- Indicated as an adjunct to diet and exercise to improve glycemic control in adults with type 2 diabetes mellitus.
- Indicated to reduce the risk of hospitalization for heart failure in adults with type 2 diabetes mellitus and either established cardiovascular disease or multiple cardiovascular risk factors.
- Chronic Kidney Disease: Indicated to reduce the risk of sustained eGFR decline end stage kidney disease, cardiovascular death, and hospitalization for heart failure in adults with chronic kidney disease at risk of progression.
- Heart Failure: indicated to reduce the risk of cardiovascular death, hospitalization for heart failure (HF), and urgent heart failure visit in adults with HF.

Dosage:

- Blood glucose control: Oral administration. It is recommended to take it in the morning, with a starting dose of 5mg each time, once a day. According to blood sugar levels, the dosage can be increased to 10mg per dose, once a day.
- Heart failure or: Take 10mg orally once a day.
- Chronic kidney disease: 10mg orally once a day.

Contraindications:

- History of serious hypersensitivity reaction to the product.
- Contraindicated in dialysis patients.

Warning:

- This product is not applicable to type I diabetes or type I diabetes ketoacidosis.
- Dapagliflozin can cause osmotic diuresis, which may lead to reduced blood volume.
- In combination with sulfonylureas or insulin may cause hypoglycemia.
- Genital fungal infection.
- Pay attention to perineal necrotizing fasciitis.
- Pregnant and lactating women should use with caution.
- Use with caution for children.

Adverse effects:

- Renal impairment, female genital fungal infections, nasopharyngitis, and urinary tract infections.

Dosage form: Yellow tablets.

Expiry date: 24 months from the date of manufacture.

Packaging: 7 tablets/blister, 50 blisters/box.

Storage:

- Protected from light, sealed, and stored at 20°C- 25°C.
- Keep out of reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory

Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com

ເອກະສານກຳກັບຢາ ALIBETEZIN

ຊື່ທົວໄປ: Dapagliflozin

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ: ALIBETEZIN

ສ່ວນປະກອບ:

Dapagliflozin.....10mg

ຂໍ້ບັງໃຊ້:

- ໃຊ້ປິ່ນປົວຄົນເຈັບຫີມີບັນຫາກ່ຽວກັບພະຍາດຫົວໃຈ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນບັນດາຄວາມສ່ຽງການເສຍຊີວິດ ຈາກການຫຼຸດຕໍ່າຂອງ eGFR, ໂດຍສະເພາະໃນຄົນເຈັບຫີມີບັນຫາການຊດໂຊມຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງ ໄລຍະສຸດທ້າຍ, ປ້ອງກັນການເສຍຊີວິດຈາກ ບັນຫາຫົວໃຈເສັ້ນເລືອດ, ບັນຫາຫົວໃຈລົ້ມເຫລວໃນ ການທຳງານ.
- ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກການເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ເສັ້ນເລືອດ, ຫົວໃຈຢຸດທຳງານ, ຫົວໃຈລົ້ມເຫລວກະທັນຫັນໃນຄົນເຈັບຫີມີບັນຫາພະຍາດຫົວໃຈ.
- ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງການເສຍຊີວິດຈາກຫົວໃຈລົ້ມເຫລວໃນຄົນເຈັບຫີເປັນພະຍາດເບົາຫວານ ປະເພດ 2, ຫຼຸດຜ່ອນການເສຍຊີວິດ ຈາກບັນດາປັດໃຈທີ່ມາຈາກບັນຫາພະຍາດຫົວໃຈເສັ້ນເລືອດ.
- ປະກອບສ່ວນ ໃນການປັບລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດ ຈາກການຄວບຄຸມອາຫານ ແລະ ການອອກກຳລັງ ກາຍ ໃນຄົນເປັນພະຍາດເບົາຫວານ ປະເພດ 2.

ວິທີໃຊ້:

- ໃຊ້ເພື່ອຄວບຄຸມລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດ: ດ້ວຍການຮັບປະທານ ໃນຕອນເຊົ້າ ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍປະລິມານ 5mg ຕໍ່ຄັ້ງ ຕໍ່ວັນ ອີງຕາມລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດ, ສາມາດເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຮອດ 10mg ຕໍ່ຄັ້ງ ຕໍ່ວັນ.
- ໃຊ້ປ້ອງກັນການລົ້ມເຫລວ ຂອງພະຍາດຫົວໃຈ ໃຊ້ກິນໃນປະລິມານ 10mg ຕໍ່ວັນ.

ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້:

- ຫ້າມໃຊ້ໃນຄົນທີ່ມີຄວາມດັນເລືອດສູງທີ່ແຜ່ຕໍ່ຢານີ.
- ຫ້າມໃຊ້ໃນຄົນເຈັບຫີຟອກໝາກໄຂ່ຫຼັງ.

ຄຳເຕືອນ:

- ຢານີບໍ່ເໝາະສົມ ໃຊ້ໃນຄົນເຈັບຫີເປັນພະຍາດເບົາຫວານປະເພດ 1 ຫລື type I diabetes ketoacidosis.
- ລິດຂອງຢາ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການຂັບປັດສະວະເພີ່ມຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ປະລິມານເລືອດຫຼຸດລົງ.
- ການໃຊ້ຮ່ວມກັບຢາປົວພະຍາດເບົາຫວານຊະນິດອື່ນເຊັ່ນ sulfonylureas ຫລື insulin ສາມາດເຮັດໃຫ້ ປະລິມານນ້ຳຕານໃນເລືອດ ຕ່ຳກວ່າປົກກະຕິ.
- ການຕິດເຊື້ອລາ ໃນອະໄວຍະວະເພດ.
- ໃຊ້ຢ່າງລະມັດລະວັງໃນຄົນເຈັບຫີມີບັນຫາ ກ່ຽວກັບພະຍາດຜິວຫນັງ perineal necrotizing fasciitis.
- ລະມັດລະວັງ ການໃຊ້ໃນແມ່ຍິງຖືພາ ແມ່ຍິງທີ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່.
- ໃນເດັກຄວນໃຊ້ຢ່າງລະມັດລະວັງ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

- ການຕິດເຊື້ອລາໃນຊ່ອງຄອດໃນແມ່ຍິງ, ຊ່ອງດັງອັກເສບ, ການຕິດເຊື້ອໃນ ທາງເດີນປັດສະວະ.

ຮູບແບບຂອງເມັດຢາ: ຢາເມັດສີເຫລືອງ.

ວັນຫມົດອາຍຸ: 24 ເດືອນ ນັບຈາກວັນທີ່ຜະລິດ.

ຂະໜາດບັນຈຸ: ບັນຈຸໃນກັບ, 1 ກັບມີ 50 ແຜງ, 1 ແຜງມີ 7 ເມັດ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນກັບກ່ອງ ບັນຈຸເດີມ, ບໍ່ໃຫ້ຖືກແສງແດດ, ເກັບໄວ້ໃນຫ້ອງທີ່ມີອຸນຫະພູມລະຫວ່າງ 20°C-25°C.
- ເກັບຮັກສາ ຢາໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກມືເດັກ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຽບ ຈຳກັດ

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com