

ALIBEZUTIFA

Generic name: Belzutifan Tablets

Brand Name: ALIBEZUTIFA

Composition:

Belzutifan.....40mg

Indications:

- ALIBEZUTIFA is indicated for treatment of adult patients with von Hippel-Lindau (VHL) disease who require therapy for associated renal cell carcinoma (RCC), central nervous system (CNS) hemangioblastomas, or pancreatic neuroendocrine tumors (pNET), not requiring immediate surgery.

Dosage:

- The recommended dosage of ALIBEZUTIFA is 120 mg administered orally once daily until disease progression or unacceptable toxicity. ALIBEZUTIFA should be taken at the same time each day and may be taken with or without food.
- Advise patients to swallow whole tablets. Do not chew, crush, or split ALIBEZUTIFA prior to swallowing.
- If a dose of ALIBEZUTIFA is missed, it can be taken as soon as possible on the same day. Resume the regular daily dose schedule for ALIBEZUTIFA the next day. Do not take extra tablets to make up for the missed dose.
- If vomiting occurs any time after taking ALIBEZUTIFA, do not retake the dose. Take the next dose on the next day.

Contraindications:

- None.

Warning:

- Anemia: Monitor for anemia before initiation of and periodically throughout treatment with ALIBEZUTIFA.
- Withhold ALIBEZUTIFA until hemoglobin $\geq 8\text{g/dL}$, then resume at the same or reduced dose or discontinue.
- Hypoxia: Monitor oxygen saturation before initiation of, and periodically throughout, treatment with ALIBEZUTIFA.

Adverse Effects:

- Decreased hemoglobin, fatigue, increased creatinine, headache, dizziness, increased glucose, and nausea.

Dosage form: Blue oval tablets.

Packaging: 90 tablets/bottle.

Expiry date: 24 months from the date of manufacture.

Storage:

- Store at room temperature not exceeding 30°C.
- Please keep out of the reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory
Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR
Tel: +856-21-737 051
www.alliancepharmagroup.com

ເອກະສານກຳກັບຢາ ALIBEZUTIFA

ຊື່ທົວໄປ: Belzutifan Tablets

ຊື່ການຄ້າ: ALIBEZUTIFA

ສ່ວນປະກອບ:

Belzutifan 40mg

ຂໍ້ບົງໃຊ້:

- ALIBEZUTIFA ໃຊ້ສຳລັບການປິ່ນປົວຄົນເຈັບຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ເປັນພະຍາດ von Hippel-Lindau (VHL) ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການບຳບັດມະເຮັງຈຸລັງໝາກໄຂ່ຫຼັງຊະນິດ renal cell carcinoma (RCC), ເນື່ອງອກໃນລະບົບປະສາດສ່ວນກາງ hemangioblastomas (CNS), ຫຼື ເນື່ອງອກໃນມ້າມຊະນິດ (pancreatic neuroendocrine tumors) ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຜ່າຕັດໃນຫັນທີ.

ວິທີນຳໃຊ້:

- ປະລິມານຢາທີ່ແນະນຳຂອງ ALIBEZUTIFA ຄື: 120 mg ກິນມື້ລະ 1 ຄັ້ງ ການປິ່ນປົວແມ່ນຮັກສາຈົນກວ່າຈະບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມການແຜ່ລາມ ຫຼື ເກີດພິດເບື້ອງຈາກຢາໃນລະດັບທີ່ຮ້າງກາຍບໍ່ສາມາດຮັບໄດ້ ຄວນກິນຢາ ALIBEZUTIFA ໃນເວລາດຽວກັນທຸກມື້ ສາມາດກິນຝ່ອມ ຫຼື ບໍ່ຝ່ອມກັບອາຫານກໍໄດ້.
- ແນະນຳໃຫ້ຄົນເຈັບເວລາກິນຢາ ຫ້າມຢ້າ, ປິດ ຫຼື ແບ່ງເມັດຢາ ALIBEZUTIFA ກ່ອນກິນ.
- ຖ້າລົມກິນຢາ ALIBEZUTIFA ໃຫ້ກິນຢາທັນທີໃນມື້ດຽວກັນ ແລ້ວຈຶ່ງສືບຕໍ່ກິນຕາມກຳນົດໃນມື້ຕໍ່ໄປ. ຫ້າມກິນຢາເພື່ອທົດແທນໃນກໍລະນີທີ່ລົມກິນຢາ.
- ຖ້າເກີດອາການຮາກ ຫຼັງຈາກກິນຢາ ALIBEZUTIFA ບໍ່ໃຫ້ຄົນເຈັບກິນຢາຊ້າ, ແຕ່ໃຫ້ກິນໃນມື້ຕໍ່ໄປ.

ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້:

- ບໍ່ມີ.

ຄຳເຕືອນ:

- ພະຍາດເລືອດຈາງ (Anemia): ກວດເບິ່ງພະຍາດເລືອດຈາງກ່ອນເລີ່ມກິນຢາ ແລະ ກວດເປັນໄລຍະຕະຫຼອດຊ່ວງການປິ່ນປົວດ້ວຍຢາ ALIBEZUTIFA.
- ໃຫ້ຢຸດນຳໃຊ້ຢາ ALIBEZUTIFA ກ່ອນຈົນກວ່າການວິເຄາະຄ່າ hemoglobin ຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ≥ 8 g/dL, ຈາກນັ້ນຈຶ່ງກິນຢາຕໍ່ໃນປະລິມານເດີມ ຫຼື ຫຼຸດປະລິມານລົງ ຫຼື ຢຸດກິນຢາຖາວອນຕາມຄຳແນະນຳຂອງແພດໝໍ.
- ພາວະຂາດອອກຊີເຈນ (Hypoxia): ຕ້ອງກວດຄ່າອອກຊີເຈນໃນເລືອດ ກ່ອນເລີ່ມກິນຢາ ແລະ ກວດເປັນໄລຍະຕະຫຼອດການປິ່ນປົວດ້ວຍ ALIBEZUTIFA.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

- ຄ່າ hemoglobin ຕ່ຳ, ອ່ອນເພຍ, ຄ່າ creatinine ສູງຂຶ້ນ, ເຈັບຫົວ, ວິນຫົວ, ນ້ຳຕານໃນເລືອດສູງຂຶ້ນ ແລະ ປວດຮາກ.

ຮູບແບບຂອງຢາ: ຢາເມັດຮູບໄຂ່ສີຟ້າອ່ອນ.

ຂະໜາດບັນຈຸ: ບັນຈຸໃນກ່ອງ, 1 ກ່ອງມີ 90 ເມັດ.

ວັນຫມົດອາຍຸ: 24 ເດືອນ ນັບຫຼັງຈາກວັນທີຜະລິດ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງບໍ່ໃຫ້ເກີນ 30°C.
- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກມື້ເຕັກ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຮູບ ຈຳກັດ

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com