

ALICAPASE

Generic name: Capivasertib

Brand Name: ALICAPASE

Composition: Capivasertib..... 200mg.

Indications:

Capivasertib is a kinase inhibitor indicated, in combination with fulvestrant for the treatment of adult patients with hormone receptor (HR)-positive, human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)-negative, locally advanced or metastatic breast cancer with one or more PIK3CA/AKT1/PTEN-alterations.

Dosage:

2 tablets orally twice daily, taken with or without food. for 4 days followed by 3 days off.

Contraindications:

Allergies to any component of this product.

Warning:

- Regularly monitor blood sugar during treatment, and if there is an increase in blood sugar, reduce or discontinue medication according to the situation.
- Monitor the signs and symptoms of diarrhea in patients. It is recommended that patients increase their oral rehydration and begin antidiarrheal treatment when there are signs of diarrhea after taking this product.
- Serious skin adverse reactions may occur during the use of this medication.
- Female patients should take effective contraceptive measures during the medication period and within one month of the last administration, while male patients should take effective contraceptive measures during the medication period and within four months of the last administration.
- Pregnant and lactating women should use it with caution.
- Attention should be paid to the contraindications of fulvestrant when combined with fulvestrant.

Adverse Effects:

Diarrhea, skin adverse reactions, elevated blood glucose, decreased lymphocytes, decreased hemoglobin, nausea and fatigue, leukopenia, increased triglycerides, neutropenia, elevated creatinine, vomiting, stomatitis.

Dosage form: White tablets.

Packaging: 64 tablets/bottle.

Expiry date: 24 months from the date of manufacture.

Storage:

- Protected from light, sealed in original packaging, and stored between 20°C- 25°C.

- Keep out of reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory.

Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-21-737 051.

www.alliancepharmagroup.com

ເອກະສານກຳກັບຢາ ALICAPASE

ຊື່ທົວໄປ: Capivasertib tablet

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ: ALICAPASE

ສ່ວນປະກອບ: Capivasertib..... 200mg.

ຂໍ້ບົງໃຊ້:

Capivasertib ຖືກນຳໃຊ້ເປັນຢາປິ່ນປົວມະເຮັງ ເຖົ້າມີມ ທີ່ມີການອອກລິດໃນການຢັບຢັງໃນການເຄື່ອນໄຫວ Kinase inhibitor, ໃຊ້ຮ່ວມກັບຢາ fulvestrant ເພື່ອປິ່ນປົວ ມະເຮັງເຖົ້າມີມ ຜ່ານການກວດຫຼີກການຍື່ນຢືນ ດ້ວຍການພົບ Hormone receptor (HR)-positive ຫຼື Human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)-negative, ສາມາດໃຊ້ໃນເວລາພົບເຊື້ອກຳລັງຮຸກຮານສະເພາະທີ່ ຫຼື ມີການແຕ່ງກະຈ່າຍຂອງເຊື້ອແລ້ວ ຫຼື ໃນໄລຍະ PIK3CA/AKT1 /PTEN-alterations.

ວິທີໃຊ້:

ໃຊ້ຮັບປະທານ 2 ເມັດຕໍ່ຄັ້ງ, ມື້ໜຶ່ງ ກິນສອງຄັ້ງ, ຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາ 4 ວັນ ແລະ ພັກ 3 ວັນຖັດມາ, ສາມາດກິນກ່ອນ ຫຼື ຫຼັງອາຫານໄດ້.

ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້:

ຫ້າມໃຊ້ໃນຜູ້ແພ່ຢາມີ.

ຄຳເຕືອນ:

- ໃນລະຫວ່າງການນຳໃຊ້ຢາ ຄວນມີການກວດວັດລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດ ຖ້າພົບວ່າລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດສູງຂຶ້ນ ຄວນປັບຂະໜາດຂອງຢາລົງ ຫຼື ຢຸດການນຳໃຊ້ ຂຶ້ນກັບສະພາບ ແລະ ອາການຂອງຄົນເຈັບ.
- ຕິດຕາມ ບັນດາສັນຍານ ແລະ ອາການຖອກທ້ອງຂອງຄົນເຈັບ ກໍລະນີພົບອາການຖອກທ້ອງແຮງຂຶ້ນ ຄວນໃຫ້ດື່ມນ້ຳເກືອແຮ່ ອໍລາລິດ ເພື່ອທົດແທນການເສຍນ້ຳ ຫຼື ໃຫ້ຢາຕ້ານອາການຖອກທ້ອງຕາມສະພາບ ແລະ ອາການຂອງຄົນເຈັບໃນຊ່ວງກຳລັງໃຊ້ຢານີ້ໃນການປິ່ນປົວ.
- ໃນໄລຍະໃຊ້ຢານີ້ ອາດເກີດອາການແພ່ ທາງຜິວຫນັງ.
- ໃນລະຫວ່າງການໃຊ້ຢາ ຄວນລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບມາດຕະການ ແລະ ການນຳໃຊ້ຢາຄຸມກຳເນີດ ສາມາດເກີດປະຕິກິລິຍາປະກັນໄດ້, ການນຳໃຊ້ຢາຄຸມ ຄວນນຳໃຊ້ ຫຼັງການຢຸດໃຊ້ຢານີ້ຢ່າງຫນ້ອຍ 4 ເດືອນ ນັບຈາກ ວັນສຸດທ້າຍຂອງການໃຫ້ຢາ.
- ແມ່ຍິງຖືພາ ຫຼື ແມ່ຍິງທີ່ກຳລັງລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່ ຄວນໃຊ້ຢາລະມັດລະວັງ ສາມາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ເດັກ ແລະ ແມ່ໄດ້.
- ການໃຊ້ຢາຮ່ວມກັບ Fulvestrant ຄວນມີການຕິດຕາມລະວັງ ປະຕິກິລິຍາ ແລະ ອາການສົນອາດເກີດແຮງຂຶ້ນ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

ໃນລະຫວ່າງການນຳໃຊ້ຢາ ສາມາດເກີດ ອາການຖອກທ້ອງ, ປະຕິກິລິຍາ ອາການທາງຜິວຫນັງ, ການປ່ຽນແປງລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດເພີ່ມຂຶ້ນ, ເມັດເລືອດຂາວຕ່ຳ, ເມັດເລືອດແດງຕ່ຳ, ປຸ່ນທ້ອງ, ເມືອຍ, Triglycerides ເພີ່ມຂຶ້ນ, Creatinine ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຮາກ, ເຈັບກະເພາະ ເປັນຕົ້ນ.

ຮູບແບບຂອງຢາ: ເປັນເມັດ ສີຂາວ.

ວັນຫມົດອາຍຸ: 24 ເດືອນ ນັບຈາກວັນຜະລິດ.

ຂະໜາດບັນຈຸ: ບັນຈຸໃນກ່ອງ, 1 ກ່ອງມີ 64 ເມັດ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນກັບກ່ອງ ບັນຈຸເດີມ, ບໍ່ໃຫ້ຖືກແສງແດດ ເກັບໄວ້ໃນອຸນຫະພູມ ລະຫວ່າງ 20°C-25°C.
- ເກັບຮັກສາ ຢາໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກມື້ເດັກ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຽບ ຈຳກັດ.

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com