

ALICETIZINE

Generic name: Cetirizine hydrochloride

Brand Name: ALICETIZINE

Composition:

Cetirizine hydrochloride.....10 mg.

Indications:

- Symptomatic treatment of seasonal rhinitis, perennial allergic rhinitis, allergic conjunctivitis and itching and urticaria caused by allergies.

Dosage:

- By mouth. Recommended for adults and children over 6 years old.
- Adults: 1 tablet at a time, can be taken with a small amount of liquid at dinner, if sensitive to adverse reactions, can be taken once in the morning and once in the evening, half a tablet at a time.
- Children aged 6-12: 1 tablet at a time, once a day; Or half a tablet, twice a day.

Contraindications:

- Contraindicated in persons allergic to the ingredients, hydroxyzine or any other piperazine derivatives.
- It is prohibited for patients with severe renal impairment.

Warning:

- This medication may impair thinking and reaction time. Avoid driving, operating machinery, or performing tasks that require full alertness while taking this medication.
- Alcohol consumption is strictly prohibited during the use of this medication, as it may increase the risk of adverse side effects.
- Patients taking this medication in combination with other drugs should consult their doctor prior to use. This includes cold medicines, antihistamines, narcotic pain relievers, sedatives, muscle relaxants, antidepressants, anti-anxiety drugs, and anti-seizure medications.

Adverse Effects:

- headache, dizziness, drowsiness, agitation, dry mouth, abdominal discomfort.

Dosage form: Green tablet

Expiry date: 36 months from the date of manufacture.

Packaging: 10 tablets/blister, 10 blisters/box

Storage:

- Shade, seal and store in a dry place below 25°C.
- Keep out of reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory

Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com

ເອກະສານກຳກັບຢາ ALICETIZINE

ຊື່ທົວໄປ: Cetirizine hydrochloride

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ: ALICETIZINE

ສ່ວນປະກອບ:

Cetirizine hydrochloride.....10 mg.

ຂໍ້ຍິງໃຊ້:

- ໃຊ້ເປັນຢາຕ້ານອາການແຂ້ວ ຕ້ານການທ່າງານຂອງ ອິດສະຕາມິນ (Antihistamine) ໃຊ້ຫຼຸດຜ່ອນອາການແຂ້ວ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນອາການເປັນຫວັດ, ຫຼຸດຜ່ອນອາການຄັນ ເປັນຜົນ ທີ່ເກີດຈາກອາການແຂ້ວຕ່າງໆ.

ວິທີໃຊ້:

- ໃຊ້ຮັບປະທານ, ສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍ 6 ປີຂຶ້ນໄປ.
- ຜູ້ໃຫຍ່: ກິນ 1 ເມັດຕໍ່ຄັ້ງ, ສາມາດກິນພ້ອມກັບນ້ຳໃນປະລິມານເລັກນ້ອຍໃນຊ່ວງອາຫານແລງ, ຫາກມີອາການສືນຕໍ່ຜົນຂ້າງຄຽງ, ສາມາດແບ່ງກິນ 2 ຄັ້ງ ໃນຕອນເຊົ້າ ແລະ ຕອນແລງ.
- ເດັກນ້ອຍ 6-12 ປີ: ກິນ 1 ເມັດຕໍ່ຄັ້ງ ຫຼື ແບ່ງກິນ 2 ຄັ້ງ ໃນຕອນເຊົ້າ ແລະ ຕອນແລງ.

ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້:

- ຫ້າມໃຊ້ໃນຜູ້ທີ່ມີການແຂ້ວ ຢາມີ ຫຼື ແຂ້ວສ່ວນປະກອບໃນຕົວຢາເຊັ່ນ: Hydroxyzine ຫຼື ບັນດາອານຸພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ອື່ນໆເປັນຕົ້ນ Piperazine Derivatives.
- ຫ້າມໃຊ້ໃນຄົນເຈັບຫີມີ ພາວະຕັບ ແລະ ໝາກໄຂ່ຫຼັງຊຸດໂຊມ ລວມທັງຜູ້ສູງອາຍຸ ແມ່ຍິງທີ່ຢູ່ໃນລະຫວ່າງຖືພາ ຫຼື ລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່ ການໃຊ້ຕ້ອງຜ່ານການປຶກສາແພດ.

ຄຳເຕືອນ:

- ຢາມີຜົນຂ້າງຄຽງຕໍ່ ຂະບວນການໃນການຄິດ ແລະ ການຕອບສະໜອງ ດັ່ງນັ້ນ ຄວນຫຼີກເວັ້ນການຂັບລົດ ການທ່າງານກັບເຄື່ອງກົນຈັກ ຫຼື ກິດຈະກຳທີ່ຕ້ອງຕື່ນຕົວຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ.
- ຫ້າມດື່ມເຫຼົ້າຫຼຸກຊະນິດ ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ຢາມີ ເພາະສາມາດເພີ່ມຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ບໍ່ປາຖະໜາ.
- ຜູ້ທີ່ກຳລັງໃຊ້ຢາອ່ວມກັບ ຢາຊະນິດອື່ນເຊັ່ນ ຢາແກ້ຫວັດ, ຢາແກ້ແຂ້ວຊະນິດອື່ນ, ຢາແກ້ປວດຊະນິດເສບຕິດ, ຢາບອນຫຼັບ, ຢາຄາຍກ້າມເນື້ອ, ຢາປິ່ນປົວອາການຊຶມເສົ້າ, ຢາຕ້ານການວິຕົກກັງວົນ, ບັນດາຢາຕ້ານອາການຊັກ ຄວນແຈ້ງໃຫ້ແພດຊາບທຸກຄັ້ງກ່ອນການໃຊ້ຢາມີ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

- ຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ມັກພົບ ມີ: ວິນວຽນ, ມືນງຶງ, ປວດຫົວ, ອ່ອນເພຍ, ມີອາການຖືກກົດປະສາດ ງ່ວງຊຶມ, ປາກແຫ້ງ, ຮຸ່ນຕາຂະຫຍາຍ, ມີອາການຄັນ, ຫົວໃຈເຕັ້ນໄວຜິດປົກກະຕິ, ຕົວສືນ, ປັດສະວະບໍ່ອອກ, ນອນບໍ່ຫລັບ.

ຮູບແບບຢາ: ຢາເມັດສີຂຽວ.

ວັນຫມົດອາຍຸ: 36 ເດືອນ ນັບຈາກວັນທີ່ຜະລິດ.

ຂະໜາດບັນຈຸມັດທຳ: 1 ກັບມີ 10 ແຜງ, 1 ແຜງມີ 10 ເມັດ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນກັບກ່ອງບັນຈຸເດີມ, ບໍ່ໃຫ້ຖືກແສງແດດ, ເກັບໄວ້ໃນບ່ອນແຫ້ງ ອຸນຫະພູມ ຕ່ຳກວ່າ 25°C.
- ເກັບຮັກສາຢາໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກມືເດັກ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຣຸບ ຈຳກັດ

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com