

ALICIM

Generic name: Cimetidine

Brand name: ALICIM

Composition:

Cimetidine..... 400mg

Indications:

- It is used to treat duodenal ulcers, gastric ulcers, reflux esophagitis, upper gastrointestinal bleeding, stress ulcer and Zollinger-Ellison syndrome.

Dosage:

- For adults, 800mg/ day, divided into 2 times (after breakfast and before bed); When used to improve gastric mucosal lesions, 400mg is taken orally before going to bed every day.

Contraindications:

- It should not be used by those allergic to this product.

Warning:

- Pregnant and lactating women are prohibited.
- Children and the elderly should be used under the guidance of doctors.
- Use with caution in patients with liver and kidney dysfunction, serious heart and respiratory diseases, chronic inflammation, and liver dysfunction.

Adverse Effects:

- Common nausea, vomiting, bitter mouth, dry mouth, diarrhea, bloating and so on. It can also cause dizziness, lethargy and mental disorders. Large doses can cause male breast development, galactorrhea, decreased libido or impotence, and can induce hepatic coma in patients with cirrhosis. It can cause liver damage and elevate ALT.

Dosage form: Light green tablets.

Expiry date: 24 months from the date of manufacture.

Packaging: 10 Tablets/blister, 50 blisters/box.

Storage:

- Store in original packaging in a dry place (not exceeding 30 °C).
- Please keep out of reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory

Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com

ເອກະສານກຳກັບຢາ ALICIM

ຊື່ທົ່ວໄປ: Cimetidine

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ: ALICIM

ສ່ວນປະກອບ:

Cimetidine..... 400mg

ຂໍ້ບົງໃຊ້:

- ໃຊ້ປິ່ນປົວອາການ ອັກເສບບາດແຜລຳໄສ້ນ້ອຍສ່ວນຕົ້ນ, ອັກເສບກະເພາະອາຫານ, ອາການກົດໄຫຼຍ້ອນ, ອາການເລືອດໄຫຼ ໃນກະເພາະລຳໄສ້ສ່ວນເທິງ, ບາດແຜກະເພາະ ທີ່ເກີດຈາກອາການຄຽດ, ກຸ່ມອາການຂອງພະຍາດ Zollinger-Ellison syndrome.

ວິທີໃຊ້:

- ສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ໃຊ້ກິນ 800mg ຕໍ່ວັນ, ໂດຍແບ່ງກິນ 2 ຄັ້ງ (ຫຼັງອາຫານເຊົ້າ ແລະກ່ອນນອນ); ກໍລະນີໃຊ້ປິ່ນປົວເຍືອຫຸ້ມກະເພາະທີ່ເປັນບາດແຜ ໃຫ້ໃຊ້ໃນປະລິມານ 400mg ກິນກ່ອນນອນທຸກວັນ.

ຂັ້ນຕອນໃຊ້:

- ຫ້າມໃຊ້ໃນຜູ້ທີ່ແຜ່ຢານີ.

ຄຳເຕືອນ:

- ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະແມ່ຍິງທີ່ກຳລັງລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່ ຫ້າມໃຊ້ຢານີ.
- ການໃຊ້ຢານີ ໃນເດັກນ້ອຍ ແລະຜູ້ສູງອາຍຸ ຄວນໄດ້ຮັບການຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດຈາກແພດ.
- ຄົນເຈັບທີ່ມີບັນຫາ ການທຳງານຂອງຕັບ ແລະ ໝາກໄຂ່ຫຼັງຜິດປົກກະຕິ, ຜູ້ທີ່ມີພະຍາດຫົວໃຈ ແລະບັນຫາກ່ຽວກັບລະບົບຫາຍໃຈຮຸນແຮງ ແລະຜູ້ທີ່ມີແຜອັກເສບຊຳເຮືອ ຄວນລະມັດລະວັງໃນການນຳໃຊ້.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

- ຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ມັກພົບ ປຸ້ນທ້ອງ, ຮາກ, ຂົມປາກ, ປາກແຫ້ງ, ຖອກທ້ອງ, ທ້ອງອິດ ແລະອື່ນໆ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງພົບ ອາການວິນວຽນຫົວ ງ່ວງຊຶມ, ມີສະພາບປັ່ນປ່ວນຈິດປະສາດ, ການນຳໃຊ້ໃນປະລິມານສູງ ສາມາດເຮັດໃຫ້ ເກີດອາການນິມໃຫຍ່ ໃນເພດຊາຍ ເກີດອາການ Galactorrhea, ອາລິມທາງເພດຫຼຸດລົງ, ສູນເສຍຄວາມອິດທິນ ອາດເຮັດໃຫ້ຕັບເປັນອຳມະພາດ ແລະຖືກທຳລາຍ ປະລິມານ ອັງຊິມ ALT ເພີ່ມຂຶ້ນສູງໃນເລືອດ.

ຮູບແບບຂອງຢາ: ເປັນຢາເມັດສີຂຽວອ່ອນ.

ວັນໝົດອາຍຸ: 24 ເດືອນ ນັບຫຼັງຈາກວັນທີ່ຜະລິດ.

ຂະໜາດການບັນຈຸ: 1 ກັບມີ 50 ແຜງ, 1 ແຜງມີ 10 ເມັດ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບຮັກສາຢາໄວ້ໃນກັບກ່ອງເດີມ, ປິດສະໝິດ, ໃນພື້ນທີ່ແຫ້ງ, ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນອຸນຫະພູມຕ່ຳກວ່າ 30 °C
- ເກັບຮັກສາຢາໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກມືເດັກ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຮູບ ຈຳກັດ

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com