

# ເອກະສານກຳກັບຢາ ALICOLD

**ຊື່ທົ່ວໄປ:** Paracetamol; Chlorpheniramine maleate; Phenylephrine HCL.

**ຊື່ຜະລິດຕະພັນ:** ALICOLD

**ສ່ວນປະກອບ:**

Paracetamol.....500mg  
Chlorpheniramine maleate.....2mg  
Phenylephrine HCL.....10mg

**ຂ້ອງໃຊ້:**

- ໃຊ້ປົວອາການໄຂ້ຫວັດ, ຫຼຸດອາການນ້ຳມູກໄຫຼ, ເຮັດໃຫ້ຫາຍໃຈສະດວກ, ຫຼຸດອາການເຈັບຫົວ ແລະ ປວດຄັງຈາກການເປັນໄຂ້ຫວັດ.

**ວິທີໃຊ້:**

- ເດັກອາຍຸ 12 ປີ ຂຶ້ນໄປ ຫຼື ຜູ້ໃຫຍ່ ກິນ 1 ເມັດ 3 ຄັ້ງຕໍ່ວັນ.
- ເດັກອາຍຸ 6-12 ປີ ກິນເຄິ່ງເມັດ 3 ຄັ້ງຕໍ່ວັນ.

**ຂ້າມໃຊ້:**

- ຫ້າມໃຊ້ໃນຜູ້ປ່ວຍທີ່ມີຄວາມດັນເລືອດສູງ, ຜູ້ມີໂລກຫົວໃຈ, ຜູ້ມີຄວາມດັນໃນຕາສູງ, ຜູ້ເປັນໂລກໄຫລອຍ, ຜູ້ເປັນເບົາຫວານ, ມີໂລກກ່ຽວກັບຕັບ, ໝາກໄຂ່ຫຼັງຊຸດໂຊມ, ຜູ້ມີບັນຫາກ່ຽວກັບຕ່ອມລູກໝາກ, ໜົວຖົງປີ, ມີບັນຫາກ່ຽວກັບລະບົບຂັບຖ່າຍປັດສະວະ ຄວນປຶກສາແພດກ່ອນການນຳໃຊ້.

**ຄຳເຕືອນ:**

- ຫ້າມດື່ມເຫຼົ້າໃນເວລາໃຊ້ຢານີ້, ຫ້າມໃຊ້ຢານີ້ຮ່ວມກັບຢາແກ້ປວດຫຼຸດໄຂ້ອື່ນໆ. ຫ້າມໃຊ້ຢານີ້ໃນເວລາຂັບຂີຍານພາຫະນະ ເນື່ອງຈາກພາໃຫ້ເຫງົາອອນ.
- ຫ້າມໃຊ້ໃນແມ່ຍິງຖືພາ ຫຼື ແມ່ຍິງທີ່ກຳລັງສ້າງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່.

**ຜົນຂ້າງຄຽງ:**

- ຢານີ້ອາດພາໃຫ້ເກີດ ອາການແຫ້ງ ບໍລິເວນ ຕາ-ດັງ-ປາກ.
- ອາດພາໃຫ້ເກີດອາການງ່ວງຊຶມ, ມືນ ແລະ ງຶງ.
- ເຮັດໃຫ້ລົບກວນລະບົບຂັບປັດສະວະ.
- ເກີດພາວະຫົວໃຈເຕັ້ນແຮງໃນເດັກນ້ອຍ

**ຮູບແບບ:** ຢາເມັດສີເຫຼືອງ.

**ວັນທີດອກຍຸ:** 36 ເດືອນ ຫຼັງຈາກວັນຜະລິດ.

**ຂະໜາດບັນຈຸ:** ບັນຈຸໃນກັບ, 1 ກັບມີ 50 ແຜງ, 1 ແຜງ ມີ 6 ເມັດ.

**ການເກັບຮັກສາ:**

- ເກັບໄວ້ບ່ອນບໍ່ມີແສງແດດ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມ ທີ່ມີອຸນຫະພູມຕໍ່າກວ່າ 25°C, ຄວນເກັບໄວ້ຫ່າງໄກຈາກເຕັກ

**ຜະລິດໂດຍ:**

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຣຸບ ຈຳກັດ  
ເຂດພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com

# ALICOLD

**Generic name:** Paracetamol, Chlorpheniramine maleate, Phenylephrine HCL.

**Brand name:** ALICOLD

**Composition:**

Paracetamol.....500mg

Chlorpheniramine maleate.....2mg

Phenylephrine HCL.....10mg

**Indications:**

- This Fixed Dose Combination (FDC) is used for the treatment of symptoms associated with the common cold, including the reduction of nasal discharge, improvement of breathing comfort, and relief of headaches and body aches caused by the cold.

**Dosage:**

- Children 12 years to adult 1 tablet 3 times daily.
- Children 6-12 years of age ½ tablet 3 times daily.

**Contraindications:**

- Before use, consult a doctor if patient has high blood pressure, or any type of heart problems; glaucoma, thyroid problems, diabetes, liver or kidney disease, an enlarged prostate, bladder problems or difficulty urinating.

**Warnings:**

- Do not use alcohol or other cough and cold medicines. Avoid taking other medicines that help you sleep or cause drowsiness.
- Do not use it if pregnant or breastfeeding.

**Adverse effects:**

- Dryness of the eyes, nose and mouth.
- Drowsiness, dizziness or blurred vision.
- Difficulty urinating.
- Excitation in children.

**Dosage form:** Yellow tablet.

**Expiry date:** 36 months after date of manufacture.

**Packaging:** 6 tablets per blister pack, 50 blister packs per box.

**Storage:**

- Store under 25°C, protected from moisture and direct sunlight, out of reach of children.

**Manufactured by:**

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory

Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-21-737 051

[www.alliancepharmagroup.com](http://www.alliancepharmagroup.com)