

ALIDABRAFENIB

Generic name: Dabrafenib mesylate

Brand Name: ALIDABRAFENIB

Composition: Dabrafenib mesylate.....75mg

Indications:

Dabrafenib is a kinase inhibitor indicated. It can be taken alone or in combination with trametinib.

- Used to treat unresectable or metastatic melanoma patients with BRAF V600E mutation positivity.
- Used for postoperative adjuvant treatment of BRAF V600E mutation positive melanoma.
- Used to treat metastatic non-small cell lung cancer caused by BRAF V600E mutation.

Dosage:

- Adult patients: 150mg orally twice daily.
- Pediatric patients:
Body weight 26-37kg: 75mg orally twice a day.
Body weight 38-50kg: 100mg orally twice a day.
Body weight 51kg and above: 150mg orally twice daily.
- Take this product at least 1 hour before meals or 2 hours after meals, administration interval of approximately 12 hours.
- Continue medication, until disease progression or unacceptable toxicity.

Contraindications: None.

Warning:

- Monitor patients for newly developed malignant tumors during treatment.
- In combination with trametinib monitor for signs and symptoms of bleeding.
- May cause venous thromboembolism during medication.
- Cardiomyopathy should be monitored during treatment.
- Embryo-Fetal Toxicity: Can cause fetal harm. Advise females of reproductive potential of potential risk to a fetus and to use effective contraception.

Adverse Effects:

Fever, rash, chills, headache, joint pain, cough, etc.

Dosage form: Red capsules

Expiry date: 24 months from the date of manufacture.

Packaging: 120 capsules/bottle.

Storage:

- Protected from light, sealed, and stored at 20°C- 25°C.
- Keep out of reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory
Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR
Tel: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com

ເອກະສານກຳກັບຢາ ALIDABRAFENIB

ຊື່ທົ່ວໄປ: Dabrafenib mesylate

ຊື່ການຄ້າ: ALIDABRAFENIB

ສ່ວນປະກອບ: Dabrafenib mesylate.....75mg

ຂໍ້ບົ່ງໃຊ້:

ໃຊ້ເປັນຢາປິ່ນປົວມະເຮັງ ມີກົນໄກການອອກລົດໃນຮູບແບບ kinase inhibitor ສາມາດໃຊ້ດ່ຽວ ຫລື ໃຊ້ປະສົມກັບ trametinib.

- ໃຊ້ປິ່ນປົວມະເຮັງຜິວຫນັງ ໃນໄລຍະທີ່ເຊື້ອແຜ່ລາມ ຫລື ມີການ ພົບເຊື້ອມະເຮັງທີ່ມີການ ກາຍພັນ (BRAF V600E mutation positivity).
- ໃຊ້ເປັນຢາເສີມໃນການປິ່ນປົວມະເຮັງຜິວຫນັງ ທີ່ມີການກາຍພັນ (BRAF V600E mutation) ຫລັງໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດ.
- ໃຊ້ປິ່ນປົວ ມະເຮັງປອດຊະນິດ non-small cell lung cancer ທີ່ກາຍພັນ ແລະ ກວດພົບ BRAF V600E mutation.

ວິທີໃຊ້:

- ໃນຜູ້ໃຫຍ່: 150mg ໃຊ້ຮັບປະທານ ສອງຄັ້ງຕໍ່ວັນ.
- ໃຊ້ໃນເດັກ:

ນ້ຳໜັກຮ່າງກາຍ 26-37kg: ໃຊ້ໃນປະລິມານ 75 mg ສອງຄັ້ງຕໍ່ວັນ.

ນ້ຳໜັກຮ່າງກາຍ 38-50kg: ໃຊ້ໃນປະລິມານ 100 mg ສອງຄັ້ງຕໍ່ວັນ.

ນ້ຳໜັກຮ່າງກາຍ 51kg ຫລື ຫລາຍກວ່າ: ນຳໃຊ້ໃນປະລິມານ 150 mg ສອງຄັ້ງຕໍ່ວັນ.

- ກິນຢາ 1 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນກິນເຂົ້າ ຫລື 2 ຊົ່ວໂມງ ຫລັງກິນເຂົ້າແລ້ວ. ນຳໃຊ້ຢາ ຫ່າງກັນ ແຕ່ລະຄັ້ງ 12 ຊົ່ວໂມງ.
- ສືບຕໍ່ນຳໃຊ້ຢາປິ່ນປົວ ຈົນກວ່າອາການຈະດີຂຶ້ນ ຫລື ພິຈາລະນາຢຸດເຊົາການນຳໃຊ້ຖ້າເກີດ ເປັນຜິດທີ່ບໍ່ສາມາດຮັບໄດ້.

ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້: ປະຈຸບັນບໍ່ທັນມີຂໍ້ມູນ.

ຄຳເຕືອນ:

- ເຝົາລະວັງ ຕິດຕາມຄົນເຈັບໃນລະຫວ່າງການປິ່ນປົວ ເພື່ອຕິດຕາມການພັດທະນາຂອງ ເນື່ອງອອກຂຶ້ນໃຫມ່.
- ໃຊ້ຮ່ວມກັບ trametinib ແລະ ຕິດຕາມເບິ່ງ ສັນຍານ ແລະ ອາການກ່ຽວກັບເລືອດອອກ.
- ການໃຊ້ຢານີ້ ອາດພາໃຫ້ເກີດລົມເລືອດອອກຕັ້ງແຕ່ເລືອດໄດ້, ຕິດຕາມການທຳງານຂອງ ຫົວໃຈ ລະຫວ່າງການນຳໃຊ້.
- ຢານີ້ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ເດັກໃນຄັນ, ຄວນມີການວາງແຜນປ້ອງກັນການມີບຸດໃນລະຫວ່າງ ການນຳໃຊ້.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

ເປັນໄຂ້, ເປັນຜົນຄັນຄາຍ, ເຈັບຫົວ, ປວດຕາມຂໍ້ ອື່ນໆ.

ຮູບແບບຂອງຢາ: ເປັນແຄັບຊູນ ສີແດງ.

ວັນຫມົດອາຍຸ: 24 ເດືອນ ນັບຈາກວັນທີ່ຜະລິດ.

ຂະໜາດບັນຈຸ: ບັນຈຸໃນກ່ອງ, 1 ກ່ອງ 120 ແຄັບຊູນ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນກັບກ່ອງບັນຈຸເດີມ, ບໍ່ໃຫ້ຖືກແສງແດດ, ເກັບໄວ້ໃນຫ້ອງທີ່ມີອຸນຫະພູມ ລະຫວ່າງ 20°C-25°C.
- ເກັບຮັກສາ ຢາໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກມືເດັກ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຮູບ ຈຳກັດ

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com