

ALIDAZOLE

Generic name: Albendazole

Brand Name: ALIDAZOLE

Composition: Albendazole.....200mg

Indications:

Used to treat a variety of parasitic worm infections.

Dosage:

Closely follow your physician's directions for proper dosing as different infections require different dosing schedules.

Contraindications:

- Pregnant women, lactating women, women preparing to conceive, and children under 2 years old should not use this product.
- Contraindicated in patients with severe liver, kidney, heart dysfunction, or peptic ulcer disease.
- Contraindicated in patients with allergies to albendazole or any other ingredient in the formulation.

Warning:

- Patients with proteinuria, purulent or diffuse dermatitis, various acute infectious diseases, and epilepsy should not use this product.
- If seizures, severe headaches, nausea or vomiting, or visual problems occur. Seek medical attention immediately.

Adverse Effects:

- Nausea, vomiting, diarrhea, abdominal pain, dry mouth, fatigue, fever, rash, dizziness or headache can occur, if symptoms persist or get worse, promptly inform your physician.

Dosage form: White tablets

Expiry date: 36 months from the date of manufacture

Packaging: 2 Tablets/blister, 50 blister/box.

Storage:

- Store in original packaging in a cool dark place.
- Keep out of reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory.

Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-21-737 051.

www.alliancepharmagroup.com

ເອກະສານກຳກັບຢາ ALIDAZOLE

ຊື່ທົວໄປ: Albendazole

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ: ALIDAZOLE

ສ່ວນປະກອບ: Albendazole.....200mg

ຂໍ້ບົງໃຊ້:

ນຳໃຊ້ເພື່ອປິ່ນປົວພະຍາດແມ່ທ້ອງຫຼາຍຊະນິດ.

ວິທີໃຊ້:

ນຳໃຊ້ຕາມຄຳແນະນຳຂອງແພດຢ່າງເຄັ່ງຄັດກ່ຽວກັບການກຳນົດປະລິມານການນຳໃຊ້ຢາ ໃຫ້ເໝາະສົມ, ເນື່ອງຈາກການຕິດເຊື້ອພະຍາດແມ່ທ້ອງມີຫຼາຍປະເພດທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ໃນປະລິມານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້:

- ຫ້າມໃຊ້ໃນແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ຍິງທີ່ກຳລັງລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່, ເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 2 ປີ ຫ້າມນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນນີ້.
- ຫ້າມໃຊ້ໃນຄົນເຈັບທີ່ມີບັນຫາຕັບ ແລະ ໝາກໄຂ່ຫຼັງຊຸດໂຊມ, ຄົນເຈັບທີ່ເປັນພະຍາດຫົວໃຈ, ຄົນເຈັບທີ່ເປັນບາດແຜຕາມຮ່າງກາຍ.
- ຫ້າມນຳໃຊ້ໃນຄົນເຈັບທີ່ແຜ່ຕົວຢາ Albendazole ຫຼື ສ່ວນປະກອບຕ່າງໆໃນຜະລິດຕະພັນນີ້.

ຄຳເຕືອນ:

- ຄົນເຈັບທີ່ມີ ບັນຫາ ໄປເຕອິນ ອອກໃນປັດສະວະ, ຜິວໜັງອັກເສບແຜ່ລາມ, ມີການຕິດເຊື້ອຢ່າງຮຸນແຮງ, ຄົນເຈັບເປັນພະຍາດບ້າໝູ ບໍ່ຄວນໃຊ້ຢານີ້.
- ເມື່ອໃຊ້ຢານີ້ແລ້ວເກີດການ ປັນ (ສຳລັບຄົນມີອາການບ້າໝູ), ເຈັບຫົວຢ່າງຮຸນແຮງ, ປຸ້ນທ້ອງ ຮາກ ມີບັນຫາດ້ານການເບິ່ງເຫັນ ຄວນພົບແພດດ່ວນເພື່ອຮັບການປິ່ນປົວອາການທັນທີ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

- ອາການຂ້າງຄຽງທີ່ພົບ ສ່ວນຫຼາຍ ປະກອບມີ: ປຸ້ນທ້ອງ, ຮາກ, ຖອກທ້ອງ, ເຈັບກະເພາະ, ປາກແຫ້ງ, ເມື່ອຍ, ເປັນໄຂ້, ເປັນຜົນຕາມຜິວໜັງ, ວິນວຽນ, ເຈັບຫົວເຫຼົ້ານີ້ເປັນຕົ້ນ. ຫາກອາການເຫຼົ່ານີ້ຍັງຄົງຢູ່ ຫຼື ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນໃຫ້ພົບແພດໂດຍທັນທີ.

ຮູບແບບຢາ: ຢາເມັດສີຂາວ

ວັນຫມົດອາຍຸ: 36 ເດືອນ ຫຼັງຈາກວັນທີ່ຜະລິດ

ຂະໜາດບັນຈຸ: 1 ກັບມີ 50 ແຜງ, 1 ແຜງມີ 2 ເມັດ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບຮັກສາໃນ ພາຊະນະບັນຈຸເດີມ, ໃນບ່ອນທີ່ເຢັນ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ຖືກແສງແດດ.
- ເກັບຮັກສາຢາໃຫ້ຫ່າງໄກມືເດັກ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຮູບ ຈຳກັດ

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com