

ALIDEUCRAVA

Generic name: Deucravacitinib

Brand Name: ALIDEUCRAVA

Composition:

Deucravacitinib.....6mg

Indications:

- This product is indicated for adult patients with moderate to severe plaque psoriasis.

Dosage:

- Use under the guidance of a physician.
- The recommended dose of this product is 6mg, taken orally once daily. with or without food.

Contraindications:

- This product is contraindicated in patients with a history of hypersensitivity to deucravacitinib or any excipient in this product.

Warnings:

- If a clinically significant hypersensitivity reaction occurs, appropriate treatment should be administered, and this product should be discontinued.
- This product may increase the risk of infection. Patients with active or severe infections should avoid using this product.
- This product is not recommended for patients with active hepatitis B or C.
- Before starting treatment with this product, patients should be evaluated for latent or active TB infections.
- If CPK levels significantly increase during treatment with this product, or if myopathy is diagnosed or suspected, this product should be discontinued.
- Before starting treatment with this product, all age-appropriate immunizations, including prophylactic vaccination against herpes zoster, should be completed according to current immunization guidelines. Patients receiving this product should avoid live vaccines.
- Pregnant women, children, and the elderly should use with caution.

Adverse Effects:

- Infections, malignancies, abnormal laboratory tests, elevated liver enzymes, decreased glomerular filtration rate (GFR), and elevated blood lipid levels.

Dosage form: Pink Tablets.

Packaging: 30 Tablets/bottle.

Expiry date: 36 months from the date of manufacture.

Storage:

- Store sealed in original packaging at no more than 30°C.
- Keep out of the reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory

Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com

ເອກະສານກຳກັບຢາ ALIDEUCRAVA

ຊື່ທົວໄປ: Deucravacitinib

ຊື່ການຄ້າ: ALIDEUCRAVA

ສ່ວນປະກອບ:

Deucravacitinib 6mg

ຂໍ້ບົງໃຊ້:

- ໃຊ້ປິ່ນປົວພະຍາດສະເກັດເງິນໃນຜູ້ໃຫຍ່ ທີ່ມີອາການປານກາງ ຫາ ຮຸນແຮງ.

ວິທີໃຊ້:

- ນຳໃຊ້ຕາມຄຳແນະນຳຂອງແພດ.
- ຮັບປະທານ 6mg ວັນລະຄັ້ງ, ກິນກ່ອນ ຫຼື ຫຼັງອາຫານ.

ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້:

- ຫ້າມໃຊ້ຢາໃນຜູ້ທີ່ແຜ່ຢາ Deucravacitinib ຫຼື ແຜ່ສ່ວນປະກອບໃນຜະລິດຕະພັນຢານີ້.

ຄຳເຕືອນ:

- ຖ້າພົບເຫັນອາການແຜ່ຮຸນແຮງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຫຼັງການໃຊ້ຢາ ຄວນໄປພົບແພດເພື່ອໃຫ້ການປິ່ນປົວຕາມອາການທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ບໍ່ຄວນສືບຕໍ່ໃນການນຳໃຊ້ຢາ Deucravacitinib.
- ການນຳໃຊ້ຢານີ້ອາດເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄົນເຈັບທີ່ຢູ່ໃນໄລຍະມີການຕິດເຊື້ອຕ່າງໆ ຄວນຫຼີກລ່ຽງການນຳໃຊ້ຢານີ້.
- ບໍ່ຄວນໃຊ້ຢານີ້ໃນຄົນເຈັບທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດຕັບອັກເສບ ບີ ຫຼື ຊີ (hepatitis B or C).
- ກ່ອນການນຳໃຊ້ຢານີ້ ຄວນປະເມີນກ່ຽວກັບການຕິດເຊື້ອ ວິນນະໂລກປອດທີ່ກຳລັງຖືເຊື້ອ ຫຼື ກຳລັງສະແດງອາການອອກມາຂອງຄົນເຈັບ (TB infections).
- ຖ້າພົບປະລິມານຂອງ CPK (Creatine Phosphokinase) ຂຶ້ນສູງ ໃນລະຫວ່າງການນຳໃຊ້ຢານີ້ ຫຼື ສິ່ງໃສ່ວ່າຄົນເຈັບເກີດອາການຜິດປົກກະຕິທາງກ້າມຊີ້ນ (myopathy) ຄວນພິຈາລະນາຢຸດການນຳໃຊ້.
- ກ່ອນນຳໃຊ້ຢານີ້ ຄວນພິຈາລະນາກ່ຽວກັບການໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນທີ່ເໝາະສົມ ຕາມເກນອາຍຸ ລວມທັງວັກຊີນທີ່ປ້ອງກັນ ພະຍາດໝາກສຸກໝາກໃສ່ (herpes zoster) ຕາມການແນະນຳຂອງແພດຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບວັກຊີນ ແລະ ບໍ່ຄວນໃຊ້ວັກຊີນຊະນິດເຊື້ອເປັນໃນຄົນເຈັບລະຫວ່າງການນຳໃຊ້ຢານີ້.
- ແມ່ຍິງຖືພາ, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ເຖົ້າ ຄວນໃຊ້ດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

- ຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ມັກພົບເຫັນ ຈາກການກວດຫາຄ່າຕ່າງໆທາງຫ້ອງວິເຄາະພົບວ່າ: ຄ່າລະດັບຂອງການຕິດເຊື້ອ, ເຊື້ອມະເຮັງ ຈະໃຫ້ຄ່າຜິດປົກກະຕິ, ຄ່າເອັມໄຊຂອງຕັບເພີ່ມຂຶ້ນ, ອັດຕາການກັ່ນຕອງຜ່ານໝາກໄຂ່ຫຼັງຫຼຸດລົງ (glomerular filtration rate (GFR) ແລະ ພົບຄ່າລະດັບໄຂມັນໃນເລືອດເພີ່ມຂຶ້ນ.

ຮູບແບບຂອງຢາ: ຢາເມັດສີປົວ.

ຂະໜາດບັນຈຸ: ບັນຈຸໃນກ່ອງ, 1 ກ່ອງມີ 30 ເມັດ.

ວັນໝົດອາຍຸ: 36 ເດືອນນັບຫຼັງຈາກວັນທີ່ຜະລິດ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບຮັກສາໃນກັບກ່ອງບັນຈຸເດີມ ທີ່ປິດສະໝິດ ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນບ່ອນອຸນຫະພູມຕໍ່າກວ່າ 30°C.
- ເກັບຮັກສາຢາໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກມືເດັກ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຮູບ ຈຳກັດ

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com