

ALIDIABETEX

Generic name: Metformin Hydrochloride and Glibenclamide

Brand Name : ALIDIABETEX

Composition :

Metformin hydrochloride.....500mg.

Glibenclamide.....2.5mg.

Indications:

It can be used as second-line treatment for patients with type II diabetes who fail to control blood glucose level satisfactorily with diet control and exercise plus metformin or sulfonylurea.

Dosage:

Take it orally, with meals. The recommended starting dose is one tablet twice a day (500mg/2.5mg). The dose should be gradually increased until the lowest dose is achieved for good control of the patient's hyperglycemia. The maximum daily dose is not more than four tablets (2000mg/10mg).

Contraindications:

- Kidney disease or renal insufficiency.
- Congestive heart failure requiring drug treatment.
- People who are allergic to metformin or glyburide.
- Acute and chronic metabolic acidosis.
- Hypotension and hypoxia before intravenous pyelography or arteriography, major surgery, and clinical conditions.
- Patients with type I diabetes.
- Pregnant and lactating women.
- Children.

Warning:

- This product may cause hypoglycemia.
- Patients should monitor renal function, liver function and blood sugar during medication.
- Use drugs that affect kidney function or eliminate metformin with caution.
- Avoid excessive alcohol consumption.
- 5, liver insufficiency should not be used.
- Appropriate VitB12 supplement.

Adverse Effects:

- Gastrointestinal reaction.
- Fatigue, dizziness and rash.
- A few lactic acidosis.
- rare jaundice, liver function damage, bone marrow suppression, granulocytopenia, thrombocytopenia, etc.
- Anemia or malabsorption.

Dosage form: White tablet

Expiry data: 24 months from the date of manufacture.

Packaging: 10 tablets/blister, 50 blisters/box.

Storage:

- Seal preservation.
- Keep out of reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory.

Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: (856-21) 737 051.

www.alliancepharmagroup.com

ເອກະສານກຳກັບຢາ

ALIDIABETEX

ຊື່ທົວໄປ: Metformin Hydrochloride and Glibenclamide

ຊື່ການຄ້າ : ALIDIABETEX

ສ່ວນປະກອບ:

Metformin hydrochloride.....500mg.

Glibenclamide.....2.5mg.

ຂໍ້ບົງໃຊ້:

ຈັດເປັນຢາໃນກຸ່ມ Second-line ໃນການປິ່ນປົວພະຍາດເບົາຫວານປະເພດ II ມີກິນໂກການອອກລິດໃນການກະຕຸ້ນຕັບອ່ອນໃຫ້ຫຼັງສານອິນຊູລິນ ເພື່ອຄວບຄຸມລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບເໝາະສົມ, ການນຳໃຊ້ຄວນຢູ່ພາຍໃຕ້ການແນະນຳຂອງແພດ ຫຼື ເພສັດຊະກອນຢ່າງເຄັ່ງຄັດ, ການຄວບຄຸມລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດ ຄວນເຮັດຄຽງຄູ່ໄປກັບການຄວບຄຸມອາຫານ ແລະການອອກກຳລັງກາຍຢ່າງເໝາະສົມ.

ວິທີໃຊ້:

ໃຊ້ຮັບປະທານ, ສາມາດຮັບປະທານພ້ອມອາຫານ, ຄວນເລີ່ມຮັບປະທານດ້ວຍປະລິມານເລີ່ມຕົ້ນ ແຕ່ລະຄັ້ງ 500mg/2.5mg (1 ເມັດ) ຮັບປະທານສອງຄັ້ງຕໍ່ວັນ ແລະ ສາມາດຄ່ອຍປັບປະລິມານເພີ່ມຂຶ້ນໃນອາທິດຕໍ່ມາ ເພື່ອ ໃຫ້ສາມາດຄວບຄຸມລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດໄດ້ໃນເກນເໝາະສົມ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 4 ເມັດຕໍ່ວັນ (2000mg/10mg).

ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້:

- ຫ້າມໃຊ້ໃນຜູ້ແຜ່ຢາ ຫຼື ແຜ່ສ່ວນປະກອບທີ່ປະສົມໃນຕົວຢາ.
- ຫ້າມໃຊ້ກັບຄົນເຈັບທີ່ມີບັນຫາກ່ຽວກັບ ໄຂ້ຫຼັງ ຫຼື ການທຳງານຂອງໄຂ້ຫຼັງບໍ່ປົກກະຕິ.
- ຄົນເຈັບທີ່ເປັນພະຍາດຫົວໃຈ ທີ່ຢູ່ໃນໄລຍະການປິ່ນປົວດ້ວຍຢາປິ່ນປົວພະຍາດຫົວໃຈ.
- ຄົນເຈັບຢູ່ໃນພາວະເລືອດເປັນພິດ ຫຼື ໃນພາວະ Chronic metabolic acidosis.
- ຄົນເຈັບທີ່ຢູ່ໃນພາວະຄວາມດັນເລືອດຕ່ຳ, ພາວະຂາດອົກຊີເຈນໃນເລືອດ ຄົນເຈັບ ຢູ່ໃນໄລຍະກຽມບົງມະຕິທາງດ້ານ Intravenous pyelography or Arteriography, ຄົນເຈັບທີ່ມີການປິ່ນປົວດ້ວຍການຜ່າຕັດ ລວມທັງຄົນເຈັບທີ່ຢູ່ໃນພາວະອາການວິກິດ ເປັນຕົ້ນ.
- ຄົນເຈັບທີ່ເປັນເບົາຫວານ ປະເພດ I.
- ໃນແມ່ຍິງຖືພາ ແລະກຳລັງລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່.
- ຫ້າມໃຊ້ໃນເດັກນ້ອຍ.

ຄຳເຕືອນ:

- ການໃຊ້ຢາ ອາດເຮັດໃຫ້ປະລິມານນ້ຳຕານໃນເລືອດຕົກ ຕ່ຳກວ່າປົກກະຕິ.
- ຄົນເຈັບທີ່ໃຊ້ຢາ ຄວນມີການກວດການທຳງານຂອງໄຂ້ຫຼັງ, ຕັບ, ລະດັບທາດນ້ຳຕານໃນເລືອດ ໃນຊ່ວງທີ່ກຳລັງໃຊ້ຢາ.
- ການໃຊ້ຢາມີອາດກະທົບເຖິງໜ້າທີ່ການທຳງານຂອງໄຂ້ຫຼັງໃນການກຳຈັດ Metformin ດັ່ງນັ້ນການໃຊ້ຕ້ອງມີຄວາມລະມັດລະວັງ.
- ຫຼີກເວັ້ນການດື່ມເຫຼົ້າ ໃນຊ່ວງການນຳໃຊ້ຢາ.
- ຜູ້ມີບັນຫາກ່ຽວກັບຕັບ ບໍ່ຄວນນຳໃຊ້ຢານີ້.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

- ມີປະຕິກິລະຍາຕໍ່ກະເພາະລຳໄສ້.
- ເມືອຍ, ວິນວຽນ, ປວດຫົວ, ເປັນຜົນຕາມຜິວໜັງ.
- ຮູ້ສຶກຫົວ, ໃຈສັ່ນ, ວິຕິກັງວົນ, ຫຸດຫງິດກະວົນກະວາຍ
- ປຸ້ນທ້ອງ, ເຈັບທ້ອງ, ຖອກທ້ອງ.
- ນອກນັ້ນ ຍັງພົບເຫັນບັນດາຜົນຂ້າງຄຽງອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ປັດສະວະເຂັ້ມ, ຜູ້ປ່ວຍບາງຄົນພົບເຫັນເລືອດໃນປັດສະວະ, ຜິວໜັງຮູ້ສຶກໄວຕໍ່ແສງ, ຕົວສັ່ນ, ເຈັບຄໍ ອື່ນໆ.
- ຫາກພົບເຫັນອາການຂ້າງຄຽງອື່ນ ຄວນປຶກສາແພດ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃນການນຳໃຊ້.

ຮູບແບບຂອງຢາ: ຢາເມັດສີຂາວ.

ວັນຫມົດອາຍຸ: 24 ເດືອນ ຫຼັງຈາກວັນທີ່ຜະລິດ.

ຂະໜາດບັນຈຸ: 1 ກັບມີ 50 ແຜງ, 1 ແຜງມີ 10 ເມັດ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນກັບກ່ອງເດີມ, ປິດຟາໃຫ້ສະນິດ ປ້ອງກັນການສຳຜັດແສງແດດ.
- ເກັບຮັກສາຢາໃຫ້ຫ່າງໄກມືເດັກ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຮູບ ຈຳກັດ.

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.

ໂທລະສັບ: (856-21) 737 051

www.alliancepharmagroup.com

