

ເອກະສານກຳກັບຢາ ALIDDOUBLE

ຊື່ທົວໄປ: Tadalafil & Dapoxetine

ຊື່ການຄ້າ: ALIDDOUBLE

ສ່ວນປະກອບ:

Tadalafil20mg

Dapoxetine30mg

ຂໍ້ບັງໃຊ້:

- ເປັນຢາປະສົມ ປະກອບມີ ສານອອກລິດ ສອງຊະນິດຄື Dapoxetine ແລະ Tadalafil, ນຳໃຊ້ເພື່ອປັນເທົ່າ ອາການດັ່ງລຸ່ມນີ້:
 - ຊ່ວຍປັນເທົ່າ ອາການຫຼັງໄວ ໃນຜູ້ຊາຍ.
 - ຊ່ວຍບຳລຸງ ການເສື່ອມສະມັດຕະພາບທາງເພດ.
 - ຊ່ວຍຮັກສາ ຕ່ອມລູກໝາກໃຫຍ່ ໃນເພດຊາຍ.

ການນຳໃຊ້:

- ກິນ 1 ເມັດວັນລະຄັ້ງ ຫ້າມກິນສອງ ຫຼື ຫຼາຍຄັ້ງຕໍ່ວັນ.
- ຫ້າມຫຍ້າ ຫຼື ຄ້ຽວເມັດຢາ, ຄວນປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງແພດ.
- ກິນ 1 ເມັດ ວັນລະຄັ້ງ ສຳລັບທ່ານຊາຍ ທີ່ມີການເສື່ອມສະມັດຕະພາບທາງເພດ, ແນະນຳໃຫ້ກິນຢາ 30 ນາທີກ່ອນຈະມີເພດສຳພັນ, ບໍ່ຄວນໃຊ້ຢາຕິດຕໍ່ກັນຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກບໍ່ທັນໄດ້ມີການສຶກສາດ້ານຄວາມປອດໄພ ໃນການນຳໃຊ້ໃນໄລຍະຍາວນານ.

ຂໍ້ຫ້າມ:

- ຫ້າມໃຊ້ຢາໃນແມ່ຍິງ, ຢາມີ ອາດເຮັດໃຫ້ມີອາການວິນວຽນຫົວ, ບໍ່ຄວນຂັບລົດໃນລະຫວ່າງໃຊ້ຢາ ອາດພາໃຫ້ເປັນອັນຕະລາຍໄດ້, ຫ້າມດື່ມເຫຼົ້າ ເພາະລົດຂອງເຫຼົ້າ ຈະພາໃຫ້ອາການວິນວຽນຫົວເພີ່ມຂຶ້ນ, ບໍ່ຄວນໃຊ້ຢາ ກັບເດັກນ້ອຍ ເນື່ອງຈາກບໍ່ມີການສຶກສາປະສິດທິຜົນ ແລະ ຄວາມປອດໄພ, ຫ້າມໃຊ້ຢາໃນຄົນທີ່ມີອາການຊຶມເສົ້າ ທີ່ກຳລັງ ປິ່ນປົວ ດ້ວຍຢາທີ່ອອກລິດຕໍ່ MAO ຢ່າງໜ້ອຍ ຕ້ອງຢຸດໃຫ້ຢາກ່ອນ ຜ່ານໄປ 14 ວັນ ຈຶ່ງແນະນຳໃຫ້ໃຊ້.
- ໃນລະຫວ່າງການໃຊ້ຢາຕ້ອງຫ້າມກິນຕົ້ມເຫຼົ້າທຸກປະເພດ ເພາະອາດເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ສະມັດຕະພາບ ໃນການແຂງຕົວຂອງອົງຄະຊາດຫຼຸດລົງ ຫ້າມໃຊ້ຢາ ຮ່ວມກັບຢາຟື້ນເມືອງ ກຸ່ມ St John's wort plant (ທີ່ໃຊ້ປິ່ນປົວ ອາການຊຶມເສົ້າ).
- ຢາມີອາດພາໃຫ້ເກີດມີອາການສັ່ນ ແລະ ເກີດບັນຫາຕາມມາຫຼັງການນຳໃຊ້ເຊັ່ນ: ການທ່າງານຂອງຫົວໃຈ ແລະ ເສັ້ນເລືອດຫົວໃຈຜິດປົກກະຕິ, ມີບັນຫາຕໍ່ການທ່າງານຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ເກີດມີບັນຫາກ່ຽວກັບປອດ, ມີບັນຫາເພີ່ມໃນຜູ້ຕິດເຫຼົ້າ, ມີບັນຫາກ່ຽວກັບຕັບ, ມີອາການຊັກ, ມີບັນຫາການໄດ້ຍິນ, ມີບັນຫາໃນການເບິ່ງເຫັນ, ການແຂງຕົວຂອງອະໄວຍະວະເພດທີ່ແກ່ຍາວເຫຼົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ.

ຄຳເຕືອນ:

- ຫ້າມກິນຢາມີ ເມື່ອພົບວ່າ ມີອາການແພ້ຕໍ່ຕົວຢາ ຫຼື ສ່ວນປະກອບຂອງຢາມີມາກ່ອນ.
- ເມື່ອຢູ່ໃນສະພາວະຂ້າງລຸ່ມ ບໍ່ຄວນນຳໃຊ້ຢາມີ ເຊັ່ນ:
 - ເປັນໂລກຫົວໃຈ ກຳລັງປິ່ນປົວດ້ວຍຢາ ໃນໝວດ Nitrates
 - ມີຄວາມດັນເລືອດໃນປອດສູງ ກຳລັງໃຊ້ຢາໃນກຸ່ມ Riociguat ຫຼື ກຸ່ມ Alpha-blockers
 - ມີບັນຫາກ້າມເນື້ອຫົວໃຈຕາຍ, ຄວາມດັນສູງ, ຄວາມດັນຕ່ຳ
 - ມີບັນຫາກ່ຽວກັບໂລກຫົວໃຈ, ບັນຫາກ່ຽວກັບເລືອດ, ມີບັນຫາກ່ຽວກັບມະເຮັງ
 - ມີບັນຫາກ່ຽວກັບຕັບ, ໝາກໄຂ່ຫຼັງ
 - ຮູບຮ່າງຂອງອົງຄະຊາດຜິດປົກກະຕິ
 - ບໍ່ຄວນນຳໃຊ້ໃນຄົນທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 18 ປີ ຫຼື ສູງກວ່າ 65 ປີ, ຫຼືເວັ້ນການດື່ມເຫຼົ້າທຸກປະເພດ ໃນເວລາໃຊ້ຢາມີ.
- ຄວນປຶກສາແພດເພື່ອໃຫ້ການແນະນຳສະເພາະເນື່ອງຈາກປະຕິກິລິຍາປະຕິກິດຂອງຢາຂຶ້ນກັບສະພາບອາການ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

- ຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ມັກເກີດ ປະກອບມີ: ເຈັບຫົວ, ເລືອດດັງອອກ, ວິນວຽນ, ປຸ້ນທ້ອງ, ອາຫານບໍ່ອ່ອຍ, ໜ້າແດງ (ອອກຮ້ອນຕາມບໍລິເວນຫູ, ໃບໜ້າ, ຄໍ ແລະ ອື່ນໆ) ຮູ້ສຶກປາກແຫ້ງເຫຼົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ.

ຮູບແບບຂອງຢາ: ຢາເມັດສີສົ້ມ.

ວັນໝົດອາຍຸ: 24 ເດືອນ ນັບຫຼັງຈາກວັນທີ່ຜະລິດ.

ຂະໜາດບັນຈຸ: 2 ເມັດ / ກັບ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນສະຖານທີ່ເຢັນ ແລະ ແຫ້ງພາຍໃຕ້ອຸນຫະພູມ 30°C ເພື່ອປ້ອງກັນຈາກແສງແດດ.
- ເກັບໄວ້ຫ່າງໄກຈາກເດັກນ້ອຍ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຣຸບ ຈຳກັດ

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com

ໝາຍເຫດ: ຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວ ບໍ່ມີສັບພະຄຸນໃນການປົກປ້ອງ, ປິ່ນປົວ ຫຼື ປ້ອງກັນພະຍາດໄດ້

ALIDDOUBLE

Generic Name: Tadalafil & Dapoxetine

Brand Name: ALIDDOUBLE

Composition:

Tadalafil20mg

Dapoxetine30mg

Indications:

- This product is a compound preparation composed of Dapoxetine and Tadalafil, suitable for the treatment of:
 - Premature ejaculation.
 - Erectile dysfunction.
 - Benign prostatic hyperplasia.

Dosage:

- Take once a day, take one tablet each time, not orally twice a day.
- Do not break or chew it, follow the doctor's advice
- Orally, for adult males, 1 sky 1 time, every time 1 piece. before having sex, at least before sex 30 Minutes to take, not affected by eating. It is best not to take it continuously every day, and the safety of long-term use has not been established.

Contraindication:

- Tadalafil & Dapoxetine is not intended for use in women. Tadalafil & Dapoxetine may cause dizziness, so drive with caution. Avoid consuming alcohol as it might cause increased dizziness. Tadalafil & Dapoxetine should not be given to children as safety and effectiveness have not been established. Do not take Tadalafil & Dapoxetine if you have taken an MAO inhibitor (anti-depressant medication like Isocarboxazid, Phenelzine, Selegiline, and Tranylcypromine) in the last 14 days.
- Avoid consumption of alcohol as it may temporarily impair your ability to get an erection. Also, do not take St John's wort plant (a natural remedy to treat depression).
- Tadalafil & Dapoxetine may have interactions with cardiovascular/heart disease, renal dysfunction (kidney impairment), pulmonary disease, alcoholism, liver disease, seizure disorder, hearing loss, retinitis pigmentosa (loss of vision), and priapism (prolonged erection of the penis).

Warning:

- Do not take this medicine if you have a known allergy to the drug or any of its components.
- This medicine should not be used under the following conditions:
 - If you have heart disease and are being treated with medications in the nitrate group.
 - If you have pulmonary hypertension and are taking medications such as riociguat or drugs in the alpha-blocker group.
 - If you have a history of heart failure, high or low blood pressure.
 - If you have cardiovascular disorders, blood-related conditions, or cancer.
 - If you have liver or kidney problems.
 - If you have a structural deformity of the penis.
 - Not recommended for individuals under 18 or over 65 years of age.
 - Avoid alcohol consumption of any kind while taking this medication.
- Consult your doctor for individualized medical advice, as drug interactions and safety considerations vary depending on each person's health condition.

Adverse effects:

- Most common adverse reactions: Headache, nosebleed, dizziness, nausea, indigestion, flushing (warmth sensation in ears, face, neck, etc.), and dry mouth

Dosage form: Orange tablets

Expiry date: 24 months after the date of manufacture

Packaging: 2 Tablets / box

Storage:

- Store in a cool and dry place below 30°C protect from light.
- Keep out of reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory

Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com

Note: This product is not effective in diagnosing, treating or preventing diseases.