

ALIEITROBPA

Generic name: Eltrombopag Olamine tablets

Brand Name: ALIEITROBPA

Composition:

Eltrombopag Olamine.....25mg

Indications:

- ALIEITROBPA is indicated for the treatment of thrombocytopenia in adult and pediatric patients 1 year and older with persistent or chronic immune thrombocytopenia (ITP) who have had an insufficient response to corticosteroids, immunoglobulins, or splenectomy.
- Treatment of thrombocytopenia in patients with hepatitis C infection.
- In combination with standard immunosuppressive therapy for the first line treatment of adult and pediatric patients 2 years and older with severe aplastic anemia.

Dosage:

- Take ALIEITROBPA without a meal or with a meal low in calcium (≤ 50 mg).
- Persistent or Chronic ITP: Initiate ALIEITROBPA at 50 mg once daily for most adult and pediatric patients 6 years and older, and at 25 mg once daily for pediatric patients aged 1 to 5 years.
- Chronic Hepatitis C-associated Thrombocytopenia: Initiate ALIEITROBPA at 25 mg once daily for all patients. Do not exceed a daily dose of 100 mg.
- First-line Severe Aplastic Anemia: Initiate ALIEITROBPA once daily at 2.5 mg/kg (in pediatric patients aged 2 to 5 years old), 75 mg (pediatric patients aged 6 to 11 years old), or 150 mg for patients aged 12 years and older.
- Refractory Severe Aplastic Anemia: Initiate ALIEITROBPA at 50 mg once daily.

Contraindications:

- None.

Warnings:

- Hepatotoxicity: Monitor liver function before and during therapy.
- Increased Risk of Death and Progression of Myelodysplastic Syndromes to Acute Myeloid Leukemia.
- Thrombotic/Thromboembolic Complications: Monitor platelet counts regularly.

Adverse Effects:

- Anemia, nausea, pyrexia, alanine aminotransferase increases, cough, fatigue, headache, and diarrhea.

Dosage form: Orange tablets.

Packaging: 28 tablets/bottle.

Expiry date: 36 months from the date of manufacture.

Storage:

- Store sealed in original packaging below 30°C.
- Keep out of reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory

Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com

ເອກະສານກຳກັບຢາ ALIEITROBPA

ຊື່ທົ່ວໄປ: Eltrombopag Olamine tablets

ຊື່ການຄ້າ: ALIEITROBPA

ສ່ວນປະກອບ:

Eltrombopag Olamine.....25 mg

ຂໍ້ບົ່ງໃຊ້:

- ALIEITROBPA ໃຊ້ສຳລັບປິ່ນປົວພະຍາດທີ່ມີພາວະເມັດເລືອດຕ່ຳ, ໃນຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ອາຍຸ 01 ປີຂຶ້ນໄປ, ມີສາເຫດມາຈາກພູມຄຸ້ມກັນບົກຜ່ອງ ເຮັດໃຫ້ເມັດເລືອດຕ່ຳ (chronic immune thrombocytopenia (ITP)) ຊຳເຮື້ອ ຫຼື ເປັນໄລຍະຕໍ່ເນື່ອງກັນ ເຊິ່ງບໍ່ມີການຕອບສະໜອງພຽງພໍ ເມື່ອມີການນຳໃຊ້ຢາໃນກຸ່ມສະເຕຣອຍ (corticosteroids), (immunoglobulins) ຫຼື ໃນກໍລະນີມີການຜ່າຕັດມ້າມ.
- ການປິ່ນປົວພາວະເມັດເລືອດຕ່ຳ ໃນຄົນເຈັບທີ່ມີການຕິດເຊື້ອພະຍາດໄວຣັສຕັບອັກເສບ ຊະນິດ ຊື່.
- ນຳໃຊ້ຮ່ວມກັບການບຳບັດດ້ວຍຢາທີ່ກົດໝວງພູມຄຸ້ມກັນມາດຖານ ສຳລັບການປິ່ນປົວເບື້ອງຕົ້ນໃນຄົນເຈັບຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍອາຍຸ 02 ປີຂຶ້ນໄປ ທີ່ມີພາວະເລືອດຈາງ ແລະ ພູມຄຸ້ມກັນບົກຜ່ອງຢ່າງຮຸນແຮງ.

ວິທີໃຊ້:

- ປະລິມານທີ່ນຳໃຊ້ ≤ 50 mg ກິນກ່ອນ ຫຼື ຫຼັງອາຫານ ຫຼື ໃຫ້ກິນພ້ອມກັບອາຫານທີ່ມີທາດແຄວຊຽມຕ່ຳ.
- ໃນກໍລະນີພູມຄຸ້ມກັນບົກຜ່ອງ ເຮັດໃຫ້ເມັດເລືອດຕ່ຳຊຳເຮື້ອ ຫຼື ຕໍ່ເນື່ອງ (immune thrombocytopenia (ITP)) ນຳໃຊ້ ALIEITROBPA ດ້ວຍປະລິມານ 50 mg, 1 ເທື່ອຕໍ່ມື້ ສຳລັບຄົນເຈັບຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸ 06 ປີຂຶ້ນໄປ ແລະ ໃຊ້ດ້ວຍປະລິມານ 25 mg, 1 ເທື່ອຕໍ່ມື້ ສຳລັບຄົນເຈັບທີ່ເປັນເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸ 01 ຫາ 05 ປີ.
- ໃຊ້ສຳລັບຄົນເຈັບພະຍາດໄວຣັສຕັບອັກເສບ ຊະນິດ ຊື່ ທີ່ມີພາວະເມັດເລືອດຕ່ຳ, ໃຫ້ເລີ່ມນຳໃຊ້ ALIEITROBPA 25 mg 1 ເທື່ອຕໍ່ມື້ ໃນທຸກກໍລະນີ, ຫ້າມໃຊ້ເກີນ 100 mg ຕໍ່ມື້.
- ໃຊ້ສຳລັບຄົນເຈັບພະຍາດເລືອດຈາງ ໃຫ້ເລີ່ມໃຊ້ 2.5 mg/kg ນ້ຳໜັກຕົວຮ່າງກາຍ(ສຳລັບເດັກອາຍຸ 2-5 ປີ), ນຳໃຊ້ດ້ວຍປະລິມານ 75 mg (ສຳລັບເດັກອາຍຸ 6-11 ປີ), ຫຼື ນຳໃຊ້ດ້ວຍປະລິມານ 150 mg ສຳລັບຄົນເຈັບ 12 ປີຂຶ້ນໄປ.
- ໃຊ້ສຳລັບຄົນເຈັບພະຍາດເລືອດຈາງທີ່ມີອາການຕິດຢາ ໃຫ້ເລີ່ມໃຊ້ ALIEITROBPA 50 mg 1 ເທື່ອຕໍ່ມື້.

ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້:

- ຍັງບໍ່ທັນມີຂໍ້ມູນ

ຄຳເຕືອນ:

- ຄວາມເປັນພິດຕໍ່ຕັບ: ຄວນວິເຄາະ ແລະ ປະເມີນໜ້າທີ່ການທຳງານຂອງຕັບໃນໄລຍະກ່ອນ ແລະ ໃນລະຫວ່າງການປິ່ນປົວດ້ວຍຢາ.
- ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເສຍຊີວິດ ແລະ ໃນການພັດທະນາການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເຊື້ອພະຍາດ Myelodysplastic Syndromes ຂອງຄົນເຈັບໂດຍສາມາດພາໃຫ້ເກີດເປັນພະຍາດ ມະເຮັງເມັດເລືອດຂາວກະທັນຫັນ.
- ເກີດອາການແຊກຊ້ອນຈາກອາການທີ່ມີລົມເລືອດອຸດຕັນ: ຄວນວິເຄາະ ແລະ ປະເມີນຄ່າຂອງເລືອດເປັນປະຈຳ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

- ມີພາວະເລືອດຈາງ, ປວດຮາກ, ມີໄຂ້, ຄ່າຂອງ alanine aminotransferase ເພີ່ມຂຶ້ນ, ໄອ, ອ່ອນເພຍ, ເຈັບຫົວ ແລະ ຖອກຫ້ອງ.

ຮູບແບບຂອງຢາ: ຢາເມັດສີສົ້ມ.

ຂະໜາດບັນຈຸ: ບັນຈຸໃນກ່ອງ, 1 ກ່ອງມີ 28 ເມັດ.

ວັນທີມີອາຍຸ: 36 ເດືອນນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ່ຜະລິດ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນກ່ອງບັນຈຸເດີມ, ປິດຝາສະໝິດ, ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນອຸນຫະພູມຕ່ຳກວ່າ 30°C.
- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກມືເດັກ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຝາກມາ ກຮູບ ຈຳກັດ

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com