

ALIEMPAGLIFLOZIN+ALILINAGLIPTIN

Generic name: Empagliflozin and linagliptin

Brand Name: Aliempagliflozin+Alilinagliptin

Composition:

Empagliflozin.....10mg

Linagliptin.....5mg

Indications:

- This medication is used along with diet and exercise to help control blood sugar levels in adults with type 2 diabetes. It also helps reduce the risk of heart-related death in adults with type 2 diabetes who already have heart disease.

Dosage:

- Please use according to your doctor's instructions.
- Take one tablet once daily in the morning with or without meals.

Contraindications:

- Allergic to Empagliflozin, Linagliptin or any excipients in this product.
- Dialysis patients.
- Pancreatitis patients.

Warning:

- This product is not applicable to type I diabetes or type I diabetes ketoacidosis.
- Stop taking this product immediately if symptoms of pancreatitis appear.
- Beware of hypoglycemia during use.
- May increase the risk of reproductive fungal infections.
- Not recommended for pregnant and lactating women.
- Use with caution in children and elderly patients.

Adverse Effects:

- Urinary tract infections, nasopharyngitis and upper respiratory tract infections.

Dosage form: White tablets.

Expiry date: 24 months from the date of manufacture.

Packaging: 7 tablets/blister, 2 blisters/box.

Storage:

- Protected from light, sealed, and stored at 20°C- 25°C.
- Keep out of reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory

Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com

ເອກະສານກຳກັບຢາ ALIEMPAGLIFLOZIN+ALILINAGLIPTIN

ຊື່ທົ່ວໄປ: Empagliflozin and linagliptin

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ: Aliempagliflozin+Alilinagliptin

ສ່ວນປະກອບ:

Empagliflozin10mg

Linagliptin5mg

ຂໍ້ບົ່ງໃຊ້:

- ໃຊ້ເພື່ອປົນປົວພະຍາດເບົາຫວານ ປະເພດ 2 ຮ່ວມກັບ ການຄຸມອາຫານ ແລະ ການອອກກຳລັງກາຍ ເພື່ອປັບ ປຸງການຄວບຄຸມລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດ, ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດຫົວໃຈ ໃນຜູ້ສູງອາຍຸ ທີ່ເປັນພະຍາດເບົາຫວານ ປະເພດ 2.

ວິທີໃຊ້:

- ນຳໃຊ້ພາຍໃຕ້ຄໍາຊີ້ນຳຂອງແພດໝໍ.
- ໃຊ້ຮັບປະທານມື້ລະຄັ້ງ ຄັ້ງລະເມັດ ໃນຕອນເຊົ້າ ກິນກ່ອນ ຫຼື ຫຼັງອາຫານ.

ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້:

- ຫ້າມໃຊ້ໃນຄົນແຂ້ວ Empagliflozin, Linagliptin ຫລື ແຂ້ວສ່ວນປະກອບ ໃນຕົວຢ່າງນີ້.
- ໃນຄົນເຈັບທີ່ຟອກໝາກໄຂ່ຫຼັງ.
- ຄົນເຈັບທີ່ເປັນພະຍາດຕັບອັກເສບ.

ຄໍາເຕືອນ:

- ບໍ່ແນະນຳໃຊ້ກັບຄົນເຈັບທີ່ເປັນເບົາຫວານ ປະເພດ 1 ຫລື type I diabetes ketoacidosis.
- ໃຫ້ຢຸດນຳໃຊ້ຢ່າງນິທິນທີ່ ຫາກພົບເຫັນອາການກ່ຽວກັບມ້າມຜິດປົກກະຕິ (symptoms of pancreatitis appear).
- ໃຫ້ຮັບຊາບວ່າ ຜົນຂອງຢາ ເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດຕ່ຳໃນລະຫວ່າງການນຳໃຊ້.
- ການໃຊ້ຢາ ອາດພາໃຫ້ເກີດ ການຕິດເຊື້ອລາ ຕາມອົງຄະຕ່າງໆ.
- ບໍ່ແນະນຳ ໃຫ້ໃຊ້ໃນແມ່ຍິງຖືພາ, ແມ່ຍິງລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່.
- ການໃຊ້ຢາໃນເດັກ ແລະ ຄົນສູງອາຍຸຄວນໃຊ້ຢ່າງລະມັດລະວັງ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

- ການຕິດເຊື້ອຕາມທາງເດີນປັດສະວະ, ອັກເສບໂຜ້ງດັງ, ຕິດເຊື້ອ ທາງເດີນຂອງລະບົບຫາຍໃຈສ່ວນເທິງ.

ຮູບແບບຂອງຢາ: ຢາເມັດສີຂາວ.

ວັນຫມົດອາຍຸ: 24 ເດືອນ ນັບຈາກວັນທີ່ຜະລິດ.

ຂະໜາດບັນຈຸ: ບັນຈຸໃນກັບ, 1 ກັບມີ 2 ແຜງ, 1 ແຜງມີ 7 ເມັດ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນກັບກ່ອງບັນຈຸເດີມ, ບໍ່ໃຫ້ຖືກແສງ ເກັບໄວ້ໃນຫ້ອງທີ່ມີ ອຸນຫະພູມລະຫວ່າງ 20°C-25°C.
- ເກັບຮັກສາ ຢາໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກມືເດັກ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຮູບ ຈຳກັດ

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com