

ALIERYTHROMYCIN

Generic name: Erythromycin

Brand Name: ALIERYTHROMYCIN

Composition: Erythromycin.....500mg.

Indications:

- Used as an alternative medication for treating the following infections in patients with penicillin allergies: respiratory tract infections, skin infections, hemolytic streptococcal infection, diphtheria, intestinal amebiasis, acute pelvic inflammatory disease, pertussis, syphilis and Legionnaires' disease.

Dosage:

Oral administration.

- Adults, take ½ or 1 full tablet four times daily.
- Legionella patients should take 1-2 tablets four times daily.
- Children take 30-50 mg/kg of their body weight per day, divided into 3-4 doses.
- When treating hemolytic streptococcal infection with this product, it should be continued for at least 10 days to prevent the occurrence of acute rheumatic fever.

Contraindications:

- It is contraindicated for individuals allergic to this product and other macrolide drugs.

Warning:

- Patients with renal and/or hepatic impairment, use with caution.
- Pregnant and lactating women should use with caution.

Adverse reaction:

- Diarrhea, nausea, vomiting, upper and middle abdominal pain, mouth and tongue pain, decreased appetite, rash, etc.

Dosage form: Pink tablets.

Expiry date: 36 months from the date of manufacture.

Packaging: 10 tablets/blister, 10 blisters/box.

Storage:

- Protected from light, sealed in original packaging, and stored at 20°C- 25°C.
- Keep out of reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory

Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com

ເອກະສານກຳກັບຢາ ALIERYTHROMYCIN

ຊື່ທົດໄປ: Erythromycin

ຊື່ການຄ້າ: ALIERYTHROMYCIN

ສ່ວນປະກອບ: Erythromycin.....500mg

ຂໍ້ບົງໃຊ້:

- ໃຊ້ທົດແທນເພື່ອປິ່ນປົວການຕິດເຊື້ອພະຍາດສຳລັບຄົນເຈັບ ຜູ້ທີ່ແພ້ຢາໃນກຸ່ມ Penicillin ເຊັ່ນ: ການຕິດເຊື້ອພະຍາດທາງເດີນຫາຍໃຈ, ການຕິດເຊື້ອພະຍາດທາງຜິວໜັງ, ການຕິດເຊື້ອພະຍາດ Streptococcal ທີ່ເຮັດໃຫ້ເມັດເລືອດແດງແຕກ, ພະຍາດຄໍຕິບ, ພະຍາດ amebiasis ໃນລຳໄສ້, ພະຍາດກະດູກກົກອັກເສບ, ພະຍາດ Pertussus, ພະຍາດ syphilis ແລະ Legionnaires.

ວິທີໃຊ້:

ນຳໃຊ້ຮັບປະທານ.

- ຜູ້ໃຫຍ່, ນຳໃຊ້ໃນປະລິມານ $\frac{1}{2}$ ຫຼື 1 ເມັດ, 4 ຄັ້ງຕໍ່ວັນ.
- ຄົນເຈັບທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດ Legionella, ຄວນນຳໃຊ້ໃນປະລິມານ 1-2 ເມັດ, 4 ຄັ້ງຕໍ່ວັນ.
- ເດັກນ້ອຍ, ນຳໃຊ້ໃນປະລິມານ 30-50mg/kg ຂອງນ້ຳໜັກຮ່າງກາຍ, ແບ່ງນຳໃຊ້ 3-4 ຄັ້ງຕໍ່ວັນ.
- ໃນການປິ່ນປົວການຕິດເຊື້ອພະຍາດ Streptococcal ທີ່ເຮັດໃຫ້ເມັດເລືອດແດງແຕກດ້ວຍ ຜະລິດຕະພັນນີ້ຄວນນຳໃຊ້ຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາ 10 ວັນ, ເພື່ອປ້ອງກັນການເກີດອາການໄຂ້ອັກເສບກະທັນຫັນ.

ຂັ້ນຕອນໃຊ້:

- ຫ້າມນຳໃຊ້ສຳລັບຄົນເຈັບທີ່ມີອາການແພ້ຕໍ່ຜະລິດຕະພັນນີ້ ແລະ ຢາໃນກຸ່ມ macrolide.

ຄຳເຕືອນ:

- ຄົນເຈັບທີ່ເປັນພະຍາດໄຕ ຫຼື ຕັບ ຜິດປົກກະຕິ, ຄວນນຳໃຊ້ຢ່າງລະມັດລະວັງ.
- ແມ່ຍິງທີ່ກຳລັງຖືພາ ແລະ ແມ່ຍິງທີ່ກຳລັງລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່, ຄວນນຳໃຊ້ຢ່າງລະມັດລະວັງ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

- ຖອກທ້ອງ, ປວດຮາກ, ຮາກ, ປວດທ້ອງສ່ວນເທິງ ແລະ ກາງ, ເຈັບປາກ ແລະ ລິນ, ເປືອອາຫານ, ຜືນຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນ.

ຮູບແບບຂອງຢາ: ຢາເມັດສີປົວ.

ວັນຫມົດອາຍຸ: 36 ເດືອນນັບຈາກວັນທີ່ຜະລິດ.

ຂະໜາດບັນຈຸ: ບັນຈຸໃນກັບ, 1 ກັບມີ 10 ແຜງ, 1 ແຜງມີ 10 ເມັດ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນກັບກ່ອງ ບັນຈຸເດີມ, ບໍ່ໃຫ້ຖືກແສງແດດ ເກັບໄວ້ໃນຫ້ອງທີ່ມີ ອຸນຫະພູມລະຫວ່າງ 20°C-25°C.
- ເກັບຮັກສາຢາໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກມືເດັກ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຮູບ ຈຳກັດ

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com