

ALIFENAC

Generic name: Diclofenac sodium

Brand Name: ALIFENAC

Composition: Diclofenac sodium 50mg

Indications:

- Acute and chronic rheumatoid arthritis, osteoarthritis, and ankylosing spondylitis.
- Shoulder periarthrititis, bursitis, tendinitis and tenosynovitis.
- Generalized pain such as: toothache, earache, postoperative pain, lower back pain, sprains, strain and other soft tissue injuries.
- Acute gout.
- Dysmenorrhea and adnexitis.

Dosage:

- Take whole capsule after meals: Twice a day, one capsule (50mg) at a time, or as directed by a physician.

Contraindications:

- Patients known to be allergic to this product or other non-steroidal anti-inflammatory drugs.
- Contraindicated for the treatment of perioperative pain during coronary artery bypass grafting (CABG).
- Patients with a history of gastrointestinal bleeding or perforation after ingestion of nonsteroidal anti-inflammatory drugs.
- Patients with severe heart failure.

Warning:

- Use with caution in patients with abnormal blood system, hypertension, heart disease and impaired renal function.
- Patients with a history of vertigo or other central nervous system disorders should not drive or operate machinery while taking the drug.
- Attention should be paid to the dosage and adverse reactions when combined with lithium preparations, digoxin, potassium diuretics, anticoagulants, hypoglycemics and methotrexate.
- This medication should not be taken during pregnancy or breastfeeding.
- Children and elderly patients should use this medication with caution.

Adverse Effects:

- Common adverse effects include headache, constipation, diarrhea, nausea, indigestion, abdominal pain and other gastrointestinal reactions.
- Rare adverse effects include impaired renal function, cardiac arrhythmia and tinnitus.

Dosage form: Yellow capsules.

Expiry data: 24 months from the date of manufacture.

Packaging: 10 capsules/blister, 50 blisters/box.

Storage:

- Protected from light, sealed in original packaging and stored at 20 - 25°C.
- Keep out of reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory
Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR
Tel: +856-21-737 051
www.alliancepharmagroup.com

ເອກະສານກຳກັບຢາ ALIFENAC

ຊື່ທົ່ວໄປ: Diclofenac sodium

ຊື່ການຄ້າ: ALIFENAC

ສ່ວນປະກອບ: Diclofenac sodium 50mg

ຂໍ້ຍິງໃຊ້:

- ນຳໃຊ້ໃນພະຍາດຂໍ້ອັກເສບສຽບຜັນ ແລະ ຂ້າເຮືອ, ຂໍ້ກະດູກເສື້ອມ, ກະດູກສັນຫຼັງອັກເສບ.
- ຂໍ້ຕໍ່ປ່າອັກເສບ, ຖົງນ້ຳໃນຂໍ້ອັກເສບ, ເອີ້ນອັກເສບ ແລະ ເອີ້ນຍຶດຂໍ້ອັກເສບ.
- ປິ່ນປົວບັນເທົາອາການປວດຫົວໄປເຊັ່ນ: ເຈັບແຂ້ວ, ຫູ, ປວດຫຼັງຈາກການຜ່າຕັດ, ປວດຫຼັງສ່ວນລຸ່ມ, ຂໍ້ຟັກ, ແລະ ການບາດເຈັບອື່ນໆ.
- ປິ່ນປົວບັນເທົາພະຍາດປະດິງຂໍ້ສຽບຜັນ.
- ປິ່ນປົວບັນເທົາການປວດປະຈຳເດືອນ ແລະ ຕ່ອມນ້ຳເຫຼືອງອັກເສບ.

ວິທີໃຊ້:

- ນຳໃຊ້ຕາມການແນະນຳຂອງທ່ານໝໍ, ຮັບປະທານ 2 ແຄັບຊູນ (ແຄັບຊູນລະ 50mg) ຫຼັງການຮັບປະທານອາຫານ: ຮັບປະທານວັນລະ 2 ຄັ້ງ.

ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້:

- ຄົນເຈັບທີ່ຮັບຮູ້ວ່າຕົນເອງແດ້ຜະລິດຕະຜົນນີ້ ຫຼື ຢາຕ້ານອັກເສບທີ່ບໍ່ມີສະເຕຣອຍເຊະນິດອື່ນໆ.
- ຫ້າມນຳໃຊ້ໃນການປິ່ນປົວອາການປວດລະຫວ່າງການຜ່າຕັດເຮັດບາຍພາດຫຼອດເລືອດຫົວໃຈ(CABG).
- ຄົນເຈັບທີ່ມີປະຫວັດເລືອດອອກໃນທາງເດີນອາຫານ ຫຼື ມີຮູທະລູຫຼັງຈາກຮັບປະທານຢາຕ້ານອັກເສບທີ່ບໍ່ໃຊ້ສະເຕຣອຍ.
- ຄົນເຈັບທີ່ມີພາວະຫົວໃຈລົ້ມເຫຼວຮຸນແຮງ.

ຄຳເຕືອນ:

- ນຳໃຊ້ຢ່າງລະມັດລະວັງໃນຄົນເຈັບທີ່ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງລະບົບເລືອດ. ຄວາມດັນເລືອດສູງ, ພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຫມາກໄຂ່ຫຼັງ.
- ຄົນເຈັບທີ່ມີອາການວິນຫົວ ຫຼື ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງລະບົບປະສາດສ່ວນກາງອື່ນໆ, ບໍ່ຄວນຂັບລົດ ຫຼື ເຮັດວຽກພິວັດພັນກັບເຄື່ອງກົນຈັກໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ຢາ.
- ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ກັບປະລິມານຢາແລະອາການທາງລົບເມື່ອນຳໃຊ້ກັບ lithium, potassium diuretics, ຢາຂັບປັດສະວະ, ຢາປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເລືອດກ້າມ, ຢາຫຼຸດນ້ຳຕານໃນເລືອດ ແລະ methotrexate.
- ຢານີ້ບໍ່ຄວນນຳໃຊ້ໃນແມ່ຍິງທີ່ກຳລັງຖືພາ ຫຼື ແມ່ຍິງທີ່ກຳລັງໃຫ້ນ້ຳນົມລູກ.
- ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຄົນເຈັບຜູ້ສູງອາຍຸຄວນນຳໃຊ້ຢານີ້ດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

- ບັນດາຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ມັກພົບປະກອບມີ ເຈັບຫົວ, ເຈັບຫ້ອງ, ຫ້ອງຜູກ, ຖອກຫ້ອງ, ຮູ້ສຶກແສບຮ້ອນ ໃນກະເພາະອາຫານ, ປຸ້ນຫ້ອງ, ອາຫານບໍ່ຍ່ອຍ ມີອາການປິ່ນປ່ວນທາງເດີນອາຫານ, ການທຳງານຂອງໄຂ່ຫຼັງຫລຸດລົງ, ອາການທີ່ບໍ່ຄ່ອຍພົບ ມີ ການທຳງານຂອງຫົວໃຈຜິດປົກກະຕິ ຫຼືເຕັ້ນບໍ່ເປັນຈັງຫວະ, ຫຼືອີ້ ແລະ ອື່ນໆ.
- ບັນດາຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ພົບໄດ້ໜ້ອຍປະກອບມີ ການທຳງານຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງບົກພ່ອງ, ຫົວໃຈເຕັ້ນຜິດຈັງຫວະ ແລະ ມີສຽງດັງໃນຫູ.

ຮູບແບບຂອງຢາ: ຢາແຄັບຊູນສີເຫຼືອງ.

ວັນຫມົດອາຍຸ: 24 ເດືອນ ນັບຈາກວັນທີ່ຜະລິດ.

ຂະໜາດບັນຈຸ: 1 ກັບມີ 50 ແຜງ, 1 ແຜງມີ 10 ແຄັບຊູນ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນກັບກ່ອງ ບັນຈຸເດີມ, ບໍ່ໃຫ້ຖືກແສງແດດ ເກັບໄວ້ໃນຫ້ອງທີ່ມີ ອຸນຫະພູມ ລະຫວ່າງ 20°C-25°C.
- ເກັບຮັກສາຢາໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກມືເດັກ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຣຸບ ຈຳກັດ

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com