

ALIFIXIME

Generic Name: Cefixime dispersible

Brand Name: ALIFIXIME

Composition: Cefixime.....200mg

Indications:

- Cefixime is used to treat certain infections caused by sensitive bacteria, such as bronchitis, gonorrhea and infections of the ears, throat, tonsils and urinary tract.

Dosage:

- Adult. 200mg orally every 12 hours.

Contraindications:

- Patients with allergies to cefixime or other cephalosporins are contraindicated.

Warnings:

- You should not take cefixime if you have allergies to cefixime or other cephalosporin antibiotics.
- Use this product under the direction of a physician.

Adverse effects:

- Stomach upset/pain, diarrhea, nausea, gas, headache, or dizziness may occur. If any of the effects persist or worsen, inform your physician immediately.

Dosage form: White to light yellow tablets.

Expiry date: 24 from the date of manufacture.

Packaging: 10 tablets/blister, 10 blisters/box.

Storage:

- Protect from light, keep sealed, and store in a dry place (not exceeding 20°C).
- Keep out of the reach of children.

Manufactured by:

Kinhoo Pharmaceutical Co., Ltd.

Address: Bio-industry Zone, Golden Coast, Zhuhai, Guangdong, China

Imported by:

Lao Alliance Pharmaceutical Import-Export Sole Co., Ltd

Address: Phonsinuan Village, Sisattanak District, Vientiane Capital, Lao PDR.

Tel: +856-21-737051

www.alliancepharmagroup.com

ເອກະສານກຳກັບຢາ ALIFIXIME

ຊື່ທົ່ວໄປ: Cefixime dispersible

ຊື່ການຄ້າ: ALIFIXIME

ສ່ວນປະກອບ: Cefixime.....200mg

ຂໍ້ບັງໃຊ້:

- ນຳໃຊ້ປິ່ນປົວບັນດາອາການທີ່ເປັນສາເຫດຈາກການຕິດເຊື້ອເຊັ່ນ: ຫລອດລົມອັກເສບຮຸນແຮງ, ປອດບວມ, ການຕິດເຊື້ອຊໍາເຮື້ອໃນທາງເດີນລະບົບຫາຍໃຈ, ພິກຍ່ຽວອັກເສບ, ຕິດເຊື້ອຕາມທໍ່ປັດສະວະ, ຖົງນ້ຳປີອັກເສບ, ໄຊນິດອັກເສບ, ຫູຫນອງ, ຫູອັກເສບ ແລະ ໄຂ້ແມງແດງເຫລົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ.

ວິທີໃຊ້:

- ຜູ້ໃຫຍ່ຮັບປະທານໃນປະລິມານ 200mg ທຸກໆ 12 ຊົ່ວໂມງ.

ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້:

- ຫ້າມນຳໃຊ້ກັບຄົນເຈັບຫີແຜ່ຢາມີ, ລວມທັງຄົນເຈັບຫີແຜ່ຢາຕ້ານເຊື້ອກຸ່ມ cephalosporins.

ຄຳເຕືອນ:

- ຫ້າມນຳໃຊ້ກັບຄົນເຈັບຫີແຜ່ຢາມີ, ລວມທັງຄົນເຈັບຫີແຜ່ຢາຕ້ານເຊື້ອກຸ່ມ cephalosporins, ຄວນແຈ້ງໃຫ້ແພດໝັ້ນຮັບຮູ້ຫາກວ່າທ່ານແຜ່ຢາຕ້ານເຊື້ອໃນກຸ່ມ penicillin.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

- ເຈັບກະເພາະ, ຖອກທ້ອງ, ປວດຮາກ, ມີລົມໃນທ້ອງ, ເຈັບຫົວ ຫຼື ວິນວຽນຫົວ, ຫາກພົບອາການດັ່ງກ່າວຍັງຄົງຢູ່ ຫຼື ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ ໃຫ້ແຈ້ງແພດໝັ້ນທັນທີ.

ຮູບແບບຂອງຢາ: ເປັນຢາເມັດ ສີຂາວຫາເຫລືອງອ່ອນ.

ອາຍຸຂອງຢາ: 24 ເດືອນ ນັບຈາກວັນທີຜະລິດ.

ຂະໜາດບັນຈຸ: ບັນຈຸໃນກັບ, 1 ກັບມີ 10 ແຜງ, 1 ແຜງມີ 10 ເມັດ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບຮັກສາໃນກັບກ່ອງບັນຈຸເດີມ, ບໍ່ໃຫ້ຖືກແສງແດດ, ເກັບຢາໃນບ່ອນແຫ້ງອຸນຫະພູມບໍ່ເກີນ 20°C.
- ເກັບຮັກສາຢາໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກມືເດັກ.

ຜະລິດໂດຍ:

Kinhoo Pharmaceutical Co., Ltd

Address: Bio-industry Zone, Golden Coast, Zhuhai, Guangdong, China

ນຳເຂົ້າໂດຍ:

Lao Alliance Pharmaceutical Import-Export Sole Co., Ltd

ສະຖານທີ່: ບ້ານໂພນສິນວນ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.

ໂທລະສັບ: +856-21-737051

www.alliancepharmagroup.com