

ALIFOLATE

Generic name: Folic acid tablets

Brand Name: ALIFOLATE

Composition: Folic acid.....0.4mg

Indications:

- Prevention of congenital neural tube malformations in fetuses.
- Dietary Supplement for pregnant and lactating women.

Dosage:

- Women of childbearing age who planning pregnancy until at least three months after pregnancy. 1 tablet per day.
- Lactating women: 1 tablet per day.

Contraindications:

- Patients who are allergic to this product.
- Megaloblastic anemia caused by vitamin B₁₂ deficiency cannot be treated with folic acid alone.

Warning:

- Oral administration of large doses of folic acid can affect the absorption of zinc.
- High doses of folic acid can antagonize the anti-epileptic effects of phenobarbital, phenytoin sodium, and propafenone.
- During the use of this product, please consult a doctor if taking multivitamins or other health supplements containing folic acid.

Adverse Effects:

- Adverse reactions are rare. Long term use may cause gastrointestinal disorders such as anorexia, nausea, and bloating. Large doses of folic acid may darken urine.

Dosage form: Light yellow tablets.

Expiry date: 24 months from the date of manufacture.

Packaging: 10 Tablets/blister, 20 blisters/box.

Storage:

- Keep in original packaging in a dark dry place.
- Keep out of reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory
Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR
Tel: +856-21-737 051
www.alliancepharmagroup.com

ເອກະສານກຳກັບຢາ ALIFOLATE

ຊື່ທົ່ວໄປ: Folic acid tablets

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ: ALIFOLATE

ສ່ວນປະກອບ: Folic acid 0.4mg

ຂໍ້ບັງໃຊ້:

ການຂາດ Folic acid ເປັນສາເຫດໃຫ້ ເປັນພະຍາດເລືອດຈາງ ແລະ ພັດທະນາໄປສູ່ການຜິດປົກກະຕິຂອງລະບົບປະສາດ ຂອງເດັກໃນທ້ອງໄດ້, ຈຶ່ງນຳໃຊ້ໃນກໍລະນີດັ່ງນີ້:

- ໃຊ້ໃນແມ່ຍິງຖືພາ ເພື່ອປ້ອງກັນ ອາການຜິດປົກກະຕິທາງປະສາດ ຂອງເດັກໃນທ້ອງ.
- ໃຊ້ປ້ອງກັນພະຍາດເລືອດຈາງ ໃນແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ແມ່ຍິງທີ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່.

ວິທີໃຊ້:

ໃຊ້ຕາມການແນະນຳຂອງແພດ

- ໃຊ້ໃນແມ່ຍິງຖືພາ ເພື່ອປ້ອງກັນ ການຜິດປົກກະຕິຂອງລະບົບປະສາດຂອງເດັກໃນທ້ອງ: ເລີ່ມໃຫ້ກິນຕັ້ງແຕ່ການວາງແຜນຖືພາ ຈົນໄປຮອດ ເດັກໃນທ້ອງມີອາຍຸ 3 ເດືອນ ໃຊ້ໃນປະລິມານ 1 ເມັດ ຕໍ່ຄັ້ງ ກິນ ວັນລະຄັ້ງ.
- ໃຊ້ໃນແມ່ຍິງທີ່ກຳລັງລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ.
- ແມ່ ປ້ອງກັນ ອາການເລືອດຈາງ ແລະ ໃນແມ່ຍິງຖືພາ, ໃຊ້ກິນວັນລະເມັດ ແລະ ໃຊ້ວັນລະຄັ້ງ.

ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້:

- ຫ້າມໃຊ້ໃຜຜ້າຝັຢາມີ, ຄວນແຈ້ງໃຫ້ແພດຊາບກ່ອນການນຳໃຊ້ຢາ ໃນກໍລະນີ ມີບັນຫາທາງດ້ານສຸຂະພາບເພື່ອແພດຈະໄດ້ປັບປະລິມານນຳໃຊ້ທີ່ເໝາະສົມເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍເຊັ່ນ: ເປັນພະຍາດກ່ຽວກັບໄຂ້ຫລັງ ຫລືຢູ່ໄລຍະການຟອກໄຂ້ຫລັງ, ເປັນພະຍາດເລືອດຈາງ ຈາກການຕິດເຊື້ອ.
- ການປົນປົວພະຍາດເລືອດຈາງ ບໍ່ສາມາດທົດແທນສະພາບການຂາດ ວິຕາມິນ B12 ໄດ້ ດັ່ງນັ້ນ ຄົນເຈັບຄວນໄດ້ຮັບຢາ ຕາມແພດກຳນົດຢ່າງຖືກຕ້ອງ ໂດຍບໍ່ຄວນຢຸດໃຊ້ຢາຕົວໃດຕົວໜຶ່ງ.

ຄຳເຕືອນ:

- ການນຳໃຊ້ Folic acid ໃນປະລິມານເກີນຄວາມຈຳເປັນສາມາດເຮັດໃຫ້ການຕູດຊີມບາງສານເຄມີໃນຮ່າງກາຍມີບັນຫາໄດ້ເຊັ່ນ: ສານສັງກະສີ (Zinc).
- ການໃຫ້ປະລິມານ Folic acid ສູງ ສາມາດເປັນຜົນປະຕິຢັກ ຕໍ່ຢາຕ້ານປ້າຫມູໄດ້ໃນບາງກຸ່ມເຊັ່ນ: Phenobarbital, Phenytoin sodium, and Propafenone.
- ພະຍາດເລືອດຈາງສ່ວນໃຫຍ່ຈະຕາມມາດ້ວຍ ການຂາດສານເກືອແຮ່ ແລະ ວິຕາມິນຕ່າງໆດັ່ງນັ້ນ ຄວນມີການບຳລຸງ ທາງໂພສະນາການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕື່ມເຊັ່ນ: ຫາດເຫລັກ, ໂປຕິນ, ບັນດາ ວິຕາມິນກຸ່ມB ເປັນຕົ້ນ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

- ຜົນຂ້າງຄຽງໃນການນຳໃຊ້ບໍ່ຄ່ອຍພົບ, ແຕ່ການນຳໃຊ້ຢາ ເປັນເວລາຍາວ ແລະເກີນປະລິມານ ຈະພົບເຫັນອາການເຫລົ່ານີ້ເຊັ່ນ: ຮໍສຶກມືນຊາ ຫລື ຄັນຕາມຮ່າງກາຍ, ເຈັບປວດບໍລິເວນປາກ ແລະ ລິ້ນ, ບໍ່ມີແຮງ, ສັບສົນມືນງົງ, ກະວົນກະວາຍ, ບໍ່ມີສະມາທິ, ມີອາການຜິດປົກກະຕິທາງກະເພາະລຳໄສ້, ປັດສະວະປ່ຽນສີ.

ຮູບແບບຢາ: ຢາເມັດສີເຫຼືອງອ່ອນ.

ວັນຫມົດອາຍຸ : 24 ເດືອນ ນັບຈາກວັນທີ່ຜະລິດ.

ຂະໜາດບັນຈຸ: ບັນຈຸໃນກັບ, 1 ກັບມີ 20 ແຜງ, 1 ແຜງມີ 10 ເມັດ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບຮັກສາໃນກັບກ່ອງເຕີມປິດໃຫ້ສະນິດ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຖືກແສງແດດໂດຍກົງ.
- ເກັບຮັກສາຢາ ຫ່າງໄກຈາກມື້ເດັກ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຣຸບ ຈຳກັດ

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051
www.alliancepharmagroup.com