

ALIFOLATE

Generic name: Folic acid tablets

Brand Name: ALIFOLATE

Composition: Folic acid.....5mg

Indications:

- Treatment of various causes of folic acid deficiency.
- Preventive medication for pregnant and lactating women
- Folic acid deficiency caused by chronic hemolytic anemia

Dosage:

- Adults: 5-10mg (1-2 tablets) or 15-30mg (3-6 tablets) once daily, until blood count returns to normal.
- Children: 5mg (1 tablet) per dose, 3 times daily, until blood count returns to normal.
- Pregnant women for the prevention of neural tube defects (spina bifida): 5mg once a day while planning pregnancy and three months after pregnancy.

Contraindications:

- Individuals who are allergic to this product.
- Megaloblastic anemia caused by vitamin B₁₂ deficiency cannot be treated with folic acid alone.

Warning:

- Oral administration of large doses of folic acid can affect the absorption of zinc.
- High doses of folic acid can antagonize the anti-epileptic effects of phenobarbital, phenytoin sodium, and propafenone.
- Nutritional megaloblastic anemia often accompanies iron deficiency, and iron, protein, and other B vitamins should be supplemented simultaneously.

Adverse Effects:

Adverse reactions are rare. Long term use can cause gastrointestinal symptoms such as anorexia, nausea, and bloating. Large doses of folic acid may darken urine.

Dosage form: pale yellow tablet

Expiry date: 24 months from the date of manufacture

Packaging: 10 tablets per blister pack, 20 blister packs per box.

Storage:

- Keep in original packaging in a dark, dry place.
- Please keep out of reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory

Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com

ເອກະສານກຳກັບຢາ

ALIFOLATE

ຊື່ທົ່ວໄປ: Folic acid tablets

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ: ALIFOLATE

ສ່ວນປະກອບ: Folic acid.....5mg

ຂໍ້ບັງໃຊ້:

- ໃຊ້ປິ່ນປົວ ອາການພະຍາດເລືອດຈາງ ທີ່ມີສາເຫດມາຈາກ Folic acid ບໍ່ພຽງພໍ.
- ໃຊ້ປ້ອງກັນພະຍາດເລືອດຈາງ ໃນແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ແມ່ຍິງທີ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່.
- ໃຊ້ປິ່ນປົວການຂາດ Folic acid ທີ່ເກີດຈາກພະຍາດເລືອດຈາງຈາກເມັດເລືອດແດງແຕກຊໍາເຮືອ.

ວິທີໃຊ້:

- ຜູ້ໃຫຍ່: ກິນໃນປະລິມານ 5-10mg (1-2 ເມັດ) ຕໍ່ຄັ້ງ, ກິນ 3 ຄັ້ງ ຕໍ່ວັນ. ຈົນກວ່າປະລິມານເມັດເລືອດຈະກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ.
- ເດັກນ້ອຍ: ໃຫ້ກິນໃນປະລິມານ 5mg (1 ເມັດ) ແຕ່ລະຄັ້ງ, ກິນ 3 ຄັ້ງ ຕໍ່ວັນ (ໃນປະລິມານ 5-15mg ຕໍ່ວັນ, ແບ່ງເປັນ 3 ເທື່ອ).
- ໃນແມ່ຍິງໄວຈະເລີນພັນ ກ່ອນການວາງແຜນຄອບຄົວ ກິນກ່ອນ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ເດືອນ ແລະ ໃຫ້ກິນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໃນໄລຍະຖືພາ ເພາະສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນການພິການຂອງເດັກແຕ່ກໍາເນີດ ລວມທັງປ້ອງກັນ ພະຍາດທາງສະໝອງ ແລະ ສັນຫຼັງໄດ້.

ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້:

- ຫ້າມນຳໃຊ້ໃນຜູ້ທີ່ແຜ່ຢານີ.
- ພະຍາດເລືອດຈາງປະເພດ Megaloblastic ທີ່ເກີດຈາກການຂາດວິຕະມິນ B12 ທີ່ບໍ່ສາມາດຮັກສາໄດ້ດ້ວຍ Folic acid ພຽງຢ່າງດຽວ.

ຄຳເຕືອນ:

- ການນຳໃຊ້ Folic acid ໃນປະລິມານເກີນຄວາມຈຳເປັນ ສາມາດ ເຮັດໃຫ້ການດູດຊຶມ ບາງສານ ເຄມີ ໃນຮ່າງກາຍມີບັນຫາໄດ້ ເຊັ່ນ: ສານສັງກະສີ (Zinc).
- ການໃຫ້ປະລິມານ Folic acid ສູງ ສາມາດເປັນຜົນປະຕິປັກຕູຢາຕ່າງໆໄດ້ໃນບາງກຸ່ມ ເຊັ່ນ: Phenobarbital, Phenytoin sodium and Propafenone.
- ພະຍາດເລືອດຈາງສ່ວນໃຫຍ່ ຈະຕາມມາດ້ວຍ ການຂາດສານເກືອແຮ່ ແລະ ວິຕາມິນຕ່າງໆ ດັ່ງນັ້ນ ຄວນມີການບຳລຸງ ທາງໂພສະນາການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕື່ມ ເຊັ່ນ: ທາດເຫຼັກ, ໂປຼຕິນ, ບັນດາ ວິຕາມິນກຸ່ມ B ເປັນຕົ້ນ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

ຜົນຂ້າງຄຽງໃນການນຳໃຊ້ບໍ່ຄ່ອຍພົບ, ແຕ່ການນຳໃຊ້ຢາ ເປັນເວລາດົນ ແລະ ເກີນປະລິມານ ຈະພົບເຫັນອາການເຫຼົ່ານີ້ ເຊັ່ນ: ຮຸ້ນສຶກມືນ, ຊາ ຫຼື ຄັນ ຕາມຮ່າງກາຍ, ເຈັບປວດບໍລິເວນປາກ ແລະ ລິ້ນ, ບໍ່ມີແຮງ, ສັບສົນມືນງິງ, ກະວົນກະວາຍ ບໍ່ມີສະມາທິ, ມີອາການຜິດປົກກະຕິທາງກະເພາະລຳໄສ້, ປັດສະວະ ປ່ຽນສີ.

ຮູບແບບຂອງຢາ: ຢາເມັດສີເຫຼືອງອ່ອນ.

ວັນຫມົດອາຍຸ : 24 ເດືອນ ຫຼັງຈາກວັນທີ່ຜະລິດ.

ຂະໜາດບັນຈຸ: ບັນຈຸໃນກັບ, 1 ກັບມີ 20 ແຜງ, 1 ແຜງມີ 10 ເມັດ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບຮັກສາໃນກັບກ່ອງເຕີມປິດສະນິດ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຖືກແສງແດດໂດຍກົງ.
- ເກັບຮັກສາຢາ ຫ່າງໄກຈາກມື້ເດັກ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຣຸບ ຈຳກັດ

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com