

ALIFUBATINIB

Generic name: Futibatinib tablets

Brand Name: ALIFUBATINIB

Composition:

Futibatinib4mg

Indications:

- ALIFUBATINIB is a kinase inhibitor indicated for the treatment of adult patients with previously treated, unresectable, locally advanced or metastatic intrahepatic cholangiocarcinoma harboring fibroblast growth factor receptor 2 (FGFR2) gene fusions or other rearrangements.

Dosage:

- The recommended dosage of ALIFUBATINIB is 20 mg taken orally once daily until disease progression or unacceptable toxicity occurs.
- Take ALIFUBATINIB with or without food at approximately the same time each day.
- Swallow the tablets whole. Do not crush, chew, break or dissolve the tablets.
- If the patient misses a dose of ALIFUBATINIB for more than 12 hours or if vomiting occurs, resume dosing with the next scheduled dose.

Contraindications:

- None.

Warnings:

- Ocular Toxicity: ALIFUBATINIB can cause retinal pigment epithelial detachment (RPED).
- Hyperphosphatemia and Soft Tissue Mineralization.
- Embryo-Fetal Toxicity: Can cause fetal harm. Advise patients of reproductive potential of the potential risk to the fetus and to use effective contraception.

Adverse Effects:

- Nail toxicity, musculoskeletal pain, constipation, diarrhea, fatigue, dry mouth, alopecia, stomatitis, abdominal pain, dry skin, arthralgia, dysgeusia, dry eye, nausea, decreased appetite, urinary tract infection, palmar-plantar erythrodysesthesia syndrome, and vomiting.

Dosage form: White tablets.

Packaging: 35 tablets/Bottle.

Expiry date: 48 months from the date of manufacture.

Storage:

- Store sealed in original packaging below 30°C.
- Keep out of reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory

Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com

ເອກະສານກຳກັບຢາ ALIFUBATINIB

ຊື່ທົ່ວໄປ: Futibatinib tablets

ຊື່ການຄ້າ: ALIFUBATINIB

ສ່ວນປະກອບ:

Futibatinib 4 mg

ຂໍ້ບົ່ງໃຊ້:

- ALIFUBATINIB ເປັນສານຢັບຢັງ kinase inhibitor ມີໜ້າທີ່ໃນການຂັດຂວາງການເຮັດວຽກຂອງ ໂປຣຕີນໂຄເນສ (protein kinases) ເຊິ່ງເປັນເອີມໄຊທີ່ຄວບຄຸມການເຮັດວຽກຂອງຈຸລັງ, ໃຊ້ປິ່ນປົວຄົນເຈັບຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ເປັນມະເຮັງທໍ່ນ້ຳບີ, ຕັບ ໃນໄລຍະຮຸກຮານ ຫຼື ແຜ່ລາມ, ມີການເຕົ້າໂຮມຂອງຈຸລັງສອງຕົວຮັບເຊິ່ງເປັນປັດໃຈຂອງການຈະເລີນເຕີບໂຕ (fibroblast growth factor receptor 2 (FGFR2)) ຫຼື ມີການຈັດລ້ຽງຄືນໃໝ່ຂອງເຊື້ອພະຍາດ.

ວິທີໃຊ້:

- ປະລິມານທີ່ແນະນຳໃຊ້ ALIFUBATINIB ຄື 20 mg, 1 ຄັ້ງຕໍ່ມື້ ຈົນເຖິງໄລຍະແຜ່ລາມຂອງພະຍາດ ຫຼື ເກີດພິດເບືອ ທີ່ຄົນເຈັບບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້.
- ຄວນກິນຢາ ALIFUBATINIB ກ່ອນ ຫຼື ຫຼັງອາຫານ ໃນເວລາດຽວກັນແຕ່ລະມື້.
- ກິນເມັດຢາທັງໝົດພ້ອມກັບນ້ຳ, ຫ້າມບິດ, ຫ້າມເມັດຢາ, ຫຍ້າ ແລະ ລະລາຍເມັດຢາ.
- ຫ້າມຄືນເຈັບກິນຢາ ALIFUBATINIB ດື່ມກວ່າ 12 ຊົ່ວໂມງ, ໃນກໍລະນີມີອາການຮາກ ບໍ່ໃຫ້ກິນທິດແທນຄືນ, ແມ່ນໃຫ້ກິນຢາຕາມກຳນົດເວລາໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ.

ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້:

- ຍັງບໍ່ທັນມີຂໍ້ມູນ.

ຄຳເຕືອນ:

- ພິດຕໍ່ຕາ: ຢາ ALIFUBATINIB ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການຫຼຸດລອກຂອງເມັດສີໃນແກ້ວຕາ (retinal pigment epithelial detachment (RPED)).
- ພາວະ ຟິສເຟສ ໃນເລືອດສູງ (Hyperphosphatemia) ເນື່ອງຈາກການທຳງານຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງຜິດປົກກະຕິ ແລະ ມີການສະສົມແຮ່ທາດໃນເຍື່ອເມືອກອ່ອນ.
- ເປັນພິດຕໍ່ຕົວອ່ອນ ແລະ ເຕັກໃນທ້ອງ: ອາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ເຕັກໃນທ້ອງ, ແນະນຳໃຫ້ຄົນເຈັບຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຕໍ່ເຕັກໃນທ້ອງ ແລະ ຄວນໃຊ້ຢາຄຸມກຳເນີດທີ່ມີປະສິດທິພາບ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

- ເກີດເປັນພິດຕໍ່ເລັບ, ປວດກ້າມຊີ້ນ ແລະ ກະດູກ, ທ້ອງຜູກ, ຖອກທ້ອງ, ອ່ອນເພຍ, ປາກແຫ້ງ, ປາກອັກເສບ, ຜົມລືນ, ເຈັບທ້ອງ, ຜິວໜັງແຫ້ງ, ເຈັບຂໍ້ກະດູກ, ປວດເກັງກ້າມຊີ້ນ, ຕາແຫ້ງ, ປວດຮາກ, ບໍ່ຫົວເຂົ້າ, ມີການຕິດເຊື້ອລະບົບທາງເດີນປັດສະວະ, ມີກຸ່ມອາການຜິດປົກກະຕິຂອງຝ່າຍມື ຝ່າຍຕີນ (palmar-plantar erythrodysesthesia syndrome) ແລະ ຮາກ

ຮູບແບບຂອງຢາ: ຢາເມັດສີຂາວ.

ຂະໜາດບັນຈຸ: ບັນຈຸໃນກ່ອງ, 1 ກ່ອງມີ 35 ເມັດ.

ວັນທີມີຄອາຍຸ: 48 ເດືອນນັບຫຼັງຈາກວັນທີ່ຜະລິດ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນກ່ອງບັນຈຸເຕີມ, ປິດຝາສະໝິດ, ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນອຸນຫະພູມຕໍ່າກວ່າ 30°C.
- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກມື້ເດັກ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຝາກມາ ກຮູບ ຈຳກັດ

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com