

ALIHAIIRS

Generic name: Finasteride

Brand name: ALIHAIIRS

Composition : Finasteride.....1mg

Indications:

- Treatment for male pattern baldness.
- Treatment of benign prostatic hyperplasia (enlarged prostate).

Dosage:

- Taken orally. 1 mg (1 tablet) once daily, can be taken on an empty stomach or with food.

Contraindications:

- This product is contraindicated in women who may be pregnant or pregnant.
- Those who are allergic to any ingredient of this product are contraindicated.

Warnings:

- This product is not suitable for women who are or may become pregnant.
- This product is not suitable for children.
- Patients with hepatic impairment should be used with caution.

Adverse Effects:

- Long-term use may cause impotence, loss of libido, decreased sperm count, ejaculation disorders, enlarged mammary glands, breast pain and testicular pain.
- Other adverse effects include itching, allergic reactions such as rash and swelling of the face and lips.

Dosage form: White tablets.

Packaging: 1 mg per tablet, 30 tablets per bottle.

Expiry date: 24 months from the date of manufacture.

Storage:

- Store in a cool and dry place below 30°C protect from light.
- Keep out of reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory.

Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com

Note: This product is not effective in diagnosing, treating or preventing diseases.

ເອກະສານກຳກັບຢາ ALIIHAIRS

ຊື່ທົວໄປ: Finasteride

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ: ALIIHAIRS

ສ່ວນປະກອບ: Finasteride..... 1mg

ຂໍ້ບົງໃຊ້:

- ນຳໃຊ້ເພື່ອການຮັກສາຜົມທີ່ລົ້ນຈາກກຳມະພັນຮ່ວມກັບຢາ Minoxidil, ເຊິ່ງມັນຈະກະຕຸ້ນການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເສັ້ນຜົມ ແລະ ປ້ອງກັນການລົ້ນຂອງເສັ້ນຜົມ.

ວິທີໃຊ້:

- ໃຊ້ກິນຄັ້ງລະເມັດ ວັນລະຄັ້ງ, ກິນໃນເວລາທ້ອງຖວ່າງ ຫຼື ກິນພ້ອມອາຫານກໍໄດ້. ກິນຕິດຕໍ່ກັນຢ່າງໜ້ອຍ 3 ເດືອນ, ຈະເຫັນຜົນຊັດເຈນ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ປີ.

ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້:

- ຫ້າມໃຊ້ຢາກິນໃນແມ່ຍິງໄວຈະເລີນພັນ ແລະ ໃນແມ່ຍິງຖືພາເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເດັກໃນຄັນຜິດປົກກະຕິ.
- ຫ້າມໃຊ້ໃນຄົນທີ່ເປັນໂລກຕັບ, ລະບົບການທຳງານຂອງຕັບຜິດປົກກະຕິ.

ຄຳເຕືອນ:

- ຢາກິນ ບໍ່ເຫມາະສົມໃຊ້ກັບແມ່ຍິງ, ຫ້າມໃຊ້ໃນຍິງຖືພາ ແລະ ກຽມຕັ້ງຄັນ.
- ຫ້າມໃຊ້ຢາກິນໃນເດັກ.
- ສຳລັບຄົນເຈັບ ຫຼື ແພ້ຢາກິນ ຫຼື ແພ້ສ່ວນປະກອບ ທີ່ປະສົມໃນຢາກິນ ຫ້າມນຳໃຊ້.
- ຄົນເຈັບທີ່ເປັນໂລກກ່ຽວກັບຕັບ ໜ້າທີ່ການທຳງານຂອງຕັບຫຼຸດຜ່ອນ ບໍ່ຄວນນຳໃຊ້ຢາກິນ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

- ການນຳໃຊ້ຢາກິນເປັນເວລາດົນນານ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການເສື່ອມສະມັດຕະພາບທາງເພດ ເຊັ່ນ: ການແຂງຕົວຂອງອະໄວຍະວະເພດຫຼຸດລົງ, ຄວາມຕ້ອງການທາງເພດຫຼຸດລົງ, ປະລິມານນ້ຳອະສຸຈິຫຼຸດລົງຜົນຂ້າງຄຽງຈະຫາຍໄປຫຼັງຢຸດນຳໃຊ້ຢາ ພາຍໃນ 1 ເດືອນ. ເຕົາໜົມໃຫຍ່ຂຶ້ນ, ຮູ້ສຶກເຈັບ, ເຈັບບໍລິເວນອັນຫະ, ວັດແທກຄ່າການທຳງານຂອງຕັບຜິດປົກກະຕິ.
- ເກີດອາການແພ້ ສາມາດສັງເກດເຫັນ ອາການບວມທີ່ໜ້າ, ປາກ, ເປັນຜົນ ແລະ ຄັນ.

ຮູບແບບຂອງຢາ: ຢາເມັດສີຂາວ.

ຂະໜາດບັນຈຸ: ບັນຈຸໃນກ່ອງ, 1 ກ່ອງ 30 ເມັດ.

ວັນຫມົດອາຍຸ: 24 ເດືອນ ນັບຈາກວັນທີ່ຜະລິດ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ຄວນເກັບຮັກສາໄວ້ໃນສະຖານທີ່ເຢັນ, ແຫ້ງອຸນຫະພູມ ຕໍ່າກວ່າ 30°C, ບໍ່ໃຫ້ຖືກແສງແດດ.
- ເກັບໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ເດັກບໍ່ສາມາດຢືມເຖິງ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຣຸບ ຈຳກັດ

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com

ໝາຍເຫດ: ຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວ ບໍ່ມີສັບພະຄຸນໃນການບຶງມະຕິ, ປິ່ນປົວ ຫຼື ປ້ອງກັນພະຍາດໄດ້