

# ALIHYDROCORTISONE

**Generic name:** Hydrocortisone

**Brand Name:** Alihydrocortisone

**Composition:** Hydrocortisone.....10mg

**Indications:**

- Mainly used as an alternative treatment for adrenal insufficiency and congenital adrenal hyperplasia.
- It can also be used for rheumatoid arthritis, collagen disease, eye inflammation, rheumatic fever, gout, bronchial asthma, allergic diseases, and can be used for severe infection and shock treatment.

**Dosage:**

- Please use according to your doctor's instructions.
- Daily dosage varies from 20mg – 240mg, depending on the disease being treated.
- Adjust dosage according to the severity of the patient's illness, the maximum daily dose should not exceed 240mg.

**Contraindications:**

- Individuals who are allergic to any component of this product.
- Patients with systemic fungal infections.

**Warnings:**

- The use of this product may trigger new infections.
- Long term use for subcapsular cataract and glaucoma may damage the optic nerve.
- Pregnant and lactating women should avoid use.
- Elderly patients should test for hypertension and osteoporosis during medication.

**Adverse Effects:**

- Nausea, heartburn, headache, trouble sleeping, increased sweating or acne may occur, if any of these effects persist or get worse, please inform your doctor immediately.

**Dosage form:** White tablets.

**Expiry date:** 24 months from the date of manufacture.

**Packaging:** 7 tablets/blister, 2 blisters/box.

**Storage:**

- Protect from light, keep sealed and store at 20°C- 25°C.
- Keep out of reach of children.

**Manufactured by:**

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory

Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-21-737 051

[www.alliancepharmagroup.com](http://www.alliancepharmagroup.com)

# ເອກະສານກຳກັບຢາ ALIHYDROCORTISONE

**ຊື່ທົ່ວໄປ:** Hydrocortisone

**ຊື່ຜະລິດຕະພັນ:** ALIHYDROCORTISONE

**ສ່ວນປະກອບ:** Hydrocortisone.....10mg

## ຂ້ອງໃຊ້:

- ນຳໃຊ້ເປັນຢາໃນການປິ່ນປົວພາວະການທຳງານຂອງຕ່ອມເທິງໜາກໄຂ່ຫຼັງບໍ່ພຽງພໍ ຫຼື ພາວະຕ່ອມເທິງໜາກໄຂ່ຫຼັງ ທຳງານຜິດປົກກະຕິ ແຕ່ກຳເນີດ.
- ຍັງສາມາດນຳໃຊ້ເພື່ອປິ່ນປົວອາການ ຂອງພະຍາດປະດິງຂໍ້, ພະຍາດຜິວໜັງອັກເສບ, ເອີນ, ກະດູກ ແລະ ກ້າມເນື້ອ, ຕາອັກເສບ, ອາການໄຂ້ຈາກພະຍາດ ລູມາຕິກ, ພະຍາດປະດິງ, ອັກເສບຫຼອດລົມ, ພະຍາດພູມແພ້ຕ່າງໆ, ປິ່ນປົວການຕິດເຊື້ອຮຸນແຮງ ລວມທັງອາການຊ້ອກຕ່າງໆ.

## ວິທີໃຊ້:

- ນຳໃຊ້ພາຍໃຕ້ຄຳຊີ້ນຳຂອງແພດໝໍ.
- ປະລິມານໃນການນຳໃຊ້ປະມານ 20-240mg, ຂຶ້ນກັບພະຍາດທີ່ກຳລັງຮັກສາຢູ່.
- ປັບປະລິມານຄວາມແຮງໄປຕາມການປິ່ນປົວຂອງຄົນເຈັບ, ປະລິມານສູງສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນ 240mg ຕໍ່ວັນ.

## ຂ້າມໃຊ້:

- ຫ້າມໃຊ້ໃນຜູ້ແພ້ຢາ.
- ໃນຄົນເຈັບທີ່ມີການຕິດເຊື້ອລາ ຕ່າງໆ.

## ຄຳເຕືອນ:

- ໃນລະຫວ່າງການນຳໃຊ້ຢາ ອາດພາໃຫ້ກະຖັນການຕິດເຊື້ອໃໝ່.
- ການໃຊ້ຢານີ້ ເປັນເວລາດົນນານໃນຄົນເຈັບທີ່ມີ ຕັກະຈິກຫຼືຕາ, ຄົນເຈັບທີ່ມີອາການຄວາມດັນຕາສູງ ສາມາດພາໃຫ້ເສັ້ນປະສາດຕາຖືກທຳລາຍ.
- ໃນແມ່ຍິງຖືພາ, ແມ່ຍິງລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່ ຄວນຫຼີກລ້ຽງການນຳໃຊ້.
- ການໃຊ້ຢານີ້ ໃນຜູ້ສູງອາຍຸ ຄວນລະມັດລະວັງ ດຸໝັ່ນກວດຄວາມດັນເລືອດ ແລະ ກວດລະດັບຊຸຍກະດູກ ໃນຊ່ວງການນຳໃຊ້.

## ຜົນຂ້າງຄຽງ:

- ປວດຮາກ, ແສບຮ້ອນໃນບໍລິເວນເອິກ, ປວດຫົວ, ນອນຫຼັບຍາກ, ເຫືອອອກຫຼາຍຂຶ້ນ, ມີສິວ ແລະ ຖ້າຫາກວ່າຍັງພົບອາການເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ ຫຼື ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນໃຫ້ໄປພົບແພດຫັນທີ.

**ຮູບແບບຂອງຢາ:** ຢາເມັດສີຂາວ.

**ວັນຫມົດອາຍຸ:** 24 ເດືອນ ນັບຈາກວັນທີ່ຜະລິດ.

**ຂະໜາດບັນຈຸ:** ບັນຈຸໃນກັບ, 1 ກັບມີ 2 ແຜງ, 1 ແຜງມີ 7 ເມັດ.

## ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນກັບກ່ອງບັນຈຸເດີມ, ບໍ່ໃຫ້ຖືກແສງແດດ, ເກັບໄວ້ໃນຫ້ອງທີ່ມີອຸນຫະພູມລະຫວ່າງ 20°C-25°C.
- ເກັບຮັກສາຢາໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກມືເດັກ.

## ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຮູບ ຈຳກັດ

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com