

ALIJI-3

Generic name: Sofosbuvir / Velpatasvir

Brand Name: ALIJI-3

Composition:

Sofosbuvir.....400mg

Velpatasvir.....100mg

Indications:

Treatment of chronic HCV genotypes 1, 2, 3, 4, 5, or 6 infections in adults and children aged 3 years and older:

- Without cirrhosis or with compensated cirrhosis.
- With advanced cirrhosis (decompensated) for use in combination with ribavirin.

Dosage:

- **One tablet daily taken orally,** for 12 weeks.
- When used in combination with ribavirin, please also refer to the prescription information of drugs containing ribavirin.
- The drug can be taken with or without food.

Contraindications:

- Patients who are allergic to any component of this product.

Warning:

- The risk of hepatitis B virus reactivation in patients with co infection of HCV and HBV.
- It is not recommended to use this product in combination with amiodarone as there is a risk of symptomatic bradycardia.
- It is not recommended to use in combination with strong P-gp inducers and strong CYP inducers.
- When used in combination with ribavirin, refer to the warnings and precautions of ribavirin.
- Pregnant and lactating women should use it with caution.

Adverse Effects:

- Headache, fatigue, nausea, anemia, insomnia, **diarrhea.**

Dosage form: Pink tablets.

Packaging: 28 tablets/bottle.

Expiry date: 24 months from the date of manufacture.

Storage:

- Protected from light, sealed **in original packaging,** at 20°C- 25°C.
- Keep out of reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory.

Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-21-737 051.

www.alliancepharmagroup.com

ເອກະສານກຳກັບຢາ ALIJI-3

ຊື່ທົ່ວໄປ: Sofosbuvir and Velpatasvir tablets

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ: ALIJI-3

ສ່ວນປະກອບ:

Sofosbuvir.....400mg

Velpatasvir.....100mg

ຂໍ້ບົງໃຊ້:

ນຳໃຊ້ເພື່ອປິ່ນປົວ ອາການຕິດເຊື້ອໄວຣັດຊີ ຕັບອັກເສບ (HCV genotype 1, 2, 3, 4, 5, ຫລື 6) ໃນ ຜູ້ໃຫຍ່ ແລະໃນເດັກທີມີອາຍຸ **3 ປີ ຫຼື ຫລາຍກວ່າ:**

- ໃນຄົນເຈັບຫົບຫັນມີອາການຕັບແຂງ ຫຼື ກວດພົບມີອາການຕັບແຂງ (Compensated cirrhosis)
- ໃນຄົນເຈັບຕັບແຂງ ຊະນິດ Decompensated cirrhosis ໃຊ້ຮ່ວມກັບ Ribavirin

ວິທີໃຊ້:

- ນຳໃຊ້ຮັບປະທານ, ໂດຍກິນຄັ້ງລະເມັດ ວັນລະຄັ້ງ ຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາ 12 ອາທິດ.
- ການໃຊ້ຢາຮ່ວມກັບ Ribavirin ຄວນອີງຕາມການແນະນຳຂອງແພດ ແລະ ອີງຕາມຂໍ້ມູນການແນະນຳໃນການນຳໃຊ້ຂອງ Ribavirin.
- ສາມາດກິນກ່ອນ ຫຼື ຫລັງອາຫານໄດ້.

ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້:

- ຄົນເຈັບຫົບແຜ່ຢານີ ຫຼື ສ່ວນປະກອບ ໃນຕົວຢາ ຄວນຈຳກັດໃນການນຳໃຊ້.

ຄຳເຕືອນ:

- ການໃຊ້ຢາສາມາດເກີດຄວາມສ່ຽງ ໃນການຕິດເຊື້ອ ໄວຣັດຕັບ ອັກເສບ ບີ ເພີມຕີມ ເຮັດໃຫ້ເກີດການຕິດເຊື້ອຮ່ວມ HCV ແລະ HBV.
- ການໃຊ້ຢານີ ບໍ່ຄວນໃຊ້ຮ່ວມກັບຢາກຸ່ມ Amiodarone ຈະພາໃຫ້ການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈຊ້າລົງ.
- ບໍ່ຄວນໃຊ້ຢານີຮ່ວມກັບ Potent P-gp inducers ແລະ ຢາກຸ່ມ Potent CYP inducers ເຮັດໃຫ້ຄວາມເປັນພິດຂອງຢາເພີມຂຶ້ນ.
- ການໃຊ້ຢາຮ່ວມກັບ Ribavirin ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຝົ້າລະວັງເປັນພິເສດ ແລະ ຕິດຕາມອາການສົນຂອງ Ribavirin ເພີມຕີມ.
- ໃນຍິງຖືພາ ຍິງທີ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່ ຄວນມີການລະມັດລະວັງໃນການນຳໃຊ້.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

- ປວດຫົວ, ເມືອຍ, ວິນວຽນ, ເລືອດຈາງ, ນອນບໍ່ຫລັບ, ຖອກຫ້ອງ ແລະ ອື່ນໆ.

ຮູບແບບຂອງຢາ: ເປັນເມັດສີປົວ.

ວັນຫມົດອາຍຸ: 24 ເດືອນ ນັບຈາກວັນທີຜະລິດ.

ຂະໜາດບັນຈຸ: ບັນຈຸໃນກ່ອງ, 1 ກ່ອງບັນຈຸ 28 ເມັດ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບຮັກສາຢາ ໃນກັບກ່ອງບັນຈຸເດີມ ປິດແຈບ, ບໍ່ໃຫ້ຖືກແສງ, ຄວາມຮ້ອນ, ເກັບໄວ້ໃນຫ້ອງໃນອຸນຫະພູມ 20°C-25°C.
- ເກັບຮັກສາຢາ ໃຫ້ຫ່າງຈາກມືເດັກ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຣຸບ ຈຳກັດ.

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com