

ALILEVO

Generic name: Levonorgestrel Tablets

Proprietary Name: ALILEVO

Composition:

Levonorgestrel.....1.5mg

Indications:

- Female emergency contraception to reduce the chance of conception after unprotected sex.

Dosage:

- Take one tablet orally within 72 hours of unprotected sexual activity or contraceptive failure.

Contraindications:

- Contraindicated in patients with breast cancer, reproductive organ cancer, abnormal liver function or recent history of liver disease or jaundice, venous thrombosis, cerebrovascular accident, hypertension, cardiovascular disease, diabetes, hyperlipidemia, mental depression and women over 40 years old.

Warning:

- This product is used for emergency pregnancy prevention, not for induced labor or routine contraceptive use.
- If irregular uterine bleeding or severe abdominal pain occurs about 3-5 weeks after taking the medicine, seek medical advice in time to exclude Ectopic pregnancy.
- For people under the age of 17, please consult a doctor before using this product.
- Breastfeeding women, stop breastfeeding for at least 3 days after use.

Adverse Effects:

- Nausea, vomiting, breast tenderness, headache, dizziness, fatigue, etc.
- There may be abnormal uterine bleeding, please seek medical attention promptly.

Dosage form: C tablet

Expiry date: 24 months from the date of manufacture

Packaging: 1 tablet per box

Storage:

- Store sealed in original packaging below 25°C.
- Please keep out of reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory.

Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-21-737 051.

www.alliancepharmagroup.com

ເອກະສານກຳກັບຢາ ALILEVO

ຊື່ທົວໄປ: Levonorgestrel Tablets

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ: ALILEVO

ສ່ວນປະກອບ:

Levonorgestrel.....1.5mg

ຂໍ້ຍິງໃຊ້:

- ນຳໃຊ້ເປັນຢາຄຸມກຳເນີດ ແບບສຸກເສີນ ໃຊ້ໃນແມ່ຍິງ ທີ່ຕ້ອງການຄຸມກຳເນີດສຸກເສີນ ທີ່ບໍ່ມີມາດຕະການໃນການປ້ອງກັນການຕັ້ງຄັນ ຫຼື ອຸປັດຕິເຫດສຸກເສີນ ທີ່ບໍ່ທັນຜ່ອນທີ່ຈະຕັ້ງຄັນ.

ວິທີໃຊ້:

- ຮັບປະທານ 1 ເມັດ ພາຍໃນເວລາ 72 ຊົ່ວໂມງ ຫຼັງການມີເພດສຳພັນທີ່ບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນ ຫຼື ວິທີການຄຸມກຳເນີດທີ່ນຳໃຊ້ຢູ່ ຜ່ານມາບໍ່ມີຜົນ.

ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້:

- ຫ້າມໃຊ້ໃນຄົນເຈັບທີ່ເປັນມະເຮັງເຕົານົມ, ມະເຮັງມີດລູກ, ຄົນເຈັບທີ່ມີໜ້າທີ່ການທຳງານຂອງຕັບຜິດປົກກະຕິ, ມີປະຫວັດອາການເຫຼືອງ (ຂີ້ຫມາກເຫຼືອງ) ຫຼື ບັນຫາກ່ຽວກັບຖົງນ້ຳບີ, ຄົນເຈັບທີ່ມີບັນຫາທາງຫຼອດເລືອດຕັນ, ມີບັນຫາກ່ຽວກັບເສັ້ນເລືອດໃນສະໝອງ, ຄວາມດັນເລືອດສູງ, ມີບັນຫາກ່ຽວກັບພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ເສັ້ນເລືອດ, ເປົາຫວານ, ໄຂມັນໃນເລືອດສູງ, ພາວະຊຶມເສົ້າທາງຈິດໃຈ ແລະ ໃນແມ່ຍິງທີ່ມີອາຍຸສູງກວ່າ 40 ປີ.

ຄຳເຕືອນ:

- ຢ່າມີນຳໃຊ້ ໃນເປົ້າໝາຍປ້ອງກັນການຕັ້ງຄັນ ແບບສຸກເສີນ ບໍ່ແມ່ນເພື່ອເປົ້າໝາຍໃນການເຮັດແທ້ງບຸດ.
- ກໍລະນີມີຄວາມຜິດປົກກະຕິ ມີເລືອດອອກທາງທີ່ປັດສະວະ ຫຼື ຊ່ອງຄອດ ມີອາການປວດທ້ອງຮຸນແຮງ ໃນລະຫວ່າງ 3 ຫາ 5 ອາທິດຫຼັງການນຳໃຊ້ຢາ ຄວນໄປປຶກສາແພດທັນທີ ເພື່ອເບິ່ງອາການຜິດປົກກະຕິຂອງມີດລູກ ທີ່ອາດມີ ຫຼື ບໍ່ມີບັນຫາຕັ້ງຄັນນອກມີດລູກ.
- ສຳລັບແມ່ຍິງທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 17 ປີ ຄວນປຶກສາແພດກ່ອນການນຳໃຊ້.
- ແມ່ຍິງຢູ່ໃນໄລຍະລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່, ຄວນຢຸດການໃຫ້ນົມລູກຊົ່ວຄາວຢ່າງໜ້ອຍເປັນເວລາ 3 ວັນ ນັບຈາກເວລາຮັບປະທານຢາ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

- ປຸ້ນທ້ອງ, ຮາກ, ເຈັບປວດເຕົານົມ, ເຈັບຫົວ, ວິນວຽນ, ອິດເມືອຍ ແລະ ອື່ນໆ.
- ອາດມີເລືອດໄຫຼໃນມີດລູກ ຫຼື ທ່ຽວ ຄວນປຶກສາແພດດ່ວນຖ້າພົບເຫັນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ.

ຮູບແບບຢາ: ຢາເມັດສີຂາວ.

ວັນຫມົດອາຍຸ: 24 ເດືອນ ຫຼັງຈາກວັນທີ່ຜະລິດ.

ຂະໜາດບັນຈຸ: 1 ເມັດຕໍ່ ກັບ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນກັບກ່ອງເດີມພາຍໃນອຸນຫະພູມຕໍ່າກວ່າ 25°C.
- ເກັບຮັກສາໃຫ້ຫ່າງຈາກມືເດັກ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຮູບ ຈຳກັດ.

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com