

ALILINAGLIPTIN

Generic name: Linagliptin

Brand Name: ALILINAGLIPTIN

Composition: Linagliptin.....5mg

Indications:

- Indicated as an adjunct to diet and exercise to improve glycemic control in adults with type 2 diabetes.
- Can be used as monotherapy or in combination with Metformin hydrochloride, sulfonylureas, and insulin.

Dosage:

- Please use according to your doctor's instructions.
- 5mg once a day, with or without food.

Contraindications:

- Patients who are allergic to this product.

Warning:

- This product is not applicable to type I diabetes or type I diabetes ketoacidosis.
- In combination with sulfonylureas or insulin may cause hypoglycemia.
- Pregnant and lactating women should use with caution.
- Use with caution for children.

Adverse Effects:

- Hypersensitivity reactions, nasopharyngeal inflammation, rash, oral ulcers, and stomatitis.

Dosage form: White tablets

Expiry date: 24 months from the date of manufacture.

Packaging: 7 tablets/blister, 2 blisters/box.

Storage:

- Protected from light, sealed, and stored at 20°C- 25°C.
- Keep out of reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory

Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com

ເອກະສານກຳກັບຢາ ALILINAGLIPTIN

ຊື່ທົ່ວໄປ: Linagliptin

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ: ALILINAGLIPTIN

ສ່ວນປະກອບ: Linagliptin.....5mg

ຂໍ້ບົ່ງໃຊ້:

- ໃຊ້ເພື່ອປົນປົວພະຍາດເບົາຫວານ ປະເພດ 2 ຮ່ວມກັບ ການຄວບຄຸມອາຫານ ແລະ ການອອກກຳລັງກາຍ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ຄວບຄຸມລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດ.
- ສາມາດນຳໃຊ້ເປັນຢາຕ່ຽວ ຫຼື ນຳໃຊ້ຮ່ວມກັນກັບ Metformin hydrochloride, sulfonylureas, and insulin.

ວິທີໃຊ້:

- ນຳໃຊ້ພາຍໃຕ້ຄໍາຊີ້ນຳຂອງແພດໝໍ.
- ໃຊ້ຮັບປະທານ ໃນປະລິມານ 5mg, ມື້ລະຄັ້ງ ສາມາດ ກິນກ່ອນ ຫຼື ຫຼັງອາຫານ.

ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້:

- ຫ້າມໃຊ້ໃນຄົນເຈັບຫີແຜ່ຢານີ.

ຄໍາເຕືອນ:

- ບໍ່ແນະນຳໃຊ້ກັບຄົນເຈັບຫີເປັນເບົາຫວານ ປະເພດ 1 ຫລື type I diabetes ketoacidosis.
- ການໃຊ້ຢານີຮ່ວມກັບ sulfonylureas ຫລື insulin ອາດພາໃຫ້ປະລິມານນ້ຳຕານ ໃນເລືອດ ຕ່ຳກວ່າປົກກະຕິ (hypoglycemia).
- ການໃຊ້ຢານີ ໃນແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ແມ່ຍິງທີ່ສ້າງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່ ຄວນລະວັງ.
- ຄວນໃຊ້ຢາຢ່າງລະມັດລະວັງໃນເດັກ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

- ການເກີດການແຜ່ຢາ, ເກີດການອັກເສບໃນໂຜ້ງຕັງ, ເປັນຜົນຕາມຜິວໜັງ, ອັກເສບໃນໂຜ້ງປາກ ແລະກະເພາະ.

ຮູບແບບຂອງຢາ: ຢາເມັດສີຂາວ.

ວັນຫມົດອາຍຸ: 24 ເດືອນ ນັບຈາກວັນທີ່ຜະລິດ

ຂະໜາດບັນຈຸ: ບັນຈຸໃນກັບ, 1 ກັບມີ 2 ແຜງ, 1 ແຜງມີ 7 ເມັດ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນກັບກ່ອງບັນຈຸເດີມບໍ່ໃຫ້ຖືກແສງແດດ, ເກັບໄວ້ໃນຫ້ອງທີ່ມີອຸນຫະພູມລະຫວ່າງ 20°C-25°C.
- ເກັບຮັກສາ ຢາໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກມືເດັກ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຮູບ ຈຳກັດ

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com