

ALILODINE-75

Generic name: Clonidine Hydrochloride

Brand name: ALILODINE-75

Composition: Clonidine Hydrochloride.....75µg.

Indications:

- Hypertension.

Dosage:

- 1~2 tablets orally three times daily. may be increased or decreased according to symptoms. For severe hypertension, take 4 tablets and administer 3 times daily.

Contraindications:

- Should not be used in patients with known hypersensitivity to clonidine.

Warning:

- Sudden cessation of clonidine treatment may result in withdrawal symptomatology; the physician should reduce the dose gradually over 2 to 4 days.
- Because children commonly have gastrointestinal illnesses that lead to vomiting, they may be particularly susceptible to hypertensive episodes resulting from abrupt inability to take medication.
- Since patients may experience a possible sedative effect, dizziness, or accommodation disorder with use of clonidine, caution patients about engaging in activities such as driving a vehicle or operating appliances or machinery. Also, this sedative effect may be increased by concomitant use of alcohol, barbiturates, or other sedating drugs.
- Pregnant and nursing women should use with caution.

Adverse effects:

- Dry mouth, drowsiness, dizziness, constipation and sedation.

Dosage form: White tablet.

Expiry date: 24 months from the date of manufacture.

Packaging: 100 tablets/bottle.

Storage:

- Store in original packaging 20°C-25°C, protected from moisture and direct sunlight.
- Keep out of reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory

Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com

ເອກະສານກຳກັບຢາ ALILODINE-75

ຊື່ທົວໄປ: Clonidine Hydrochloride

ຊື່ການຄ້າ: ALILODINE-75

ສ່ວນປະກອບ: Clonidine Hydrochloride.....75µg.

ຂ້າງໃຊ້:

- ໃຊ້ປິ່ນປົວ ຄວາມດັນເລືອດສູງ (Hypertension).

ວິທີໃຊ້:

- ໃຊ້ຮັບປະທານ 1~2 ເມັດ, ກິນ 3 ຄັ້ງ ຕໍ່ວັນ, ການນຳໃຊ້ຕົວຈິງ ອາດມີການປັບປະລິມານ ເພີ່ມຂຶ້ນ ຕາມອາການຂອງຄົນເຈັບ. ໂດຍສະເພາະ ຜູ້ທີ່ມີ ອາການຄວາມດັນສູງທີ່ຮຸນແຮງ ອາດໃຊ້ ປະມານ 4 ເມັດຕໍ່ຄັ້ງໂດຍໃຫ້ກິນ 3 ຄັ້ງ ຕໍ່ວັນ.

ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້:

- ບໍ່ຄວນໃຊ້ໃນຜູ້ທີ່ມີອາການແພ້ກ່ຽວກັບຢານີ້.

ຄໍາເຕືອນ:

- ການຢຸດການປິ່ນປົວຢ່າງກະທັນຫັນກັບ clonidine ອາດຈະເຮັດໃຫ້ອາການຊຸດໂຊມລົງ; ແພດ ຄວນຄ່ອຍໆ ຫຼຸດປະລິມານຢາໃນໄລຍະ 2 ຫາ 4 ມື້.
- ເນື່ອງຈາກວ່າເດັກນ້ອຍມັກຈະມີອາການກະເພາະລຳໄສ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຮາກ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຂົາອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງໂດຍສະເພາະສຳລັບຄວາມດັນເລືອດສູງເປັນຜົນມາຈາກການບໍ່ ສາມາດກິນຢາໄດ້ຢ່າງກະທັນຫັນ.
- ເນື່ອງຈາກວ່າຄົນເຈັບອາດຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ຈິດປະສາດ, ວິນຫົວ ຫຼື ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງ ການຢຸດນຳໃຊ້ clonidine. ແພດຄວນແນະນຳໃຫ້ເຕືອນຄິນເຈັບກ່ຽວກັບກິດຈະກຳຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການຂັບລົດ ຫຼື ການເຮັດວຽກກ່ຽວພັນກັບເຄື່ອງກົນຈັກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜົນກະທົບຕໍ່ ຈິດປະສາດມີອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍການນຳໃຊ້ຮ່ວມກັນກັບທາດເຫຼົ້າ, barbiturates ຫຼື ຢາ ລະງັບປະສາດອື່ນໆ.
- ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ແມ່ຍິງໃຫ້ນົມລູກຄວນນຳໃຊ້ຢ່າງລະມັດລະວັງ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

- ປາກແຫ້ງ, ງ່ວງນອນ, ວິນວຽນຫົວ, ຫ້ອງຜູກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ກົດປະສາດການນອນຫລັບ.

ຮູບແບບຂອງຢາ: ຢາເມັດສີຂາວ.

ວັນຫມົດອາຍຸ: 24 ເດືອນນັບຈາກວັນທີຜະລິດ.

ຂະຫນາດບັນຈຸ: ບັນຈຸໃນກ່ອງ, 1 ກ່ອງ 100 ເມັດ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບຮັກສາຢາໃນກັບກ່ອງບັນຈຸເຕີມປິດແຈບ, ບໍ່ໃຫ້ຖືກແສງແດດ, ຄວາມຮ້ອນເກັບໄວ້ໃນ ຫ້ອງໃນອຸນຫະພູມ 20°C-25°C.
- ເກັບຮັກສາຢາ ໃຫ້ຫ່າງຈາກມືເດັກ

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຮູບ ຈຳກັດ

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com