

ALILOPERA

Generic name: Loperamide hydrochloride

Brand name: ALILOPERA

Composition:

Loperamide hydrochloride.....2mg

Indications:

- Follow the instructions of the doctor or pharmacist.
- For the symptomatic treatment of acute diarrhea in adults and children aged 12 years and over.
- Acute diarrhea complicated with irritable bowel syndrome in adults aged 18 and above.

Dosage:

- Acute diarrhea: Two capsules initially, followed by one capsule after each loose stool. The usual dose is 3-4 capsules a day. The total daily dose should not exceed 6 capsules.
- Acute diarrhea complicated with irritable bowel syndrome in adults aged 18 and above: Two capsules to be taken initially, followed by 1 capsule after each loose stool, or as advised by your doctor. The maximum daily dose should not exceed 6 capsules.

Contraindications:

- Individuals who are allergic to this product.
- in children less than 2 years of age.

Warning:

- For acute diarrhea, if there is no improvement in clinical symptoms, it is recommended to consult a doctor.
- When treating diarrhea with this product, fatigue and dizziness may occur.
- If constipation, bloating, and intestinal obstruction occur, this product should be immediately discontinued.

Adverse Effects:

- Constipation, bloating, headache, and nausea.

Dosage form: Light green capsule

Expiry date: 24 months from the date of manufacture.

Packaging: 10 capsules/blister, 50 blisters/box.

Storage:

- Store in original packaging.
- Please keep out of reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory.

Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-21-737 051.

www.alliancepharmagroup.com

ເອກະສານກຳກັບຢາ ALILOPERA

ຊື່ທົວໄປ: Loperamide hydrochloride

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ: ALILOPERA

ສ່ວນປະກອບ:

Loperamide hydrochloride.....2mg

ຂໍ້ບັງໃຊ້:

- ໃຫ້ນຳໃຊ້ຕາມຄຳແນະນຳຂອງແພດ ຫຼື ເພສີຊະກອນ.
- ໃຊ້ປິ່ນປົວອາການຖອກທ້ອງກະທັນຫັນ ໃນຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ເດັກທີມີອາຍຸ 12 ປີຂຶ້ນໄປ.
- ໃຊ້ປິ່ນປົວອາການຖອກທ້ອງກະທັນຫັນ ທີ່ມີອາການປິ່ນປ່ວນ ຂອງລະບົບລຳໄສ້ ໃນຜູ້ໃຫຍ່ ທີ່ມີອາຍຸ 18 ປີ ຂຶ້ນໄປ.

ວິທີໃຊ້:

- ສຳລັບອາການຖອກທ້ອງກະທັນຫັນ: ເລີ່ມຕົ້ນໃຫ້ກິນ 2 ແຄັບຊູນ, ຕໍ່ຈາກນັ້ນໃຫ້ກິນ 1 ແຄັບຊູນ ຫຼັງຈາກທີ່ມີການຖ່າຍແຫຼວແຕ່ລະຄັ້ງ, ປະລິມານຢາທີ່ນຳໃຊ້ປົກກະຕິຄື: 3-4 ແຄັບຊູນຕໍ່ມື້ ປະລິມານຢາສູງສຸດໃນມື້ໜຶ່ງທີ່ນຳໃຊ້ໝົດບໍ່ຄວນໃຫ້ເກີນ 6 ແຄັບຊູນ.
- ສຳລັບອາການຖອກທ້ອງກະທັນຫັນ ທີ່ມີອາການປິ່ນປ່ວນຂອງລະບົບລຳໄສ້ ໃນຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ມີອາຍຸ 18 ປີຂຶ້ນໄປ: ເລີ່ມຕົ້ນໃຫ້ກິນ 2 ແຄັບຊູນ, ຕໍ່ຈາກນັ້ນໃຫ້ກິນ 1 ແຄັບຊູນ ຫຼັງຈາກທີ່ມີການຖ່າຍແຫຼວແຕ່ລະຄັ້ງ, ຫຼື ໃຫ້ກິນຕາມການແນະນຳຂອງແພດ, ປະລິມານຢາສູງສຸດໃນມື້ໜຶ່ງ ບໍ່ຄວນໃຫ້ເກີນ 6 ແຄັບຊູນ.

ຂ້າງຢາມໃຊ້:

- ຫ້າມໃຊ້ໃນຜູ້ແພ້ຢານີ.
- ຫ້າມໃຊ້ໃນເດັກທີມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 2 ປີ.

ຄຳເຕືອນ:

- ສຳລັບອາການຖອກທ້ອງກະທັນຫັນ ຫຼັງຈາກກິນຢາແລ້ວ, ປະເມີນອາການແລ້ວບໍ່ດີຂຶ້ນ, ແນະນຳໃຫ້ປຶກສາແພດ
- ການປິ່ນປົວດ້ວຍຢານີ ຫາກພົບວ່າ ມີການອ່ອນເພຍ ວິນວຽນ ເກີດຂຶ້ນ ຄວນຢຸດຕິການນຳໃຊ້.
- ໃນລະຫວ່າງການນຳໃຊ້ຢານີປິ່ນປົວອາການຖອກທ້ອງ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດອາການອ່ອນເພຍ ແລະ ວິນຫົວໄດ້.
- ຖ້າມີອາການທ້ອງຜູກ, ທ້ອງອິດ, ແລະ ລຳໄສ້ອຸດຕັນ ຄວນຢຸດການໃຊ້ຢານີທັນທີ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

- ທ້ອງຜູກ, ທ້ອງອິດ, ເຈັບຫົວ ແລະ ປຸ້ນທ້ອງ.

ຮູບແບບຂອງຢາ: ແຄັບຊູນສີຂຽວອ່ອນ

ວັນໝົດອາຍຸ: 24 ເດືອນ ຫຼັງຈາກວັນທີ່ຜະລິດ.

ການບັນຈຸມັດຫໍ່: ບັນຈຸໃນກີບ, 1 ກີບມີ 50 ແຜງ, 1 ແຜງມີ 10 ແຄັບຊູນ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບຮັກສາຢາໃນກີບກ່ອງເດີມ.
- ເກັບຮັກສາຢາໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກມືເດັກ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຣຸບ ຈຳກັດ.

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com