

ALILSAZOMI

Generic name: Ixazomib citrate

Brand Name: ALILSAZOMI

Composition: Ixazomib citrate..... 4mg.

Indications:

- This product is a proteasome inhibitor, combined with lenalidomide and dexamethasone, it is used to treat adult patients with multiple myeloma who have received at least one previous treatment.

Dosage:

- Use under the guidance of a physician.
- In combination with lenalidomide and dexamethasone.
- The recommended starting dose of Ixazomib is 4 mg administered orally once a week on Days 1, 8, and 15 of a 28-day treatment cycle.
- Ixazomib citrate should be administered at least one hour before meals or at least two hours after meals.

Contraindications:

- Patients who are allergic to the active ingredients or any excipients of this product.

Warning:

- Thrombocytopenia: Monitor platelet counts at least monthly during treatment and adjust dosing, as needed.
- Peripheral Neuropathy: Monitor patients for symptoms of peripheral neuropathy and adjust dosing, as needed.
- Peripheral Edema: Monitor for fluid retention. Investigate for underlying causes, when appropriate. Adjust dosing, as needed.
- Cutaneous Reactions: Monitor patients for rash and adjust dosing, as needed.
- Thrombotic Microangiopathy: Monitor for signs and symptoms. Discontinue the product if suspected.
- Hepatotoxicity: Monitor hepatic enzymes during treatment.
- Embryo-Fetal Toxicity: The product can cause fetal harm. Advise patients of the potential risk to a fetus and to use effective non-hormone contraception.

Adverse Effects:

- Thrombocytopenia, neutropenia, diarrhea, constipation, peripheral neuropathy, nausea, peripheral edema, rash, vomiting, and bronchitis.

Dosage form: Orange capsules.

Expiry date: 36 months from the date of manufacture.

Packaging: 3 capsules/box.

Storage:

- Protected from light, sealed, and stored at 20°C- 25°C.
- Keep out of reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory

Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com

ເອກະສານກຳກັບຢາ ALILSAZOMI

ຊື່ທົວໄປ: Ixazomib citrate

ຊື່ການຄ້າ: ALILSAZOMI

ສ່ວນປະກອບ: Ixazomib citrate..... 4mg.

ຂ້າງໃຊ້:

- ເປັນຢາທີ່ໃຊ້ ປະສົມຮ່ວມກັບ lenalidomide ແລະ dexamethasone, ເພື່ອປິ່ນປົວມະເຮັງໄຂກະດູກ (myeloma) ຊະນິດຕ່າງໆໃນຜູ້ໃຫຍ່ ທີ່ຜ່ານການປິ່ນປົວດ້ວຍຢາຊະນິດອື່ນຜ່ານມາ ແລ້ວຢາງໜ້ອຍໜຶ່ງຄັ້ງ, ກິນໂກການອອກລິດຂອງມັນ ແມ່ນກົດຂວາງ ການທຳງານຂອງ proteasome (proteasome inhibitor).

ວິທີໃຊ້:

- ນຳໃຊ້ຕາມຄຳແນະນຳຂອງແພດ.
- ນຳໃຊ້ຮ່ວມກັນກັບ lenalidomide ແລະ dexamethasone.
- ຂະໜາດເລີມຕົ້ນ Ixazomib ປະລິມານ 4 mg ໃຫ້ຮັບປະທານໃນວັນທີ 1, 8, 15, ແລະ ໃນຮອບວຽນການປິ່ນປົວ 28 ວັນ.
- Ixazomib citrate ຄວນກິນກ່ອນອາຫານ 1 ຊົ່ວໂມງ ຫຼື ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຮັບປະທານອາຫານ.

ຂ້າງຢາມໃຊ້:

- ຫ້າມໃຊ້ຢາມີ ໃນຜູ້ທີ່ແຜ່ຕົວຢາ ແລະ ສ່ວນປະກອບໃນຕົວຢາ.

ຄຳເຕືອນ:

- ການເກີດສະພາບເກັດເລືອດຕ່ຳ (Thrombocytopenia) ຕິດຕາມການກວດເຊັກເມັດເລືອດເປັນປົກກະຕິ ຢ່າງໜ້ອຍ ເດືອນລະຄັ້ງ ຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນ ຕ້ອງປັບປະລິມານຢາມຳໃຊ້ໃຫ້ເໝາະສົມ.
- ຜົນກະທົບຕໍ່ປາຍປະສາດອັກເສບ (Peripheral Neuropathy): ຕິດຕາມສະພາບບັນຫາການໄຕ້ຕອບຂອງລະບົບປະສາດ ຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນ ຕ້ອງໄດ້ປັບຂະໜາດຢາ ເພື່ອໃຫ້ເໝາະສົມ.
- ອາການບວມຕາມແຂນຂາ: ກວດເຊັກອາການບວມນ້ຳ ເພື່ອຄືນຫາບັນດາສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ເກີດ, ອາດປັບປະລິມານຢາມຳໃຊ້ເພື່ອຄວາມເໝາະສົມ.
- ເກີດປະຕິກິລິຍາທາງຜິວໜັງ: ຕິດຕາມອາການເກີດຜິວໜັງຕາມຜິວໜັງ ຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນ ຕ້ອງໄດ້ປັບຂະໜາດ ການນຳໃຊ້ລົງ.
- ການເກີດລົມເລືອດ ຫຼື ເລືອດກ້າມອຸດຕັນຫຼອດເລືອດນ້ອຍ (Thrombotic Microangiopathy): ຕິດຕາມອາການ ຖ້າພົບເຫັນສັນຍານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄວນຢຸດການນຳໃຊ້.
- ອາການພິດເບືອຕໍ່ຕັບ: ກວດກາເອັນໄຊຂອງຕັບ ໃນລະຫວ່າງການນຳໃຊ້ຢາ.
- ການເກີດພິດເບືອຕໍ່ເດັກໃນທ້ອງ: ຢາມີ ສາມາດເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ເດັກໃນທ້ອງ ຄວນປຶກສາແພດ ຜູ້ໃຫ້ການປິ່ນປົວ ຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນໃຊ້ຢາ ຕ້ອງວາງແຜນຄຸມກຳເນີດ ໃນໄລຍະການນຳໃຊ້.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

- ການເກີດພາວະເກັດເລືອດຕ່ຳ, ອາການທາງປະສາດ (neutropenia), ຖອກທ້ອງ, ຫ້ອງຜູກ, ອາການເປັນພິດອັກເສບປາຍປະສາດ, ປຸ້ນທ້ອງ, ບວມ, ເປັນຜົນຕາມຜິວໜັງ, ຮາກ, ຫຼອດລົມອັກເສບ.

ຮູບແບບຂອງຢາ: ເປັນແຄັບຊູນສີສົມ.

ວັນຫມົດອາຍຸ: 36 ເດືອນ ນັບຈາກວັນທີຜະລິດ.

ຂະໜາດບັນຈຸ: ບັນຈຸໃນກັບ, 1 ແຜງມີ 3 ແຄັບຊູນ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນກັບກ່ອງບັນຈຸເດີມ, ບໍ່ໃຫ້ຖືກແສງແດດ, ເກັບໄວ້ໃນຫ້ອງທີ່ມີອຸນຫະພູມລະຫວ່າງ 20°C-25°C.
- ເກັບຮັກສາ ຢາໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກມືເດັກ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຽບ ຈຳກັດ

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com