

ALILUTRBOPA

Generic name: Lusutrombopag Tablets

Brand Name: ALILUTRBOPA

Composition:

Lusutrombopag.....3mg

Indications:

- ALILUTRBOPA is a thrombopoietin receptor agonist indicated for the treatment of thrombocytopenia in adult patients with chronic liver disease who are scheduled to undergo a procedure.

Dosage:

- Begin ALILUTRBOPA dosing 8-14 days prior to a scheduled procedure.
- Patients should undergo their procedure 2-8 days after the last dose.
- Recommended Dosage: 3 mg orally once daily with or without food for 7 days.
- In the case of a missed dose of ALILUTRBOPA, patients should take the missed dose as soon as possible on the same day and return to the normal schedule the following day.

Contraindications:

None.

Warning:

- Thrombotic/Thromboembolic Complications: ALILUTRBOPA is a thrombopoietin (TPO) receptor agonist, and TPO receptor agonists have been associated with thrombotic and thromboembolic complications in patients with chronic liver disease. Monitor platelet counts and for thromboembolic events and institute treatment promptly.

Adverse Effects:

- The most common adverse reaction ($\geq 3\%$) : headache.

Dosage form: Brown round tablets.

Expiry date: 48 months from the date of manufacture.

Packaging: 7 tablets/blister, 1 blister/box.

Storage:

- Store at room temperature not exceeding 30°C.
- Please place it out of reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory

Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com

ເອກະສານກຳກັບຢາ ALILUTRBOPA

ຊື່ທົ່ວໄປ: Lusutrombopag Tablets

ຊື່ການຄ້າ: ALILUTRBOPA

ສ່ວນປະກອບ:

Lusutrombopag.....3 mg

ຂໍ້ບົງໃຊ້:

- ALILUTRBOPA ເປັນຢາກະຕຸ້ນຕົວຮັບ thrombopoietin ທີ່ໃຊ້ສຳລັບປົນປົວພາວະເມັດເລືອດຕ່ຳໃນຄົນເຈັບຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ເປັນພະຍາດຕັບອັກເສບຊຳເຮື້ອ ແລະ ກຳລັງຈະເຂົ້າຮັບການປົນປົວ ຫຼື ຜ່າຕັດ.

ວິທີນຳໃຊ້:

- ໃຫ້ເລີ່ມກິນຢາ ALILUTRBOPA ໃນໄລຍະ 8-14 ວັນ, ກ່ອນເຂົ້າຮັບການປົນປົວ.
- ຄົນເຈັບຄວນເຂົ້າຮັບການປົນປົວໃນ 2-8 ວັນຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຢາຄັ້ງສຸດທ້າຍ.
- ປະລິມານທີ່ແນະນຳ: 3mg ຕໍ່ມື້, ໃຫ້ຕິດຕໍ່ກິນເປັນເວລາ 7 ມື້, ກິນຢາພ້ອມ ຫຼື ບໍ່ພ້ອມອາຫານກໍໄດ້.
- ໃນກໍລະນີທີ່ຄົນເຈັບລືມກິນຢາ ALILUTRBOPA, ແມ່ນໃຫ້ກິນໃນທັນທີທີ່ຄິດອອກໄດ້ຂອງວັນດຽວກັນ ແລະ ສືບຕໍ່ກິນຢາຕາມປົກກະຕິໃນມື້ຕໍ່ໄປ.

ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້:

- ບໍ່ມີ.

ຄຳເຕືອນ:

- ມີຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດລົມເລືອດ/ເສັ້ນເລືອດອຸດຕັນ (Thrombotic/Thromboembolic): ALILUTRBOPA ຈະໄປກະຕຸ້ນຕົວຮັບ thrombopoietin (TPO) ແລະ ຕົວຮັບ TPO ມີສ່ວນພົວພັນກັບອາການແຊກຊ້ອນທີ່ມາຈາກການເກີດລົມເລືອດ ຫຼື ມີການອຸດຕັນໃນເສັ້ນເລືອດ ໃນຄົນເຈັບທີ່ເປັນພະຍາດຕັບອັກເສບຊຳເຮື້ອ. ຄວນກວດ ແລະ ຕິດຕາມຈຳນວນເມັດເລືອດ ແລະ ສັງເກດອາການອຸດຕັນເສັ້ນເລືອດ ແລະ ໃຫ້ເລີ່ມປົນປົວທັນທີເມື່ອມີອາການດັ່ງກ່າວ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

- ອາການທີ່ພົບເຫັນໂດຍປົກກະຕິ (ປະກົດການ $\geq 3\%$) ໄດ້ແກ່: ເຈັບຫົວ.

ຮູບແບບຂອງຢາ: ຢາເມັດມົນ ສີນ້ຳຕານ.

ຂະໜາດບັນຈຸ: ບັນຈຸໃນກັບ, 1 ກັບມີ 1 ແຜງ, 1 ແຜງມີ 7 ເມັດ.

ວັນໝົດອາຍຸ: 48 ເດືອນ ນັບຫຼັງຈາກວັນທີ່ຜະລິດ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງບໍ່ໃຫ້ເກີນ 30°C.
- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກມື້ເດັກ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຮູບ ຈຳກັດ

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com