

ALIMACATEN

Generic name: Mavacamten capsules

Brand Name: ALIMACATEN

Composition:

Mavacamten.....2.5mg

Indications:

- ALIMACATEN is indicated for the treatment of adult patients with symptomatic New York Heart Association (NYHA) class II-III obstructive hypertrophic cardiomyopathy (HCM) to improve functional capacity and symptoms.

Dosage:

- Dosage must be individualized based on clinical status and echocardiographic assessment of patient response, use under the guidance of a physician.

Contraindications:

- The concomitant use of moderate to potent CYP2C19 inhibitors or potent CYP3A4 inhibitors is contraindicated.
- The concomitant use of moderate to potent CYP2C19 inducers or moderate to potent CYP3A4 inducers is contraindicated.

Warnings:

- It is not recommended that patients with left ventricular ejection fraction (LVEF) < 55% start the treatment with this product.
- Inform women of childbearing potential about the potential risks to the fetus and to use effective contraception until 4 months after last dose.

Adverse Effects:

- Syncope, dizziness.

Dosage form: Purple white capsule.

Packaging: 60 capsules/bottle.

Expiry date: 24 months from the date of manufacture.

Storage:

- Store sealed in original packaging below 30°C.
- Keep out of reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory

Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com

ເອກະສານກຳກັບຢາ

ALIMACATEN

ຊື່ທົ່ວໄປ: Mavacamten capsules

ຊື່ການຄ້າ: ALIMACATEN

ສ່ວນປະກອບ:

Mavacamten 2.5 mg

ຂໍ້ບົ່ງໃຊ້:

- ALIMACATEN ໃຊ້ປິ່ນປົວຄົນເຈັບຜູ້ໃຫຍ່ ທີ່ມີອາການກ້າມຊີ້ນຫົວໃຈໃຫຍ່ ແບບອຸດຕັນ (hypertrophic cardiomyopathy (HCM)) ໃນກຸ່ມຄົນເຈັບທີ່ເປັນພະຍາດຫົວໃຈ ຂັ້ນ 2-3 (New York Heart Association (NYHA) class II-III) ເພື່ອປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ປັບດາວອາການຕ່າງໆ.

ວິທີໃຊ້:

- ຄວນໃຊ້ຢາພາຍໃຕ້ການແນະນຳຂອງທ່ານໝໍ, ປະລິມານຢາຕ້ອງໄດ້ຮັບການກຳນົດເປັນແຕ່ລະບຸກຄົນ ໂດຍຈະພິຈາລະນາ.
- ອາການທາງດ້ານຄຣີນິກ ແລະ ປະເມີນການຕອບສະໜອງຕໍ່ຢາຂອງຄົນເຈັບ ດ້ວຍການກວດຄົ້ນສ່ຽງສະຫ້ອນຂອງຫົວໃຈ.

ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້:

- ຫ້າມໃຊ້ຮ່ວມກັບຢາຕ້ານ CYP2C19 inhibitors ຫຼື ຢາຕ້ານ CYP3A4 ລະດັບປານກາງ ຫາ ຮຸນແຮງ.
- ຫ້າມໃຊ້ຮ່ວມກັບຢາທີ່ເປັນຕົວກະຕຸ້ນ CYP2C19 inducers ຫຼື ຢາທີ່ເປັນຕົວກະຕຸ້ນ CYP3A4 ລະດັບປານກາງ ຫາ ຮຸນແຮງ.

ຄຳເຕືອນ:

- ບໍ່ແນະນຳໃຫ້ເລີ່ມນຳໃຊ້ຢານີ້ກັບຄົນເຈັບທີ່ມີຄ່າການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດອອກຈາກຫົວໃຈຕ່ຳລຸ່ມເບື້ອງຊ້າຍ ຕ່ຳກວ່າ 55 % (left ventricular ejection fraction (LVEF) < 55%).
- ຄວນແຈ້ງໃຫ້ແມ່ຍິງຖືພາຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນກັບເດັກໃນທ້ອງ ແລະ ໃຫ້ໃຊ້ຢາຄຸມກຳເນີດທີ່ມີປະສິດທິພາບ ຈົນເຖິງ 4 ເດືອນ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຢາປິ່ນປົວຄັ້ງສຸດທ້າຍ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

- ໝົດສະຕິ, ວິນຫົວ.

ຮູບແບບຂອງຢາ: ຢາແຄັບຊູນສີ່ມ້ວງຂາວ.

ຂະໜາດບັນຈຸ: ບັນຈຸໃນກ່ອງ, 1 ກ່ອງມີ 60 ແຄັບຊູນ.

ວັນທີມີຄວາມສຳຄັນ: 24 ເດືອນນັບຫຼັງຈາກວັນທີຜະລິດ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນກ່ອງບັນຈຸເດີມ, ປິດຝາສະໝິດ, ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນອຸນຫະພູມຕ່ຳກວ່າ 30°C.
- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກມືເດັກ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຣຸບ ຈຳກັດ

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com