

ALIMAX

Generic name: Compound Clotrimazole Cream

Brand Name: ALIMAX

Composition:

Betamethasone Dipropionate.....	6.4mg
Gentamicin (as sulfate).....	10mg
Clotrimazole.....	100mg

Indications:

- Suitable for skin inflammatory diseases that are sensitive to corticosteroid drugs (such as contact dermatitis, eczema, neurodermatitis, etc. with accompanying bacterial and fungal infections).

Dosage:

- 2 times a day (in the morning and in the evening) apply a thin layer on the affected areas of the skin and rub easily, and it is necessary to cover both the entire affected area and the surrounding healthy skin surface.
- Duration of therapy varies depending upon the results of clinical examination, microbiological testing and patient response to treatment.
- In the case of foot mycoses a longer course of treatment (2-4 weeks) should be considered.
- Children aged 2-12 years should be treated under the care of a doctor. Only apply cream on the face, neck, scalp, genital area, rectal area and intercostals. The duration should be limited to 5-7 days.

Contraindications:

- Patients who are allergic to any of the ingredients in this product are prohibited from using it.

Warning:

- For external topical use only. Do not ingest, and avoid contact with eyes, nose, or mouth.
- Long term use of gentamicin may cause overgrowth of drug-resistant bacteria.
- If this product is used extensively or with closed dressings, it will increase the occurrence of side effects.
- Avoid long-term use on delicate skin and face, and try to avoid using on open wounds or damaged skin.

Adverse Effects:

- Skin discoloration burning pain, erythema, itching, and dry skin. Long term use may cause acne.

Dosage form: White cream.

Expiry date: 24 months from the date of manufacture.

Packaging: 10g/Tube; 1 Tube /box.

Storage:

- Dry place, protected from light and temperature not exceeding 30°C.
- Please keep out of the reach of children.

Manufactured by:

Alliance Pharmaceutical Co., Ltd

Simanoneua Village, Hadxayfong District, Vientiane, Lao PDR

Tel: +856-21-612 727

www.alliancepharmagroup.com

ເອກະສານກຳກັບຢາ ALIMAX

ຊື່ທົ່ວໄປ: Compound Clotrimazole Cream

ຊື່ການຄ້າ: ALIMAX

ສ່ວນປະກອບ:

Betamethasone Dipropionate.....6.4mg

Gentamicin (as sulfate).....10mg

Clotrimazole.....100mg

ຂໍ້ບົ່ງໃຊ້:

- ເພາະສົມສຳລັບພະຍາດຜິວໜັງອີກເສບ ທີ່ຮູ້ສຶກໄວຕຳຢາ corticosteroid (ເຊັ່ນ: ຜິວໜັງອີກເສບທີ່ເກີດຈາກການສຳຜັດກັບຂີ້ກາກ, ຂີ້ກຽນ, ລວມທັງການຕິດເຊື້ອແບັກທີເຣຍ ແລະ ເຊື້ອລາ).

ວິທີໃຊ້:

- ທາມືລະ 2 ຄັ້ງ (ເຊົ້າ ແລະ ແລງ) ທາບາງໆບໍລິເວນຜິວໜັງທີ່ອີກເສບ ແລະ ຖູເບົາໆອ້ອມຮອບໃຫ້ທົ່ວບໍລິເວນ.
- ໄລຍະເວລາໃນການປິ່ນປົວ ແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜົນຂອງການກວດຫາງດ້ານຄຸນນິກ, ການທົດລອງທາງດ້ານຈຸລິນຊີວິທະຍາ ແລະ ການຕອບສະໜອງຂອງຄົນເຈັບຕໍ່ການປິ່ນປົວ.
- ໃນກໍລະນີທີ່ເປັນເຊື້ອລາຢູ່ຕິນ ຄວນພິຈາລະນາໃນການປິ່ນປົວ ເປັນໄລຍະເວລາເພີ່ມຂຶ້ນ (2-4 ອາທິດ).
- ເດັກອາຍຸ 2-12 ປີ ຄວນຢູ່ພາຍໃຕ້ການດູແລຂອງແພດ, ການທາຄຣີມໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໃບໜ້າ, ລຳຄໍ, ໜັງຫົວ, ບໍລິເວນອະໄວຍະວະເພດ, ທວນໜັກ ແລະ ລະຫວ່າງກະດູກຂ້າງ, ໄລຍະເວລາຄວນກຳນົດໄວ້ເປັນເວລາ 5-7 ວັນ.

ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້:

- ຫ້າມໃຊ້ກັບຄົນເຈັບທີ່ມີອາການແພ້ຕໍ່ສ່ວນປະສົມໃດໆໃນຕົວຢາ.

ຄຳເຕືອນ:

- ເປັນຢາສຳລັບໃຊ້ທາພາຍນອກເທົ່ານັ້ນ. ຫ້າມຮັບປະທານ ແລະ ລະວັງຢາໃຫ້ເຂົ້າຕາ, ດັງ ຫຼື ປາກ.
- ການໃຊ້ຢາ Gentamicin ເປັນເວລາດົນນານ ອາດເຮັດໃຫ້ເຊື້ອແບັກທີເຣຍ ມີການຕົ້ຕຳຢາ ແລະ ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕຫຼາຍຂຶ້ນ.
- ຫາກມີການນຳໃຊ້ຢານີ້ຫຼາຍເກີນໄປ ຫຼື ມີການໃຊ້ຜ້າຜັນປິດບາດແຜໄວ້ ຈະເພີ່ມຄວາມສ່ຽງເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນຂ້າງຫຼາຍຂຶ້ນ.
- ຫຼັກລ່ຽງການໃຊ້ຢາໃນໄລຍະຍາວ ສຳລັບຜິວໜັງທີ່ອ່ອນ ແລະ ໃບໜ້າ, ຫຼັກລ່ຽງການໃຊ້ຢາກັບບາດແຜເປັດ ຫຼື ຜິວໜັງທີ່ບາດເຈັບ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

- ຜິວໜັງປ່ຽນສີ, ອອກແສບອອກຮ້ອນ, ມີຜືນແດງ, ມີອາການຄັນ ແລະ ຜິວແຫ້ງ, ຖ້າໃຊ້ຢານີ້ເປັນເວລາດົນນານອາດເຮັດໃຫ້ເກີດສິ້ວໄດ້.

ຮູບແບບຂອງຢາ: ຢາທາຄຣີມສີຂາວ

ຂະໜາດບັນຈຸ: ບັນຈຸກັບ, 1 ກັບມີ 1 ຫຼອດ, 1 ຫຼອດປະລິມານ 10g.

ວັນໝົດອາຍຸ: 24 ເດືອນ ຫຼັງຈາກວັນທີ່ຜະລິດ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນທີ່ແຫ້ງ ແລະ ປ້ອງກັນແສງ, ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນອຸນຫະພູມຕໍ່າກວ່າ 30°C.
- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກມືເດັກ.

ຜະລິດໂດຍ:

ບໍລິສັດ ພັນທະມິດຟາມາຊຸຕິຄໍ ຈຳກັດ

ສະຖານທີ່: ບ້ານ ສີມມະໂນເໜືອ, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856-21-612 727

www.alliancepharmagroup.com