

ALIMENITRO

Generic name: Metronidazole

Brand name: ALIMENITRO

Composition: Metronidazole..... 500mg

Indications:

- Used to treat intestinal and extraintestinal amoebic diseases
- It can also be used to treat infections such as vaginal trichomoniasis, colonic pocket ciliates, skin leishmaniasis, dracunculiasis and anaerobic bacterial infections.

Dosage:

- Trichomoniasis (adults): One-day treatment: 2000mg as a single oral dose or a split dose given on the same day 5 - 7 day course: 400mg 2 times daily for 5 - 7 consecutive days.
- Intestinal amoebiasis: Adults: Take 750 mg 3 times daily for 5 days, or 5-10 days for extraintestinal infections. Maximum daily dose is 2,400 mg
- Children: 30-40 mg/kg body weight, divided into 3 doses per day.
- For anaerobic bacterial infections: Adults: 7.5 mg/kg every 6 hours (500 mg per 77 kg body weight) for 7-10 days.

Contraindications:

- It is contraindicated in patients with active central nervous system disorders and blood disorders. Prohibited for pregnant and lactating women.

Warnings:

- Abstain from alcohol while taking this product.
- The metabolites of this product can give urine a dark red color.
- The dose should be reduced for patients with pre-existing liver disease.
- Discontinue the drug if dyskinesia or other central nervous system symptoms occur.

Adverse Effects:

- Nausea, vomiting, loss of appetite, abdominal cramps; Headache, vertigo, occasional paresthesia, limb numbness, ataxia, multiple neuritis, etc., large doses can cause convulsions. A small number of urticaria, flushing, pruritus, cystitis, dysuria, metallic taste in the mouth and leukopenia, etc., recovered spontaneously after stopping the drug.

Dosage form: White tablets.

Expiry date: 24 months from the date of manufacture.

Packaging: 10 tablets/blister, 50 blisters/box.

Storage:

- Store in original packaging 20°C-25°C, protected from moisture and direct sunlight.
- Keep out of reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory

Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com

ເອກະສານກຳກັບຢາ ALIMENITRO

ຊື່ທົວໄປ: Metronidazole

ຊື່ການຄ້າ: ALIMENITRO

ສ່ວນປະກອບ: Metronidazole..... 500mg.

ຂ້າງໃຊ້:

- ນຳໃຊ້ປິ່ນປົວພະຍາດອະມິບ້າ (Amoebic diseases) ໃນລຳໄສ້ ແລະ ນອກລຳໄສ້.
- ສາມາດນຳໃຊ້ປິ່ນປົວພະຍາດຕິດເຊື້ອ ເຊັ່ນ: ການຕິດເຊື້ອໃນຊ່ອງຄອດ, ການຕິດເຊື້ອພະຍາດຊີລິເອດ (ciliates) ໃນລຳໄສ້ໃຫຍ່, ການຕິດເຊື້ອທາງຜິວໜັງ, ພະຍາດໃບໄມ້ໃນລຳໄສ້ ແລະ ພະຍາດແບັກທີເຣຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງການອີກຊື່.

ວິທີໃຊ້:

- ຜູ້ໃຫຍ່ ທີ່ມີອາການອັກເສບທາງເດີນປັດສະວະ ຫລື ຊ່ອງຄອດ ທີ່ມີສາເຫດມາຈາກເຊື້ອ (trichomonas) ໃຫ້ກິນ 2000mg ເທື່ອດຽວ ຫລື ກິນ 400mg ກິນ 2 ເທື່ອຕໍ່ມື້ ຕິດຕໍ່ກັນ 7 ມື້.
- ກໍລະນີຕິດເຊື້ອອະມິບ້າ (Amoebic diseases) ໃນລຳໄສ້ ຜູ້ໃຫຍ່ກິນ: 750mg ມື້ລະ 3 ຄັ້ງເປັນເວລາ 5 ມື້ ຫລື ກິນຢາ 5-10 ມື້ ກໍລະນີຕິດເຊື້ອນອກລຳໄສ້ ຂະໜາດສູງສຸດຕໍ່ມື້ແມ່ນ 2400 mg,
- ເດັກນ້ອຍນ້ຳໜັກ 30-40mg/kg ແບ່ງກິນ 3 ເທື່ອຕໍ່ມື້.
- ກໍລະນີຕິດເຊື້ອແບັກທີເຣຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງການອີກຊື່ເຈນ: ຜູ້ໃຫຍ່ກິນ 7.5mg/kg ທຸກໆ 6 ຊົ່ວໂມງ (500mg ຕໍ່ນ້ຳໜັກ 77kg ເປັນເວລາ 7-10 ມື້.

ຂ້າງໃຊ້:

- ໃນຄົນເຈັບທີ່ມີບັນຫາການທຳງານກ່ຽວກັບລະບົບປະສາດສູນກາງ, ຄົນເຈັບທີ່ມີບັນຫາກ່ຽວກັບ ເລືອດຜິດປົກກະຕິ ບໍ່ຄວນນຳໃຊ້, ຫ້າມໃຊ້ໃນແມ່ຍິງທີ່ກຳລັງຕັ້ງຄັນ ແລະ ແມ່ຍິງທີ່ກຳລັງລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່.

ຄຳເຕືອນ:

- ໃນຊ່ວງການນຳໃຊ້ຢານີ້ ຫ້າມດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ເປັນທາດເຫລັກ.
- ປະຕິລິຍາຂອງຢາທີ່ເກີດໃນຮ່າງກາຍ ສາມາດເຮັດໃຫ້ ປັດສະວະປ່ຽນສີເປັນສີແດງເຂັ້ມໄດ້.
- ໃນຄົນເຈັບທີ່ມີບັນຫາກ່ຽວກັບການທຳງານຂອງຕັບ ຄວນຫລຸດຜ່ອນປະລິມານການນຳໃຊ້.
- ຖ້າພົບເຫັນອາການຍຸກຍິກ ບໍ່ຢຸດນິ້ງ ຫລື ມີອາການຜິດປົກກະຕິ ຂອງລະບົບປະສາດສູນກາງ ເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການໃຊ້ຢາ ໃຫ້ຢຸດການນຳໃຊ້ທັນທີ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

- ອາການຂ້າງຄຽງທີ່ມັກພົບ ມີ ອາການປຸ້ນທ້ອງ, ຮາກ, ບໍ່ຢາກອາຫານ, ປວດທ້ອງ, ປວດຫົວ, ວິນຫົວ, ມືນຊາເປັນບາງຄັ້ງຄາວ, ເຈັບຫົວ, ມືນຊາຕາມແຂນຂາ, ເປັນ ataxia ປາຍປະສາດອັກເສບຕາມຈຸດຕ່າງໆ ແລະອື່ນໆ. ການໃຊ້ຢາໃນປະລິມານຫລາຍພົບວ່າ ສາມາດເກີດອາການຊັກ, ລົມເປັນພິດ ຫລື ເປັນຜົນແດງຕາມຜິວໜັງ ແດງ, ຄັນ, ເປັນໂລກກະເພາະ, ພິກຍ່ຽວອັກເສບ, ຍ່ຽວຍາກ, ປາກມີກິນໂລຫະ, ມີບັນຫາກ່ຽວກັບ ຕຳລາເມັດເລືອດຂາວ ອາການເລັກນ້ອຍ ຈະຫາຍໄປເອງເມື່ອຢຸດເຊົາໃຊ້ຢາ.

ຮູບແບບຂອງຢາ: ຢາເມັດສີຂາວ.

ວັນຫມົດອາຍຸ: 24 ນັບຈາກວັນທີ່ຜະລິດ.

ຂະໜາດບັນຈຸ: ບັນຈຸໃນກັບ, 1 ກັບມີ 10 ແຜງ, 1 ແຜງ 10 ເມັດ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນກັບກ່ອງບັນຈຸເດີມ, ບໍ່ໃຫ້ຖືກແສງແດດ ເກັບໄວ້ໃນຫ້ອງທີ່ມີ ອຸນຫະພູມ ລະຫວ່າງ 20°C-25°C.
- ເກັບຮັກສາ ຢາໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກມື້ເດັກ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຣຸບ ຈຳກັດ

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com