

ALIPIMTEPB

Generic name: Pimitespib Tablets

Brand Name: ALIPIMTEPB

Composition:

Pimitespib.....40mg

Indications:

- Suitable for patients with gastrointestinal stromal tumors (GIST) who have progressed after cancer chemotherapy.

Dosage:

- Usually, for adults, 160mg each time, once a day.
- Medication should be administered on an empty stomach.
- After continuous oral administration for 5 days, stop taking the medication for 2 days and repeat the administration in this way.
- In addition, the dosage can be appropriately reduced according to the patient's physical condition.

Contraindications:

- Patients with a history of allergy to the ingredients of this medicine.

Warning:

- Severe diarrhea may occur.
- Eye disorders may occur.
- Embryo-Fetal Toxicity: Can cause fetal harm. Advise patients of reproductive potential of the potential risk to a fetus and to use effective contraception.
- Pregnant and lactating women should use with caution.

Adverse Effects:

- Diarrhea, nyctalopia, blurred vision, visual impairment, retinal vein occlusion, retinopathy, acquired color vision abnormality.

Dosage form: White round tablets.

Expiry date: 48 months from the date of manufacture.

Packaging: 10 tablets/ blister, 4 blisters /box.

Storage:

- Store at room temperature not exceeding 30°C.
- Please keep out of the reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory

Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com

ເອກະສານກຳກັບຢາ ALIPIMTEPB

ຊື່ທົວໄປ: Pimitespib Tablets

ຊື່ການຄ້າ: ALIPIMTEPB

ສ່ວນປະກອບ:

Pimitespib 40 mg

ຂໍ້ບົງໃຊ້:

- ນຳໃຊ້ສຳລັບປິ່ນປົວຄົນເຈັບທີ່ມີເນື່ອງອກໃນລະບົບທາງເດີນອາຫານ (GIST) ທີ່ແຜ່ລາມຫຼັງຈາກການເຮັດເຄມີບໍາບັດມະເຮັງ.

ວິທີນຳໃຊ້:

- ສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່: ກິນຄັ້ງລະ 160mg ຕໍ່ມື້.
- ຄວນກິນຢາ ໃນເວລາທີ່ດຽວກັນ.
- ຫຼັງຈາກກິນຢາ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເປັນເວລາ 5 ມື້ ແລ້ວໃຫ້ຢຸດກິນຢາ 2 ມື້ ແລ້ວຈຶ່ງກິນຢາຕໍ່ໄປ ຕາມຄຳແນະນຳແບບເດີມ.
- ນອກຈາກນີ້ສາມາດປັບຫຼຸດປະລິມານຢາໄດ້ ອີງຕາມສະພາບຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຈັບ.

ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້:

- ຄົນເຈັບທີ່ມີປະຫວັດແພ້ຕໍ່ສ່ວນປະກອບຂອງຢານີ້.

ຄຳເຕືອນ:

- ອາດພາໃຫ້ເກີດອາການຖອກຫ້ອງຢ່າງຮຸນແຮງ.
- ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງດວງຕາ.
- ເປັນພິດຕິວອນ ແລະ ເດັກໃນທ້ອງ: ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ເດັກໃນທ້ອງ, ແນະນຳໃຫ້ຄົນເຈັບຮູ້ເຖິງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ເດັກນ້ອຍໃນທ້ອງທີ່ອາດສົ່ງຜົນຕໍ່ລະບົບສືບພັນ ແລະ ຄວນໃຊ້ວິທີຄຸມກຳເນີດທີ່ມີປະສິດທິພາບ.
- ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ໃຫ້ນົມລູກ ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

- ຖອກຫ້ອງ, ພາວະເບິ່ງບໍ່ເຫັນໃນບ່ອນທີ່ມີແສງໜ້ອຍ (ຕາບອດຕອນກາງຄືນ nyctalopia), ຕາມົວ, ການເບິ່ງເຫັນຜິດປົກກະຕິ, ເສັ້ນເລືອດດຳຂອງຈຸ່ປະສາດຕາອຸດຕັນ, ຈຸ່ປະສາດຕາເສື້ອມ, ການເບິ່ງເຫັນສີມີຄວາມຜິດປົກກະຕິ.

ຮູບແບບຂອງຢາ: ຢາເມັດມົນ ສີຂາວ.

ຂະໜາດບັນຈຸ: ບັນຈຸໃນກັບ, 1 ກັບມີ 4 ແຜງ, 1 ແຜງມີ 10 ເມັດ.

ວັນໝົດອາຍຸ: 48 ເດືອນ ນັບຫຼັງຈາກວັນທີ່ຜະລິດ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນອຸນຫະພູມຕໍ່າກວ່າ 30°C.
- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກມືເດັກ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຣຸບ ຈຳກັດ.

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051.

www.alliancepharmagroup.com