

ALIPITOBTINIB

Generic name: Pirtobrutinib

Brand Name: ALIPITOBTINIB

Composition:

Pirtobrutinib100mg

Indications:

- Adult patients with relapsed or refractory mantle cell lymphoma (MCL) after at least two lines of systemic therapy, including a BTK inhibitor.
- Adult patients with chronic lymphocytic leukemia or small lymphocytic lymphoma (CLL/SLL) have received at least two prior lines of therapy, including a BTK inhibitor and a BCL-2 inhibitor.

Dosage:

- The recommended dosage of ALIPITOBTINIB is 200 mg orally once daily until disease progression or unacceptable toxicity.
- Swallow tablets whole with water. Do not cut, crush, or chew the tablets.
- Take ALIPITOBTINIB at the same time each day. ALIPITOBTINIB may be taken with or without food.
- If a dose of ALIPITOBTINIB is missed by more than 12 hours, do not make up the dose and take the next dose as scheduled.

Contraindications:

- None.

Warning:

- Infections: Monitor for signs and symptoms of infection.
- Hemorrhage: Monitor for bleeding and manage appropriately.
- Cytopenia: Monitor complete blood counts during treatment.
- Cardiac arrhythmias: Monitor for symptoms of arrhythmia.
- Secondary malignancies: Other malignancies may develop including skin cancers and other carcinomas. Monitor and advise patients to use sun protection.
- Hepatotoxicity, including drug-induced liver injury.
- Embryo-Fetal Toxicity: Can cause fetal harm. Advise females of reproductive potential of potential risk to a fetus and to use effective contraception.

Adverse Effects:

- Most common adverse reactions ($\geq 20\%$) are fatigue, musculoskeletal pain, diarrhea, bruising and cough.

Dosage form: Blue round tablets.

Packaging: 30 tablets/bottle.

Expiry date: 24 months from the date of manufacture.

Storage:

- Sealed in original packaging below 30°C.
- Keep out of the reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory

Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com

ເອກະສານກຳກັບຢາ ALIPITOBTINIB

ຊື່ທົວໄປ: Pirtobrutinib
ຊື່ການຄ້າ: ALIPITOBTINIB
ສ່ວນປະກອບ:

Pirtobrutinib100mg

ຂໍ້ບົງໃຊ້:

- ໃຊ້ເພື່ອປິ່ນປົວ ຄົນເຈັບທີ່ເປັນພະຍາດມະເຮັງຕ່ອມນ້ຳເຫຼືອງ ໃນຜູ້ໃຫຍ່ ຊະນິດ (Mantle Cell Lymphoma (MCL)) ທີ່ເກີດເປັນຊ້າ ຫຼື ພົບວ່າມີການຕິດຢາຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ ເປັນລະບົບຢ່າງຕໍ່າສອງວິທີ (2 lines) ຜ່ານມາແລ້ວແຕ່ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ, ລວມທັງການນຳໃຊ້ຢາກຸ່ມ Bruton tyrosine kinase (BTK inhibitor) ຜ່ານມາ.
- ໃຊ້ປິ່ນປົວມະເຮັງເມັດເລືອດຂາວຊໍາເຮືອ ໃນຜູ້ໃຫຍ່ ຫຼື ມະເຮັງຕ່ອມນ້ຳເຫຼືອງ ຊະນິດແລ້ມໂຟໄຊ ຂະໜາດນ້ອຍ (small lymphocytic lymphoma (CLL/SLL)) ທີ່ຜ່ານການປິ່ນປົວມາແລ້ວຢ່າງໜ້ອຍສອງວິທີ (2 lines) ລວມທັງຄົນເຈັບທີ່ໃຊ້ຢາກຸ່ມ Bruton tyrosine kinase (BTK inhibitor) ແລະ BCL-2 inhibitor.

ວິທີໃຊ້:

- ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ໃນປະລິມານ 200 mg ກິນວັນລະຄັ້ງ ຈົນກວ່າການປິ່ນປົວຈະໄດ້ຮັບຜົນດີ ຫຼື ຢຸດການນຳໃຊ້ ໃນກໍລະນີທີ່ເກີດຜິດເບື້ອ ທີ່ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້.
- ໃຫ້ກິນກິນຢາເປັນເມັດພ້ອມກັບນ້ຳ, ຫ້າມຫັກ, ບິດ ຫຼື ຫຍ້າເມັດຢາ.
- ເວລາກິນຢາໃນແຕ່ລະວັນ ຄວນກຳນົດເປັນເວລາດຽວກັນ, ສາມາດກິນຢາກ່ອນ ຫຼື ຫຼັງອາຫານໄດ້.
- ຫ້າມກິນຢາທີ່ດແທນ ໃນກໍລະນີລືມກິນຢາ ເກີນ 12 ຊົ່ວໂມງ, ຄວນລໍຖ້າກິນຢາ ຕາມເວລາທີ່ກຳນົດໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ.

ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້:

- ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ທັນມີຂໍ້ມູນ.

ຄຳເຕືອນ:

- ການຕິດເຊື້ອ: ກວດຕິດຕາມປະເມີນອາການ ແລະ ສັນຍານເຕືອນຂອງການຕິດເຊື້ອ.
- ອາການເລືອດໄຫຼບໍ່ຢຸດ (Hemorrhage): ຕິດຕາມອາການເລືອດອອກ ແລະ ໃຫ້ການປິ່ນປົວຕາມຄວາມເໝາະສົມຖ້າພົບບັນຫາດັ່ງກ່າວ.
- ເມັດເລືອດຂາວຕ່ຳ (Cytopenia): ກວດຕິດຕາມການນັບເມັດເລືອດທີ່ສົມບູນ ໃນລະຫວ່າງປິ່ນປົວດ້ວຍຢານີ້.
- ຫົວໃຈເຕັ້ນຜິດຈັງຫວະ (Cardiac arrhythmias): ກວດຕິດຕາມພາວະການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈທີ່ຜິດຈັງຫວະ.
- ການເກີດມະເຮັງຊ້ອນ (Secondary malignancies): ມະເຮັງຊະນິດອື່ນອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ ລວມທັງມະເຮັງຜິວໜັງ ແລະ ມະເຮັງຊະນິດອື່ນໆ. ກວດຕິດຕາມ ແລະ ແນະນຳໃຫ້ຄົນເຈັບ ນຳໃຊ້ຄຣີມກັນແດດ.
- ການເປັນພິດເບື້ອຕໍ່ຕັບ: ການໃຊ້ຢາ ອາດພາໃຫ້ຕັບເກີດເປັນບາດແຜໄດ້.
- ການເປັນພິດເບື້ອຕໍ່ຕິວອ່ອນ ແລະ ເດັກໃນທ້ອງ: ການນຳໃຊ້ຢານີ້ ສາມາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ເດັກໃນທ້ອງໄດ້. ຄວນແນະນຳໃຫ້ມີການວາງແຜນຄອບຄົວກ່ອນການນຳໃຊ້ຢານີ້ໃນການປິ່ນປົວ ແລະ ໃຫ້ໃຊ້ວິທີການຄຸມກຳເນີດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

- ອາການສື່ນທີ່ພົບສ່ວນໃຫຍ່ ($\geq 20\%$) ແມ່ນ: ອ່ອນເພຍ, ປວດຕາມກ້າມຊີ້ນ ແລະ ກະດູກ, ຖອກທ້ອງ, ມີຈຸດຊ້າ ແລະ ໄອ.

ຮູບແບບຂອງຢາ: ຢາເມັດມົນສີຟ້າ.

ຂະໜາດບັນຈຸ: ບັນຈຸໃນກ່ອງ, 1 ກ່ອງມີ 30 ເມັດ.

ວັນໝົດອາຍຸ: 24 ເດືອນ ຫຼັງຈາກວັນທີ່ຜະລິດ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນກ່ອງບັນຈຸເດີມ, ປິດຝາສະໝິດ, ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນອຸນຫະພູມຕໍ່າກວ່າ 30°C.
- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກມືເດັກ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຣຸບ ຈຳກັດ

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com