

ALIRAX

Generic name: Chlordiazepoxide and Clidinium Bromide

Brand name: AliRax

Composition:

Chlordiazepoxide.....5 mg

Clidinium bromide.....2.5 mg

Indications:

- AliRax is a combination medication used for the treatment of anxiety, tension in the gastrointestinal and urinary systems, peptic ulcers in the stomach and upper small intestine, gastrointestinal hypermotility disorders, diarrhea, spastic colon, and colitis.

Dosage:

- Use as directed by your doctor.
- Adults: Take 1 tablet 3 to 4 times a day, depending on the severity of the symptoms.
- Elderly or Weak Patients: The dosage should be reduced to 1 to 2 tablets per day.
- For managing dysmenorrhea (painful menstruation): Start taking AliRax 3 to 4 days before the onset of menstruation to help control menstrual pain effectively.
- AliRax should be taken before meals and at bedtime for maximum effectiveness and to relieve symptoms during rest and digestion.

Contraindications:

- A known hypersensitivity to the product.
- Myasthenia gravis.
- Patients with glaucoma or severe hepatic impairment.
- Pregnancy and lactation.

Warnings:

- AliRax is considered unsafe in porphyric patients.
- AliRax should be taken with caution in elderly or debilitated patients.
- Patients with muscle weakness, or impaired liver or kidney function, chronic pulmonary insufficiency, prostatic hypertrophy, patients with personality disorders.
- Addiction-prone patients or to those whose history suggests possible abuse.
- AliRax may impair mental and / or physical abilities required for the performance of potentially hazardous tasks such as driving a vehicle or operating machinery. Similarly, it may impair mental alertness in children.
- Concomitant use of alcohol or other CNS depressants may have an additive effect.

Adverse Effects:

- The side effects may include upset stomach, drowsiness, weakness, heartburn, sleeplessness, dry mouth. Light sensitivity: changes in appetite, constipation, and urinary retention may also occur.

Dosage form: Light green Tablets.

Expiry date: 36 months from the date of manufacture

Packaging: 10 tablets/plate, 3 plates/box

Storage:

- Protected from light, sealed, and stored at 20°C- 25°C.
- Keep out of reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory

Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com

ເອກະສານກຳກັບຢາ

ALIRAX

ຊື່ທົ່ວໄປ: Chlordiazepoxide; Clidinium Bromide

ຊື່ການຄ້າ: AliRax

ສ່ວນປະກອບ:

Chlordiazepoxide..... 5 mg

Clidinium bromide..... 2.5 mg

ຂໍ້ບັງໃຊ້:

- AliRax ເປັນຢາປະສົມນຳໃຊ້ເພື່ອປິ່ນປົວຄວາມວິຕົກກັງວົນ, ຄວາມຕຶງຄຽດໃນລະບົບທາງເດີນອາຫານ ແລະ ທາງເດີນປັດສະວະ ທີ່ມີ ບາດແຜໃນກະເພາະອາຫານ ແລະ ລຳໄສ້ນ້ອຍສ່ວນຕົ້ນ, ພາວະລຳໄສ້ເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍ ເກີນໄປຂອງລະບົບທາງເດີນອາຫານ, ຖອກທ້ອງ, ລຳໄສ້ໃຫຍ່ຫົດເກັງ, ລຳໄສ້ອັກເສບ.

ວິທີໃຊ້:

- ນຳໃຊ້ຕາມຄຳແນະນຳຂອງແພດ.
- ຜູ້ໃຫຍ່, ນຳໃຊ້ຄັ້ງລະ 1 ເມັດ , ກິນ 3 ຫາ 4 ຄັ້ງຕໍ່ວັນ, ຂຶ້ນກັບຄວາມຮຸນແຮງຂອງອາການ.
- ສຳລັບຜູ້ສູງອາຍຸ ຫຼື ຄົນເຈັບທີ່ຮ່າງກາຍບໍ່ແຂງແຮງ ຄວນຫຼຸດປະລິມານລົງ, ນຳໃຊ້ 1 ຫາ 2 ເມັດຕໍ່ວັນ.
- ນຳໃຊ້ໃນບັນເທົາການປວດປະຈຳເດືອນ(dysmenorrhoea), ຄວນຮັບປະທານ AliRax ກ່ອນການເກີດປະຈຳເດືອນ 3 ຫາ 4 ວັນ ເພື່ອຄວບຄຸມການປວດປະຈຳເດືອນໃຫ້ຄົງທີ່.
- ຄວນຮັບປະທານ AliRax ກ່ອນອາຫານ ແລະ ກ່ອນເວລານອນເພື່ອໃຫ້ການອອກລົດຂອງຢາມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ ແລະ ບັນເທົາອາການໃນລະຫວ່າງການພັກຜ່ອນ ແລະ ການຍ່ອຍອາຫານ.

ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້:

- ຫ້າມນຳໃຊ້ໃນຄົນເຈັບທີ່ແພ້ຜະລິດຕະພັນນີ້
- ຄົນເຈັບທີ່ເປັນພະຍາດກ້າມເນື້ອລ່ອຍ (myasthenia gravis)
- ຄົນເຈັບທີ່ເປັນພະຍາດຕັກຫຼີນ ຫຼື ມີພາວະການທຳງານຂອງຕັບບົກພ່ອງຢ່າງຮຸນແຮງ.
- ຫ້າມນຳໃຊ້ໃນແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ແມ່ຍິງທີ່ກຳລັງໃຫ້ນົມລູກ.

ຄຳເຕືອນ:

- AliRax ຈະບໍ່ມີຄວາມປອດໄພຕໍ່ຄົນເຈັບທີ່ເປັນພະຍາດ porphyria.
- ຄວນນຳໃຊ້ AliRax ດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງໃນຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະ ຄົນເຈັບທີ່ມີຮ່າງກາຍບໍ່ແຂງແຮງ.
- ຄົນເຈັບທີ່ມີພາວະກ້າມເນື້ອລ່ອຍ, ການທຳງານຂອງຕັບບົກພ່ອງ, ພາວະປອດຊ້ຳເຮືອ, ຄົນເຈັບທີ່ມີຕ່ອມລູກໝາກໃຫຍ່ ຜິດປົກກະຕິ, ຫຼືຜູ້ປ່ວຍທີ່ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງບຸກຄະລິກກະພາບ.
- ຄວນລະມັດລະວັງໃນຄົນເຈັບທີ່ມີແນວໂນ້ມເສບຕິດໂດຍການນຳໃຊ້ຢາຜິດວິທີ.
- AliRax ອາດຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບທາງຈິດໃຈ ແລະ ປະສິດທິພາບໃນການເຄື່ອນໄຫວທາງຮ່າງກາຍທີ່ເປັນ ອັນຕະລາຍເຊັ່ນ: ການຂັບຂີຍານພາຫະນະ ຫຼື ການໃຊ້ງານເຄື່ອງຈັກ, ນອກນີ້ ອາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕື່ນຕົວທາງຈິດ ໃນເດັກນ້ອຍ.
- ການນຳໃຊ້ຮ່ວມກັນກັບທາດເຫຼົ້າ ຫຼື ຢາທີ່ອອກລົດຕໍ່ຈິດປະສາດສ່ວນກາງ (CNS depressants) ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນ ກະທົບເພີ່ມເຕີມ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

- ຜົນຂ້າງຄຽງອາດລວມເຖິງ ອາການປວດທ້ອງ, ງ່ວງຊຶມ, ອ່ອນເພຍ, ແສບຮ້ອນຊ່ວງເອິກ, ນອນບໍ່ຫຼັບ, ປາກແຫ້ງ, ແພ້ແສງ, ການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມຢາກອາຫານ, ຖອກທ້ອງ, ແລະ ການກັ່ນປັດສະວະບໍ່ຢູ່.

ຮູບແບບຂອງຢາ : ຢາເມັດສີຂຽວອ່ອນ.

ວັນຫມົດອາຍຸ : 36 ເດືອນນັບຈາກວັນທີ່ຜະລິດ.

ຂະໜາດບັນຈຸ : 1 ກັບມີ 3 ແຜງ, 1 ແຜງມີ 10 ເມັດ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນກັບກ່ອງ ບັນຈຸເດີມ, ບໍ່ໃຫ້ຖືກແສງແດດ ເກັບໄວ້ໃນຫ້ອງທີ່ມີ ອຸນຫະພູມ ລະຫວ່າງ 20°C-25°C.
- ເກັບຮັກສາຢາໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກມື້ເດັກ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຽບ ຈຳກັດ

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com