

ALIRESMTRO-100

Generic name: Resmetirom

Brand Name: ALIRESMTRO-100

Composition:

Resmetirom.....100mg

Indications:

- ALIRESMTRO-100 is a thyroid hormone receptor-beta (THR-beta) agonist indicated in conjunction with diet and exercise for the treatment of adults with noncirrhotic nonalcoholic steatohepatitis (NASH) with moderate to advanced liver fibrosis.

Dosage:

- Recommended dose of ALIRESMTRO-100 for patients weighing:
 - <100 kg, the recommended dosage is 80 mg orally once daily.
 - ≥100 kg, the recommended dosage is 100 mg orally once daily.
- Recommended dose if used concomitantly with a moderate CYP2C8 inhibitor:
 - <100 kg, the recommended dosage is 60 mg orally once daily.
 - ≥100 kg, the recommended dosage is 80 mg orally once daily.

Contraindications:

- None.

Warning:

- Hepatotoxicity: Monitor patients during treatment with ALIRESMTRO-100 for elevations in liver tests and for the development of liver-related adverse reactions. Discontinue ALIRESMTRO-100 and continue to monitor the patient if hepatotoxicity is suspected.
- Gallbladder-Related Adverse Reactions: Cholelithiasis and cholecystitis were observed more often in ALIRESMTRO-100 treated patients. If cholelithiasis is suspected, gallbladder diagnostic studies and appropriate clinical follow-up are indicated. If an acute gallbladder event such as acute cholecystitis is suspected, interrupt ALIRESMTRO-100 treatment until the event is resolved.

Adverse Effects:

- The most common adverse reactions with ALIRESMTRO-100 are diarrhea, nausea, pruritus, vomiting, constipation, abdominal pain, and dizziness.

Dosage form: Pink tablets.

Packaging: 30 tablets/bottle.

Expiry date: 36 months from the date of manufacture.

Storage:

- Store in original packaging below 30°C.
- Keep out of reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory

Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com

ເອກະສານກຳກັບຢາ ALIRESMTRO-100

ຊື່ທົວໄປ: Resmetirom

ຊື່ການຄ້າ: ALIRESMTRO-100

ສ່ວນປະກອບ:

Resmetirom.....100mg

ຂໍ້ບົງໃຊ້:

- ALIRESMTRO-100 ເປັນຢາກະຕຸ້ນຕົວຮັບ ຮໍໂມນໄທຣອຍ ຊະນິດເບຕາ (THR-beta) ທີ່ຕ້ອງໃຊ້ ຮ່ວມກັບການຄວບຄຸມອາຫານ ແລະ ການອອກກຳລັງກາຍ, ເພື່ອປືນປົວຄົນເຈັບຜູ້ໃຫຍ່ ທີ່ມີພາວະໄຂມັນ ຫຸ້ມຕັບ ແລະ ພະຍາດຕັບແຂງຊະນິດທີ່ບໍ່ມີສາເຫດມາຈາກເຫຼົ້າ (noncirrhotic nonalcoholic steatohepatitis (NASH)), ພາໃຫ້ເປັນຜັງຜືດຢູ່ໃນຕັບ ຂັ້ນປານກາງ ເຖິງ ຂັ້ນຮຸນແຮງ.

ວິທີໃຊ້:

- ປະລິມານທີ່ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ ALIRESMTRO-100 ຕາມນ້ຳໜັກໂຕຕັ້ງລຸ່ມນີ້:
 - ສຳລັບຄົນເຈັບທີ່ມີນ້ຳໜັກ < 100 kg, ແມ່ນໃຊ້ດ້ວຍປະລິມານ 80 mg ຕໍ່ມື້, ກິນວັນລະຄັ້ງ.
 - ສຳລັບຄົນເຈັບທີ່ມີນ້ຳໜັກ ≥ 100 kg, ປະລິມານທີ່ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ ແມ່ນ 100 mg ຕໍ່ມື້, ກິນວັນລະຄັ້ງ.
- ປະລິມານທີ່ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ ໃນກໍລະນີທີ່ມີການໃຊ້ຮ່ວມກັບຢາ ທີ່ຢັບຢັ້ງຕົວຮັບ CYP2C8 ໃນລະດັບ ປານກາງ:
 - ຄົນເຈັບທີ່ມີນ້ຳໜັກ < 100 kg, ແມ່ນໃຊ້ດ້ວຍປະລິມານ 60 mg ຕໍ່ມື້, ກິນວັນລະຄັ້ງ.
 - ຄົນເຈັບທີ່ມີນ້ຳໜັກ ≥ 100 kg, ປະລິມານທີ່ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ ແມ່ນ 80 mg ຕໍ່ມື້, ກິນວັນລະຄັ້ງ.

ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້:

- ຍັງບໍ່ທັນມີຂໍ້ມູນ.

ຄຳເຕືອນ:

- ຄວາມເປັນພິດຕໍ່ຕັບ: ໃຫ້ຕິດຕາມຄົນເຈັບໃນລະຫວ່າງການປືນປົວດ້ວຍ ALIRESMTRO-100 ເພື່ອ ປະເມີນຜົນການວິເຄາະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໜ້າທີ່ການທຳງານຂອງຕັບ, ຖ້າຜົນວິເຄາະອອກມາເຫັນວ່າສູງຂຶ້ນ ແລະ ພົບອາການສົນຕ່າງໆກ່ຽວກັບຕັບ ຄວນຢຸດການນຳໃຊ້ ALIRESMTRO-100 ແລະ ສືບຕໍ່ຕິດຕາມ ຄົນເຈັບຕໍ່ໄປ ຫາກມີການສົ່ງໃສ່ວ່າມີຄວາມເປັນພິດຕໍ່ຕັບ.
- ອາການສົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຖົງບີ: ພົບເຫັນໜົວໃນຖົງບີ ແລະ ຖົງບີອັກເສບຮຸນແຮງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ສຳລັບ ຄົນເຈັບທີ່ໄດ້ຮັບການປືນປົວດ້ວຍຢາ ALIRESMTRO-100, ຄວນພິຈາລະນາໃນການກວດວິເຄາະເບິ່ງຖົງບີ ແລະ ຕິດຕາມຜົນການປືນປົວທາງດ້ານຄຣີນິກທີ່ເໝາະສົມ, ຖ້າສົງໄສວ່າມີການອັກເສບຖົງບີ ໃຫ້ຢຸດ ການນຳໃຊ້ຢາ ຈົນກວ່າອາການຈະດີຂຶ້ນ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

- ອາການທີ່ພົບເຫັນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ: ຖອກທ້ອງ, ປວດຮາກ, ຮາກ, ອາການຄັນ, ທ້ອງຜູກ, ເຈັບທ້ອງ ແລະ ວິນຫົວ.

ຮູບແບບຂອງຢາ: ຢາເມັດສີປົວ.

ຂະໜາດບັນຈຸ: ບັນຈຸໃນກ່ອງ, 1 ກ່ອງມີ 30 ເມັດ.

ວັນທີມີຄອາຍຸ: 36 ເດືອນ ນັບຫຼັງຈາກວັນທີຜະລິດ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນກ່ອງບັນຈຸເດີມ, ປິດຝາສະໝິດ, ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນອຸນຫະພູມຕ່ຳກວ່າ 30 °C.
- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກມືເດັກ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຣຸບ ຈຳກັດ

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com