

ALIRITLE

Generic name: Ritlecitinib tosylate

Brand Name: ALIRITLE

Composition:

Ritlecitinib tosylate 50mg

Indications:

- ALIRITLE is a kind of inhibitory indicated for the treatment of severe alopecia areata in adults and adolescents 12 years and older.

Dosage:

- Use under the guidance of a physician.
- The recommended dose of this product is 50 mg orally once daily with or without food.
- The capsules should be swallowed whole. Do not crush, cut or chew.
- If a dose is missed, take the missed dose as soon as possible. If you forget to take a dose for more than 8 hours, skip that day's dose and take the same dose the next day.

Contraindications:

- Patients who are known to have hypersensitivity reactions to Ritlecitinib or any excipients in the formulation.

Warnings:

- Avoid using ALIRITLE in patients with active and severe infections.
- Initiation of ALIRITLE treatment is not recommended in patients with active TB.
- If a patient develops herpes zoster, interruption of treatment should be considered until remission.
- ALIRITLE should be used with caution in patients with known risk factors for thromboembolism.
- If a clinically significant hypersensitivity reaction occurs, discontinue ritlecitinib and provide appropriate treatment.
- If a patient develops central hearing impairment during medication, ALIRITLE should be discontinued until the cause is identified.
- Pregnant women, children and the elderly should use with caution.

Adverse Effects:

- Headache, diarrhea, acne, rash, urticaria, folliculitis, fever, atopic dermatitis, dizziness, elevated blood creatine phosphokinase, herpes zoster, decreased red blood cell count, oral mucositis.

Dosage form: Blue capsules.

Packaging: 28 capsules/bottle.

Expiry date: 36 months from the date of manufacture.

Storage:

- Store sealed in original packaging at no more than 30°C.
- Keep out of the reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory

Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com

ເອກະສານກຳກັບຢາ ALIRITLE

ຊື່ທົ່ວໄປ: Ritlecitinib tosylate

ຊື່ການຄ້າ: ALIRITLE

ສ່ວນປະກອບ:

Ritlecitinib tosylate.....50mg

ຂໍ້ບັງໃຊ້:

- ເປັນຢາທີ່ຈັດຢູ່ໃນກຸ່ມ kinase inhibitor ໃຊ້ປິ່ນປົວ ອາການຜິມລົນເປັນຈຸດ, ເປັນຍ່ອມ, ທີ່ມີອາການຮຸນແຮງໃນຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍອາຍຸ 12 ປີຂຶ້ນໄປ.

ວິທີໃຊ້:

- ນຳໃຊ້ຕາມຄຳແນະນຳຂອງແພດ.
- ໃຊ້ຮັບປະທານ ໃນປະລິມານ 50 mg 1 ຄັ້ງ/ມື້ ກິນກ່ອນ ຫຼື ຫຼັງອາຫານ.
- ຄວນກິນຢາເປັນເມັດ ຫ້າມບິດ, ຫຍ້າ ຫຼື ຄ້ຽວເມັດຢາ.
- ກໍລະນີລົມກິນຢາແມ່ນໃຫ້ກິນຢາທັນທີ, ຖ້າລົມກິນຢາເກີນ 8 ຊົ່ວໂມງ ໃຫ້ຂ້າມຢາມື້ນັ້ນໄປ ແລ້ວກິນຢາມື້ຕໍ່ໄປໃນປະລິມານເທົ່າເດີມ.

ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້:

- ຫ້າມໃຊ້ໃນຄົນເຈັບຫີແຜ່ຢາມື້ ຫຼື ແຜ່ສ່ວນປະກອບອື່ນທີ່ມີໃນຖົງຢາ.

ຄຳເຕືອນ:

- ຫຼັກເວັ້ນການໃຊ້ຢາໃນຄົນເຈັບ ທີ່ກຳລັງມີການຕິດເຊື້ອຢ່າງຮຸນແຮງ.
- ການພິຈາລະນາໃນການປິ່ນປົວເບື້ອງຕົ້ນດ້ວຍຢາມື້ ບໍ່ຄວນໃຊ້ໃນຄົນເຈັບທີ່ກຳລັງຕິດເຊື້ອພະຍາດວັນນະໂລກ.
- ຖ້າຄົນເຈັບຕິດເຊື້ອໄວຣັສ VZV ຕາມເຕັ້ນ (herpes zoster) ໃຫ້ພິຈາລະນາຢຸດການນຳໃຊ້ ຈົນກວ່າ ອາການຕິດເຊື້ອດັ່ງກ່າວຈະຫາຍຈົນນຳໃຊ້ຢາຄືນໃໝ່.
- ຄວນລະມັດລະວັງ ໃນການໃຊ້ຢາກັບຄົນເຈັບທີ່ມີບັນຫາ ກ່ຽວກັບລົມເລືອດອຸດຕັນໃນເສັ້ນເລືອດດຳ (Venous thromboembolism (VTE)).
- ຖ້າພົບເຫັນການແຜ່ຢາເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການນຳໃຊ້ຢາ ໃຫ້ຢຸດການນຳໃຊ້ ແລະ ປິ່ນປົວອາການແຜ່ທີ່ເກີດຂຶ້ນ.
- ຖ້າພົບເຫັນອາການ ກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດໃນການໄດ້ຍິນສຽງຫຼຸດລົງ ໃຫ້ຢຸດການນຳໃຊ້ ຈົນກວ່າອາການຈະກັບຄືນມາປົກກະຕິ.
- ການໃຊ້ຢາ ໃນແມ່ຍິງຖືພາ, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸ ຄວນນຳໃຊ້ດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

- ເຈັບຫົວ, ຖອກທ້ອງ, ເປັນສິວ, ເປັນຜືນ, ເປັນຜືນຕາມຜິວໜັງ (ລົມພິດ), ຮຸຂຸມຂຶ້ນອັກເສບ, ເປັນໄຂ້, ເກີດພູມແພ້, ຜິວໜັງອັກເສບ, ວິນວຽນ, ພິບທາດພິດເບື້ອງສູງໃນເລືອດ (creatinine phosphokinase), ຕາມເຕັ້ນ (herpes zoster), ເມັດເລືອດແດງຕ່ຳ, ອັກເສບເຍື້ອເມືອກໃນໂຜ້ງປາກ.

ຮູບແບບຂອງຢາ: ເປັນແຄັບຊຸນສີຟ້າ.

ຂະໜາດບັນຈຸ: ບັນຈຸໃນກ່ອງ, 1 ກ່ອງ 28 ແຄັບຊຸນ.

ວັນໝົດອາຍຸ: 36 ເດືອນ ຫຼັງຈາກວັນທີ່ຜະລິດ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ຮັກສາໄວ້ໃນກັບກ່ອງເດີມ ທີ່ປິດຟາສະໝິດ, ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນອຸນຫະພູມ ຕ່ຳກວ່າ 30°C.
- ເກັບຮັກສາຢາໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກມື້ເດັກ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຮູບ ຈຳກັດ

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພິດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com