

ALIRUXOLITINIB

Generic name: Ruxolitinib Phosphate

Brand Name: ALIRUXOLITINIB

Composition: Ruxolitinib..... 20mg.

Indications:

Indicated in the treatment of adult patients with disease-related splenomegaly or symptoms in adult patients with primary myelofibrosis (PMF) (also known as chronic idiopathic myelofibrosis), post-polycythemia-vera myelofibrosis (PPV-MF), or post-essential thrombocythaemia myelofibrosis (PET-MF), and patients with graft-vs-host disease.

Dosage:

Before starting treatment with this product, a full blood cell count, including a white blood cell classification count, must be performed. This product is administered orally and can be taken with or without food, use according to the physician's guidance.

• **Myelofibrosis:**

- Greater than $200 \times 10^9/L$: 20 mg given orally twice daily.
- $100 \times 10^9/L$ to $200 \times 10^9/L$: 15 mg given orally twice daily.
- $50 \times 10^9/L$ to less than $100 \times 10^9/L$: 5 mg given orally twice daily.
- Monitoring blood tests every 2 to 4 weeks until levels stabilize, and observe any symptoms that occur during medication use to adjust the dosage and amount as appropriate.

• **Polycythemia Vera:**

- The starting dose of ALIRUXOLITINIB is 10 mg given orally twice daily.

• **Acute Graft-Versus-Host Disease:**

- The starting dose of ALIRUXOLITINIB is 5 mg given orally twice daily.

• **Chronic Graft-Versus-Host Disease:**

- The starting dose of ALIRUXOLITINIB is 10 mg given orally twice daily.

Contraindications:

- Patients who are allergic to this product.
- Pregnant and lactating women.

Warning:

- Thrombocytopenia, anemia, and neutropenia may occur.
- Resolve bacterial infections before starting therapy with ALIRUXOLITINIB.
- Symptoms may worsen after interruption or discontinuation of dosing.
- May increase risk of developing skin cancer.
- Children should use with caution.

Adverse effects:

- Decreased platelet count and anemia.
- Infection and edema.

Dosage form: White tablets

Expiry date: 24 months from the date of manufacture.

Packaging: 56 tablets/bottle

Storage:

- Store at room temperature 20-25°C.
- Keep out of reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory.

Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com

ເອກະສານກຳກັບຢາ ALIRUXOLITINIB

ຊື່ທົວໄປ: Ruxolitinib Phosphate

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ: ALIRUXOLITINIB

ສ່ວນປະກອບ: Ruxolitinib..... 20mg.

ຂໍ້ບົງໃຊ້:

ນຳໃຊ້ໃນການປິ່ນປົວຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ມີພະຍາດກ່ຽວກັບມ້າມໃຫຍ່ ຫຼື ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ມີພະຍາດ myelofibrosis ຂັ້ນຕົ້ນ (PMF)(ທີ່ເອີ້ນອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າພະຍາດ myelofibrosis ທີ່ບໍ່ຮູ້ສາເຫດ), ພະຍາດ myelofibrosis ທີ່ເກີດ ຫຼັງຈາກພາວະເມັດເລືອດແດງຜິດປົກກະຕິ (PPV-MF), ພະຍາດ myelofibrosis ທີ່ເກີດຫຼັງຈາກພາວະເມັດ ເລືອດຕ່ຳຜິດປົກກະຕິ (PET-MF) ແລະ ຄົນເຈັບທີ່ມີພະຍາດ graft-vs-host.

ວິທີໃຊ້:

ກ່ອນການໃຊ້ຢາ ຄົນເຈັບຄວນໄດ້ຮັບການກວດເລືອດກ່ອນ ເພື່ອຕິດຕາມ ຈຳນວນຈຸລັງເມັດເລືອດ ລວມທັງ ປະລິມານຂອງເມັດເລືອດຂາວຊະນິດຕ່າງໆ, ໃຊ້ດ້ວຍວິທີຮັບປະທານ ກ່ອນ ຫຼື ຫຼັງອາຫານ, ນຳໃຊ້ຕາມ ຄຳແນະນຳຂອງແພດ.

• ກໍລະນີໃຊ້ເພື່ອປິ່ນປົວ Myelofibrosis:

- ກໍລະນີຜົນການກວດເກັດເລືອດ ສູງກວ່າ $200 \times 10^9/L$: ໃຫ້ໃຊ້ ຢາໃນປະລິມານ 20mg ໃຫ້ກິນ ສອງຄັ້ງ ຕໍ່ວັນ.
- ກໍລະນີເກັດເລືອດຢູ່ໃນລະດັບ $100 \times 10^9/L$ ຫາ $200 \times 10^9/L$: ໃຫ້ໃຊ້ 15mg ໃຫ້ກິນສອງຄັ້ງຕໍ່ວັນ.
- ກໍລະນີພົບເກັດເລືອດ ໃນລະດັບ $50 \times 10^9/L$ ຫາ ປະລິມານທີ່ໜ້ອຍກວ່າ $100 \times 10^9/L$: ໃຫ້ກິນ 5 mg ໃຫ້ກິນສອງຄັ້ງຕໍ່ວັນ.
- ໃຫ້ຕິດຕາມກວດເລືອດ 2 ຫາ 4 ອາທິດ ຈົນກວ່າ ເລືອດຈະຄົງທີ່ ແລະ ຕິດຕາມສະພາບ ອາການຕ່າງໆທີ່ສະແດງອອກ ໃນເວລານຳໃຊ້ຢາ ເພື່ອຕິດປັບຂະໜາດ ປະລິມານຂອງຢາໃຫ້ ເໝາະສົມ.

• ກໍລະນີ ນຳໃຊ້ເພື່ອປິ່ນປົວ Polycythemia Vera:

- ເລີ່ມຕົ້ນນຳໃຊ້ ALIRUXOLITINIB ດ້ວຍປະລິມານ 10mg ໃຫ້ກິນ ສອງຄັ້ງຕໍ່ວັນ (ເຊົ້າ - ແລງ) ປະລິມານໃຊ້ສູງສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນ 25mg (ເຊົ້າ - ແລງ).

• ກໍລະນີໃຊ້ເພື່ອປິ່ນປົວ Acute Graft-Versus-Host Disease:

- ເລີ່ມຕົ້ນນຳໃຊ້ ALIRUXOLITINIB ໃນປະລິມານ 5mg ໃຫ້ກິນສອງຄັ້ງຕໍ່ວັນ (ເຊົ້າ - ແລງ).

• ກໍລະນີໃຊ້ເພື່ອປິ່ນປົວ Chronic Graft-Versus-Host Disease:

- ໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນນຳໃຊ້ ALIRUXOLITINIB ໃນປະລິມານ 10mg ໃຫ້ກິນສອງຄັ້ງຕໍ່ວັນ (ເຊົ້າ - ແລງ).

ຂັ້ນຕອນໃຊ້:

- ຫ້າມໃຊ້ໃນຄົນເຈັບທີ່ແພ້ຢາມີ.
- ຫ້າມໃຊ້ໃນແມ່ຍິງທີ່ກຳລັງຖືພາ ແລະ ແມ່ຍິງທີ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່.

ຄຳເຕືອນ:

- ເກີດອາການເກັດເລືອດຕ່ຳ, ເລືອດຈາງ, ພາວະເມັດເລືອດຂາວຕ່ຳ (neutropenia).
- ຄວນຈຳກັດການຕິດເຊື້ອແບັກທີເຣຍກ່ອນການນຳໃຊ້ ALIRUXOLITINIB.
- ເກີດອາການຊຸດລົງ ຍ້ອນການຢຸດຢາກະທັນຫັນ ຫຼື ການໃຊ້ ບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງຕາມການກຳນົດ.
- ມີຜົນຕໍ່ຜິວໜັງ ເກີດສະພາບ Non-melanoma skin cancer.
- ກໍລະນີຈຳເປັນໃຊ້ຢາມີໃນເດັກ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການ ລະບັງເປັນພິດເສດ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

- ການຫຼຸດລົງຂອງເກັດເລືອດ ການເກີດໂລກເລືອດຈາງ.
- ການຕິດເຊື້ອ ແລະ ບວມ.

ຮູບແບບຂອງຢາ: ເປັນຢາເມັດ ສີຂາວ.

ວັນໝົດອາຍຸ: 24 ເດືອນນັບຈາກວັນທີ່ຜະລິດ.

ຂະໜາດບັນຈຸ: ບັນຈຸໃນກ່ອງ, 1 ກ່ອງມີ 56 ເມັດ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບຮັກສາຢາໃນກັບກ່ອງເດີມ, ບໍ່ໃຫ້ຖືກແສງແດດ, ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນບ່ອນຮົ່ມໃນຫ້ອງທີ່ມີອຸນຫະພູມ 20 ຫາ 25°C.
- ເກັບຮັກສາຢາ ໃຫ້ຫ່າງຈາກມືເດັກ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຮູບ ຈຳກັດ

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com