

ALISUZETRI

Generic name: Suzetrigine Tablets

Brand Name: ALISUZETRI

Composition:

Suzetrigine.....50mg

Indications:

- ALISUZETRI is a new type of pain relive non opioid is work by blocking pain signal indicated for the treatment of moderate to severe acute pain in adults.

Dosage:

- Do not chew or crush.
- Recommended starting ALISUZETRI oral dose is 100 mg. Take the starting dose on an empty stomach at least 1 hour before or 2 hours after food.
- Starting dose 50 mg of ALISUZETRI orally every 12 hours. Take these doses with or without food.
- Use ALISUZETRI for the shortest duration, consistent with individual patient treatment goals.
- Use of ALISUZETRI for the treatment of acute pain has not been studied beyond 14 days.
- Avoid food or drink containing grapefruit during treatment with.

Contraindications:

- Concomitant use with strong CYP3A inhibitors is contraindicated.

Warning:

- Moderate and Severe Hepatic Impairment: Avoid use in patients with severe hepatic impairment (Child-Pugh Class C).
- Use in patients with moderate hepatic impairment may increase the risk of adverse reactions. The recommended dosage is lower in patients with moderate hepatic impairment (Child-Pugh Class B) than those with normal hepatic function.

Adverse Effects:

- The most common adverse reactions were pruritis, muscle spasm, increased creatine phosphokinase, and rash.

Dosage form: Blue oval tablets.

Expiry date: 24 months from the date of manufacture.

Packaging: 30 tablets/bottle.

Storage:

- Store at room temperature not exceeding 30°C.
- Please place it out of reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory.

Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-21-737 051.

www.alliancepharmagroup.com

ເອກະສານກຳກັບຢາ ALISUZETRI

ຊື່ທົວໄປ: Suzetrigine Tablets

ຊື່ການຄ້າ: ALISUZETRI

ສ່ວນປະກອບ:

Suzetrigine 50 mg

ຂໍ້ບົງໃຊ້:

- ALISUZETRI ເປັນຕົວຢາແກ້ປວດຂະນິດໃຫມ່ທີ່ບໍ່ແມ່ນໂອປິອອຍ (Non Opioid) ອອກລິດໂດຍການປິດກັນສັນຍານຄວາມເຈັບປວດ ໃຊ້ປິ່ນປົວຄົນເຈັບຜູ້ໃຫຍ່ ທີ່ມີອາການເຈັບຫົວກະທັນຫັນ ລະດັບປານກາງ ຈົນເຖິງຂັ້ນຮຸນແຮງ.

ວິທີໃຊ້:

- ຫ້າມຫຍ້າ ຫຼື ປິດເມັດຢາ.
- ຂະໜາດເລີມຕົ້ນ 100 mg ໃຫ້ຮັບປະທານໃນເວລາທ້ອງຖວ່າງ ຢ່າງນ້ອຍ 1 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນອາຫານ ຫຼື 2 ຊົ່ວໂມງ ຫຼັງອາຫານ.
- ເລີມກິນ ALISUZETRI 50 mg ທຸກໆ 12 ຊົ່ວໂມງ, ສາມາດກິນຜ່ອມ ຫຼື ບໍ່ຜ່ອມກັບອາຫານກໍໄດ້.
- ໃຊ້ ALISUZETRI ໃນໄລຍະເວລາທີ່ສັບສົນທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍໃນການປິ່ນປົວຂອງແຕ່ລະຄົນ.
- ນຳໃຊ້ຢານີ້ສຳລັບປິ່ນປົວອາການເຈັບຫົວກະທັນຫັນ, ຍັງບໍ່ທັນມີການສຶກສາ ການໃຫ້ຢາເກີນ 14 ວັນ.
- ຫຼີກລ່ຽງອາຫານ ຫຼື ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງໝາກອະງຸ່ນ (Grape fruit) ໃນໄລຍະທີ່ຮັບປະທານຢາ ALISUZETRI.

ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້:

- ຫ້າມໃຊ້ຮ່ວມກັບຢາທີ່ເປັນຕົວຢັບຢັງ CYP3A ທີ່ອອກລິດຮຸນແຮງ.

ຄຳເຕືອນ:

- ການທຳງານຂອງຕັບຫຼຸດລົງ ໃນລະດັບປານກາງ ແລະ ຮຸນແຮງ (Moderate and Severe Hepatic Impairment): ຫ້າມໃຊ້ໃນຄົນເຈັບທີ່ມີພາວະຕັບອັກເສບຮຸນແຮງ (Child- Pugh C).
- ການນຳໃຊ້ໃນຄົນເຈັບທີ່ມີພະຍາດຕັບປານກາງ (Child-Pugh B) ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດມີອາການຂ້າງຄຽງ ແນະນຳໃຫ້ນຳໃຊ້ປະລິມານຢາທີ່ຕ່ຳກ່ວາ ເມື່ອທຽບກັບຄົນເຈັບທີ່ມີໜ້າທີ່ການທຳງານຂອງຕັບປົກກະຕິ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

- ອາການຂ້າງຄຽງທີ່ມັກພົບມີ ຄັນຕາມຜິວໜັງ, ກ້າມຊີ້ນກະຕຸກ, ຄ່າຂອງ Creatine phosphokinase ໃນເລືອດສູງ, ອອກຕຸ່ມພິດຜົນ.

ຮູບແບບຂອງຢາ: ຢາເມັດຮູບໄຂ່ ສີຟ້າ.

ຂະໜາດບັນຈຸ: ບັນຈຸໃນກ່ອງ, 1 ກ່ອງມີ 30 ເມັດ.

ວັນທີອາຍຸ: 24 ເດືອນ ນັບຫຼັງຈາກວັນທີຜະລິດ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງບໍ່ໃຫ້ເກີນ 30°C.
- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກມືເດັກ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຮູບ ຈຳກັດ

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com